

きばなばらもんじん

Scorzonera hispanica L.

歐洲原産ノ多年生草本ニシテ莖ノ高サ1m内外ニ達ス。葉ハ互生シ、細長ニシテ尖鋭頭ヲ有ス。夏時長梗頂ニ黄色ノ舌状花ヲ有セル頭状花ヲ開ク。ばらもんじんニ似タル直根ハ黑色ニシテごぼうニ彷彿シ、食用ニ供セラレ、葉ハ時ニさらどトシテ食シ或ハ蠶ノ飼料ト成スコトヲ得。



さく科

ばらもんじん

一名 むぎなでしこ

Tragopogon porrifolius L.

歐洲原産ノ二年生草本ニシテ、畑ニ栽培ス。直根ハ肥大ニシテ、白色ヲ呈ス。莖ハ高サ60-90cmニ達シ、疎ニ枝ヲ分ツ。葉ハ互生、披針狀線形、長ク尖リ、基部ハ莖ヲ抱ク。七月頃紫色ノ大ナル頭状花ヲ頂生シ、日ニ向キテ開キ、舌状花ヨリ成リ、下ニ綠色ノ總苞アリ。花梗ハ上方肥大シテ空洞ナリ。花後冠毛著シキ瘦果ヲ結ブ。根ヲ食用ニ供ス。和名ハ婆羅門參ヨリ出ツ。



さく科

のげし (滇苦菜)

一名 はるののげし・けしあざみ

Sonchus oleraceus L.

到ル處ノ路傍荒地等ニ普通ナル越年生草本ニシテ莖ハ高サ1m内外、中空ニシテ稜條有リ。葉ハ不規則ニ羽裂シ、あざみに似ルモ刺ナク柔軟ナリ。裂片ニ不齊ノ齒アリテ、葉底ハ莖ヲ抱ク。莖ノ上部ニハ往々腺毛アリ。莖葉ニ白汁ヲ有ス。春夏ノ候莖頭ニ枝ヲ分チテ黄色ノ頭状花ヲ開ク。舌状花數多ク、冠毛ハ白色ナリ。時ニ其苗ヲ食用トス。漢名 苦菜(慣用)



さく科