

第3189圖

みる科




## みる

*Codium fragile Suringar.*

體ハ深緑色ヲ呈シ、圓柱狀ニシテ繰返シ數回叉狀ニ密ニ分岐シ、枝ハ腋セマク、先端鈍圓、略ボ同一ノ高サニ達シテ房ヲ成ス。太サ5mm許、高サ10-30cm内外ヲ常トス。若キ時ハ表面ニ産毛ノ如キ毛アルモ後脱落ス。凡テみる類ノ體ノ表面ハ胞囊ト稱スル顯微鏡的ニ小ナル袋狀トナレル部ノ頭部ガ集リテ形成セラルルモノ故、手觸リ稍羅紗ニ似タリ、而シテ此ノ種ニ於テハ胞囊ノ先端著シク尖ル。分布廣ケレドモ特ニ我邦中南部ニ多ク、干溝線間及ビ干潮線下ノ岩石上ニ生ズ。食用ニ供スルコトアリ。

第3190圖

みる科



## ながみる

一名　さめたすき・くづれみる  
*Codium cylindricum Holmes.*

體ノ概形ハみるニ似タルモ、コレヨリモ遙ニ長ク、甚ダ長キモノニテハ15mニ達シ、又枝分レハみるヨリモ比較的少シ。屢々叉狀ニ分岐シ、分岐點ノ下ニ於テ著シク三角形ニ廣ガル。直立セズシテ海底ニ蟠居スル故真珠貝ノ養殖場等ニ繁殖スルトキハ真珠貝ヲ被ヒテ之ヲ殺シ、害ヲ及ボスコトアリ。コノ種ノ胞囊ハ可ナリ大ニシテ長サ1.5-2mmニ達ス。頂端ハ丸クシテ尖ルコトナシ。暖海ニ多ク、常ニ干潮線下ニ生ズ。

第3191圖

みる科



## ひらみる

*Codium latum Suringar.*

體ハ屢々二三叢生シ、扁平ニ廣ガリ、單條又ハ不規則ニ裂ケ、基部ハ短キ莖部ヲ成シ、小盤狀根ニテ地物ニ附著シ直立ス。長サ約50-60cm、幅20-30cm、又ハソレ以上ニ達シ、大ナルモノニテハ長サ1mヲ超ユルモノアリ。深緑色ニシテ厚キ羅紗ノ如シ。胞囊ハ圓柱狀ニシテ頂端ニ於テハ往々少シク太クナリ、膜ハ薄シ。主トシテ本州中部太平洋岸地方ニ產シ、特ニ干溝線間ノ外界ニ面スル、砂ニテ被ハレタル岩石上ニ好ミテ生ズ。

はひみる

*Codium adhaerens C. Agardh.*

體ハ扁平ニシテ全裏面ヲ以テ岩石上等ニ匍匐密著シ、輪廓略扁圓ナルモ後可ナリ不規則ニ廣ガリ、往々二三個體相觸レテ互ニ合流ス。色ハ深綠ニシテ多ク黒味ヲ帶ビ、表面ニハ皺又ハ襞ヲ有ス。通常徑10cm内外アリ。胞囊ハ棍棒狀ニシテ先端丸ク、膜ハ少シク厚クナレリ。青森縣邊ヨリ以南ニ產シ、特ニ暖海ニ多ク、干潮線附近ニ生ズ。密著スルモノヲ剝ギ採ル時ハ常ニ裏面ニ向テ強ク屈曲スル性アリ。

第3192圖

みる科




第3193圖

いはづた科

## へらいはづた

*Caulerpa brachypus Harvey.*

體ハ岩上ヲ匍匐スル徑2mm位ノ圓柱狀ノ莖狀部ヲ有シ、下部ヘハ細キ絲狀ノ根狀部ヲ、上部ヘハ葉狀部ヲ多數ニ出ス。葉狀部ハ基部屢々膨レ、ソレヨリ上方ニ舌狀又ハばんど状ニ扁平ニ廣ガリ、幅5-8mm、長サ2-7cm許、時ニ分岐シ又ハ表面ヨリ枝ヲ出ス。邊緣ニハ小サキ鋸齒アルカ又ハ之ヲ缺ク。此類ハ凡テ體全體ガーツノ囊ノ如クナリ、隔膜ハ一切アク、唯體ノ内部ヲ縱横ニ通ズルせるろうず質ノ纖維ヲ有ス。暖海ヲ好ミ、相州邊ヨリ南部ノ太平洋岸ニ多ク產シ、干潮線邊又ハソレヨリ深所ニ生ズ。



第3194圖

はねも科

## はねも

*Bryopsis plumosa C. Agardh.*

體ハ高サ5-10cm、多數叢生ス。一本ノ、時ニ分岐スル主軸アリテソノ中部邊ヨリ上部ニ於テ小枝ヲ主軸ノ兩側ヘ密ニ羽狀ニ發ス。而シテ此等ノ主軸ニモ又小枝ニモ配偶子囊ヲ生ズル場合ノ外ハ決シテ隔膜ヲ生ズルコトナシ。質柔ク鮮綠乃至黃綠色ヲ呈シ、生時水中ニ於テハ青白キ光澤アリ。我邦各地ニ分布シ、干溝線間ノ岩上ニ生ズ。尙此屬ニテハをばなはねも(*B. hypnoides Lamx.*)、ねざしはねも(*B. corticulans Setch.*)等各地ニ產ス。

