

第 28 圖



第 29 圖



第 30 圖



## おにたびらこ (黃瓜菜)

*Crepis japonica* Benth.

路傍庭園等ニ自生スル越年生或ハ一年生草本。初メ根生葉ヲ叢生ス。葉ハ倒披針形ニシテ邊緣羽裂ス。莖葉共ニ稍褐紫色ヲ帶ビ微毛ヲ被ル。春日葉間ヨリ莖ヲ抽クコト 30-60cm 許ニ達シ、頂ニ枝ヲ分チ、小形ノ黃色頭狀花ヲ着ケ、陽ヲ受ケテ開ク。頭狀花ハ舌狀花ノミヨリ成リ、瘦果ノ冠毛ハ白色ナリ。漢名 黃鵠菜トモ云フ。

## かうぞりな

*Picris hieracioides* L.  
var. *japonica* Regel.

山野ニ普通ノ越年生草本ニシテ、早春根生葉ハ地ニツキテ叢生シ、後葉間ヨリ莖ヲ抽キテ 60-90cm 許ニ達ス。莖生葉ハ互生シ、披針形ニシテ鋸齒アリ。初夏ノ候、梢上ノ葉腋ニ枝ヲ分チ、頂ニ舌狀花ノミヨリ成ル黃色ノ頭狀花ヲ着ク。總苞ハ綠色。莖・葉共ニ硬毛多シ。此ノ硬毛膚ニ觸ルレバ引カカルヲ以テ之レヲ剃刀ニ見立テ、かみそり菜ノ意ニテかうぞりなト名ケラレタリ。漢名 毛蓮菜(慣用)

## たびらこ (稻槎菜)

一名 かはらけな・こおにたびらこ  
*Lapsana apogonoides* Maxim.

早春ヨリ田面ニ多キ越年生草本。根生葉ハ叢生シ、莖葉ハ互生ス。共ニ大小不齊ニ羽裂シ、無毛ニシテ質軟ナリ。莖ハ細ク數多ク出デ、少數ノ枝ヲ分チテ 10cm 内外アリ、質軟ク常ニ横斜ス。早春枝端ニ各一箇ノ頭狀花ヲ着ケ、陽ヲ受ケテ開ク。頭花ハ黃色ノ舌狀花ヨリ成リ、果實ハ褐色ニシテ冠毛ナシ。往々嫩苗ヲ食用トス。古、春ノ七草ノ一ナルほとけのざハ、此種ナリ。然ルニ多クノ人々たびらこヲむらさき科ノモノトスルハ誤ナリ。

## やぶたびらこ

*Lapsana humilis* Makino.

林側田間等ニ多キ越年生草本。葉ハ不齊ニ羽裂シ、多數簇生ス。春時數莖ヲ抽クコト高サ 20-30cm 許ニ達シ、質軟ニシテ斜傾ス。莖上ニ枝ヲ分チ頂ニ黃色ノ舌狀花ヨリ成ル小頭狀花ヲ着ク。花後綠色ノ總苞閉鎖シテ殆ド球形ヲ成シ、後開キテ赤褐色ノ瘦果ヲ露ハス。瘦果ニ冠毛ナシ。

第 31 圖



第 32 圖



## きくちしゃ

一名 おらんだぢしゃ・はなぢしゃ

*Cichorium Endivia* L.

蓋シ印度ノ原產ニシテ今ハ廣ク園圃ニ栽培セラルル一年生或ハ越年生草本。莖ノ高サ 60-90cm。葉ニ毛ナク、不齊ノ缺刻細齒、或ハ多裂シテ皺縮ス。莖葉ハ互生シ、葉底ハ莖ヲ抱ク。春夏ノ候、藍色ノ花ヲ開ク。冬春ノ頃新葉ノ聚合セルモノヲ採リテ生食ス。

## きくにがな

*Cichorium Intybus* L.

歐洲原產ノ多年生草本。高サ 60-90cm。葉ハ互生シ、逆向羽狀裂ヲ成シ、中脈ニ粗毛アリ。上部ノ葉ハ小ニシテ苞狀ヲ成シ全邊ナリ。夏時、青色舌狀花ヨリ成ル頭狀花ヲ枝上ニ互生シ、朝ニ於テ開ク。根ヲヒーノ代用ト成シ、又嫩葉ヲ食用トス。

第 33 圖

