


第40圖

きく科




第41圖

きく科



第42圖

きく科



きっかふはぐま

Ainsliaea apiculata Sch. Bip.

山地ニ多ク生ズル多年生ノ小草本ニシテ莖ノ下部ニ葉ヲ互生シ、葉々相接ス。其葉ハ長柄ヲ具ヘ、淺ク三-九裂シ、三角状圓形ヲ成シテ稍龜甲ノ状アリ、莖葉共ニ短毛ヲ有ス。秋月、葉心ヨリ10-20cm許ノ花軸ヲ抽キ、穗状様ヲ成シテ十箇内外或ハ多數ノ短梗頭狀花ヲ着ク。各頭狀花ハ白色五裂ノ管狀小花三箇ヲ收メ一輪花ノ状ヲ呈ス。瘦果ハ茶褐色ノ冠毛ヲ有ス。

ゑんしゅはぐま

一名 らんかうはぐま

*Ainsliaea dissecta**Franch. et Sav.*

多年生草本ニシテ山地ニ生ズ。莖ハ高サ30cm許ニ達ス。葉ハ多數相接シテ輪様ニ叢生シ根生状ヲ呈シ、長葉柄ヲ具ヘ、掌状ニ深裂シテ裂片更ニ分裂ス。夏秋ノ候、花軸上ニ少數ノ白色管狀花ヨリ成レル細長キ頭狀花ヲ穗様ノ總状ニ着ク。特ニ遠州邊ニ生ズルニ因リ遠州羽熊ノ和名アリ。

ていしゃうさう

*Ainsliaea cordifolia**Franch. et Sav.*

中部以南ノ暖地林中ニ生ズル多年生草本。根莖ハ直立或ハ横斜シ、少數ノ紐状根ヲ發出ス。莖ハ褐紫色、初メ淡褐色ノ綿毛ヲ被レドモ後ニハ殆ンド脱落シ、高サ4-8cmニシテ頂ニ輻状ヲ成シテ葉ヲ簇生ス。葉ハ長キ葉柄アリテ平開シ、長椭圓状披針形・卵状長椭圓形・卵形或ハ卵状椭圓形ニシテ長サ5-12cm許、銳頭、截状心臟底、稍波状ノ鋸齒アリテ、表面ハ或ハ綠色或ハ白斑或ハ暗紫斑アリ、裏面ハ時ニ紫色ナルアリ。秋日葉心ニ花梗ヲ抽テ直立シ上部ニ偏側性ノ穗状花穗ヲ立ツルコト20-30cm許、總苞ハ狹長椭圓形、總苞片ハ覆瓦様ニ鱗次シ内部ニ至ルニ從ヒ次第ニ長クシテ紫色ヲ帶ブ。頭狀花ハ概ね管狀ノ五小花ヨリ成リ、花冠ハ白色ニシテ五裂シ、裂片ハ線形ニシテ平開シ往々旋回ス。冠毛ハ淡褐色ヲ呈ス。和名ていしゃうさうハ予其意ヲ解シ得ズ。

くさやつで

一名 よしのさう・かんぽくさう

Ainsliaea uniflora Sch. Bip.

中部以西ノ河岸ノ地井ニ山中林下ニ生ズル多年生草本。根莖ハ横臥シ、莖ハ極メテ短クシテ直立シ、莖頂ニ長柄アル掌状裂葉ヲ多數ニ叢生ス。葉ハ徑5-7cm、外形ハ圓形ニシテ心臟底ヲ成シ、掌状ニ尖裂シ、裂片ハ五乃至七箇、先端更ニ尖裂或ハ淺裂シテ尖頭ヲ有シ其邊縁ニハ低鋸齒アリ、葉面扁平ニシテ綠色ヲ呈シ往々紫采アリテ光澤ヲ缺ク。秋月、葉間ヨリ花梗ヲ抽出シ高サ40cm内外アリテ上部ハ圓錐花序ヲ成シ、花軸直通シテ分枝シ、各枝ハ紫色ヲ被ビ絲状ナレド真直ニシテ、枝端ニ一小花ヨリ成ル頭狀花ヲ着ケ點頭ス。總苞ハ細長ニシテ總苞片ハ覆瓦様ニ鱗次ス。花冠ハ五裂シ、裂片ハ狹長ニシテ反卷シ暗紫色ヲ呈ス。瘦果ハ椭圓形ニシテ堅果ヲ密生シ熟スレバ總苞、外ニ反リテ其體ヲ露出ス。和名ハ草八手ニシテやつて葉ノ如キ葉ヲ有スル草本ナレバ斯ク云ヒ、吉野草ハ大和吉野山ニ多ケレバ云ヒ、肝木草ハ其葉形スヒカヅラ科ノかんぽくニ似タレバ名ク。

せんほんやり

一名 むらさきたんぽば

Gerbera Anandria Sch. Bip.

山野ニ生ズル多年生小草本。長柄アル倒卵状長椭圓ノ根出葉三-五片ヲ叢生シ、緣ニ不齊ノ缺刻アリ、葉柄竝ニ其下面ニ白色ノ軟毛ヲ布ク。夏秋ノ候ニハ葉形花時ヨリハ大ナリ。春日葉間ニ5-15cmノ一本或ハ二三本ノ花莖ヲ抽キ、各莖頂ニ一花ヲ着ク、舌狀花ハ少數ナリ。花後更ニ高ク莖ヲ抽キ、閉鎖花アル頭狀花ヲ續出ス。舌狀花ハ白色ニシテ裏面多クハ淡紫暈アリ。冠毛ハ茶褐色ナリ。漢名 大丁草(慣用)

第43圖

きく科



第44圖

きく科



第45圖

きく科



べにばな (紅藍花)

古名 すゑつむはな・くれのあゐ

Carthamus tinctorius L.

越年生草本ニシテ栽培セラル。近東ノ原産ナリ。莖ノ高サ1m内外、葉ハ互生シ、廣披針形ニシテ銳刺多シ。夏月、梢頭ニ紅黃色管狀花アル頭狀花ヲ開キ、其狀あざみ花ノ態アリ。總苞片ハ緣刺ヲ具フ。小花ヲ摘ミ採リ人工ヲ加ヘテベに即チ臍脂ヲ製ス。又嫩苗ハ食用トスペク、種子ハ油ヲ搾ルベシ。花ノ陰干セルモノハ婦人藥トシテ煎服セラル。