

第466圖

なす科



あかなす (小金瓜)

原名 とまとー

*Lycopersicon esculentum* Mill.

熱帯亞米利加ノ原産、園圃ニ栽培スル一年生草本。莖ハ長ク延ビ、高サ1m許、其地ニ着ケル部分ハ隨處ニ根ヲ生ジ易シ。葉ハ互生シ、羽狀ニシテ小葉ニ大小アリ、且ツ葉縁ニ不整ノ粗齒ヲ有シ、一種ノ臭アリ。夏日、梢莖上ニ花穂ヲ出シ、黄色ノ點頭花ヲ着ケ、花梗ニ一節アリ。綠萼數裂シ、花冠ハ輻狀ヲ成シテ又數裂シ、裂片狹長ニシテ尖ル。漿果ハ扁圓形ニシテ赤熟シ、或ハ小形ニシテ球狀ヲ成シ赤熟・黄熟スルモノアリ。果實ヲ食用トス。蕃柿或ハ番茄ノ漢名ヲ慣用ス。

第467圖

なす科



いぬほぼづき (龍葵)

*Solanum nigrum* L.

有毒植物ノ一ニシテ山野ニ生ズル一年生草本。莖ノ高サ60-90cmニ達シ、分枝シテ或ハ直立シ或ハ横斜シ叢ヲ成シテ繁茂ス。葉ハ有柄、互生シ、卵形ニシテ尖リ、全邊ナリ。夏秋ノ候綠莖ノ節間ニ細梗ヲ出スコト3cm許、白色有梗ノ小花ヲ繖形狀ニ簇生ス。綠萼五片アリ。花冠ハ五裂シテ輻狀ヲ成シ、五雄蕊アリテ黄葯ヲ有ス。漿果ハ球形ニシテ黒熟シ、宿存萼ハ小ナリ。

第468圖

なす科



やまほろし

一名 ほそばのほろし

*Solanum nipponense* Makino.

山地ニ生ズル蔓性多年生草本。莖ハ長ク延ビテ疎ニ分枝シ、毛ナシ。葉ハ互生シ、有柄ニシテ卵狀披針形ヲ成シ、鋭尖頭ヲ有シ、下部ノ者ハ三裂シ、毛ナシ。夏時、葉間ノ莖上ニ花梗ヲ出シテ分枝シ、淡紫白色ノ花ヲ開ク。花冠ハ輻狀ニシテ五深裂シ、花喉ニ綠采アリ。漿果ハ球形ニシテ赤熟シ、ひよどりじゃうごト相同ジ。

まるばのほろし

*Solanum gracilescens* Nakai.

山地ニ生ズル蔓性ノ多年生草本。概形やまほろしニ似テ之レヨリ強シ。莖ハ深綠色ニシテ葉ト共ニ毛ナシ。葉ハ互生シ、卵狀披針形ニシテ尖リ、分裂セズ。夏秋ノ候、花梗ヲ葉間ノ莖側ニ出シ、分枝シテ紫色ノ花ヲ著ク。花冠輻狀ニシテ花喉ニ綠采アリ、五深裂シ、花後球形ノ漿果ヲ結ビ、赤熟ス。有毒植物ノ一ナリ。漢名 白英(誤用)

第469圖

なす科



ひよどりじゃうご (白英)

*Solanum lyratum* Thunb.

山野ニ生ズル灌木狀多年生蔓性草本。舊蔓ヨリ新枝ヲ生ジテ葉ヲ着ケ、葉柄ヲ以テ他物ヲ卷把シ、長ク攀縁ス。葉ハ有柄、互生シテ三乃至五裂シ、梢葉ハ分裂セズ。底部ハ心臟形ヲ成シ、莖葉共ニ軟毛アリ。夏秋ノ候、花軸ヲ葉柄ニ對出シ、分叉シテ白花ヲ開キ、花冠ハ輻狀ニ五深裂ス。漿果ハ球形ニシテ秋月紅熟ス。有毒植物ナリ。和名ハ鴨上戸ノ意ニシテ、其赤キ熟實ヲひよどり好ンデ食フ故名ク。從來蜀羊泉ヲ本種ノ漢名トス、固ヨリ誤ナリ、此品さくばどころニシテ我邦ニ産セズ。

第470圖

なす科



第471圖

めじろほぼづき (紅絲線)

*Solanum biflorum* Lour.

暖地ノ海邊ニ生ズル多年生草本。莖ノ高サ60-90cmニシテ枝ヲ分ツ。葉ハ長橢圓狀卵形或ハ卵形ニシテ柄ヲ有シ、全邊ニシテ毛ヲ帶ブ。夏秋ノ候、有梗ノ白花ヲ葉腋ニ生ズ。萼ハ邊緣十片ノ狭片ニ分レ、細毛アリ。花冠ハ合瓣ニシテ深く五裂シ、輻狀ヲ呈ス。漿果ハ球形ニシテ赤熟シ、稀ニ頂ニ白點ヲ具フルモノアレドモ普通ニハ全然之レナシ、故ニ目白酸漿ノ名ハ適稱ニ非ズ。

なす科

