

第574圖

じふしちふ科



いぬむらさき (麥家公)

Lithospermum arvense L.

郊外ニ生ズル二年生草本ニシテ、高サ30cm内外。莖ハ枝ヲ分ツ。葉ハ無柄ニシテ互生シ、狭披針形全邊ニシテ莖葉共ニ毛ヲ有ス。春夏ノ候、枝上葉状苞ノ腋ニ互生シテ疎ニ白色小花ヲ開ク。萼五片、裂片狭シ。花冠五裂、筒部稍長シ。果實ハ小形ニシテ灰色ヲ呈シ、光滑ニシテ皺アリ。和名ノ犬ハ、此品むらさきト同屬ナレドモ紫色分ナク、從テ染料トナラザル故云フ。

第575圖

じふしちふ科



ほたるかづら

一名 ほたるさう・ほたるからくさ・るりさう
Lithospermum Zollingeri A. DC.
山野向陽ノ乾燥地或ハ林下半陰處ノ草地ニ生ズル多年生ノ匍匐草本ナレドモ新枝ハ直立シ15-20cm許アリ。匍匐莖ハ瘦細ナレドモ剛質ニシテ粗毛アリ、其末端根ヲ下シ葉ヲ科生シテ新株ヲ成ス。葉ハ柄ナク倒披針形ニシテ互生シ、先端鈍形或ハ圓形、下部ハ楔形ヲ成シ、深綠色ヲ呈シ冬ヲ凌イデ枯レズ、兩面共ニ粗毛ヲ生ジ、毛根ニ硬點アリテ爲ニ極メテ糙澁ナリ。春日枝梢ノ葉腋ニ碧紫色ノ美花ヲ開ク。萼ハ綠色、五深裂シ、裂片ハ線形、亦粗毛アリ。花冠ハ高脚盆形、下部ハ筒狀、絨部ハ平開シ徑15mm許アリテ五裂シ、裂片ハ橢圓形ヲ呈シ、各片ノ中央ハ隆起シテ下部白色ヲ呈シ爲メニ五白線花喉ヨリ射出スルガ如シ。雄蕊ハ五箇、花筒内ニ潜在シ、葯ハ淡黄色。子房ハ四粒狀ヲ成シ、花柱ハ直立シ其高サ雄蕊ト相同ジ。果實ハ堅果ニシテ小形、宿存萼片ニ圍マレ白色平滑ナリ。和名螢蔓・螢草・螢唐草ハ綠草中ニ點々トシテ開ケル其紫花ヲ螢光ニ比セシモノニシテ唐草ハ其蔓ノ見立テナリ。

第576圖

じふしちふ科



わするなぐさ

Myosotis scorpioides L.

(=M. palustris Lam.)

歐洲ノ原産ニシテ花草トシ栽培セラルル多年生草本ナリ。地下莖ヨリ莖ヲ出シ、其高サ30cm内外、疎ニ分枝ス。葉ハ長橢圓狀披針形或ハ倒披針形ニシテ互生シ、下者多少有柄、上者無柄ニシテ莖ト共ニ毛アリ。春夏ノ候、蠅尾狀ノ花穂ヲ成シ、黄心藍色ノ有梗小花ヲ着ク。綠萼五裂。花冠幅狀五裂、花喉ニ五鱗片アリ。五雄蕊。分果無柄。本品ハ Forget-me-notト俗稱ヲ有シ、世間之ヲわすれなぐさと謂ヘドモ、是レ須ラクわするなぐさと稱スベシ、即チ「私を忘るなよ」ノ意デアル。

ひれはりさう

Symphytum officinale L.

歐洲ノ原産ニシテ時ニ栽培セラルル多年生草本。高サ60-90cm許ニ達シ、莖・葉共ニ白色ノ短粗毛ヲ布ク。莖ハ分枝シ、多少ノ翼アリ。葉ハ卵狀披針形ニシテ先端ハ長ク尖ル。下部ノ葉ハ有柄、上部ノ葉ハ無柄ニシテ莖ニ流レ莖上ノ鱗翼ト成ル。花軸ハ一回或ハ二回又岐シ、短キ蠅尾狀ノ花穂ヲ成シ、六七月頃、短梗花ヲ開キ下ニ向フ。綠萼五裂。花冠ハ廣筒狀ニシテ上部鐘形ヲ呈シ、短ク五裂ス。花筒内ニ五雄蕊アリ。分果ハ卵形。花色種々ニシテ紫色・白色・淡紅色・淡黄白色等アリ。和名ハ鱗玻璃草ノ意ナラン、鱗ハ莖ノ翼、玻璃ハ其白花品ニ對シテ名ケシナラン。元來玻璃草トハるりさうノ白花品ノ名ナリ。

第577圖

じふしちふ科



おほはりさう

Symphytum asperum Lepech.

かうかさす地方原産ノ多年生草本ニシテ偶ニ園中ニ栽培セラレ、高サ60cm餘ニ達ス。莖ハ分枝シテ刺毛アリ。葉ハ卵狀披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、全面糙澁ス。下部ノ者ニハ葉柄アレドモ、梢ノ者ハ殆ド無柄ト成リ、而シテ莖ニ流レズ。花軸ハ又岐シ、各枝短キ蠅尾狀ノ花穂ヲ成シ、六七月頃、短梗花ヲ着ケテ下ニ向ヒ、初メ紅紫色ニシテ後藍色ニ變ズ。綠萼五片。花冠ハ長サ凡2cm許、廣キ筒狀ニシテ上部鐘形ヲ呈ス。五雄蕊花筒内ニ在リ。

第578圖

じふしちふ科



はないばな

Bothriospermum tenellum

Fisch. et Mey.

var. asperugoides Maxim.

原野・路傍ニ多ク生ズル二年生或ハ一年生草本。高サ10-15cm許。きうりぐさニ似タリト雖モ、其根生葉ハ彼レノ如ク長柄ナク、葉面ニ皺アリ。淡藍色ノ小花ハ短梗ヲ有シ、春ヨリ秋ニ互リ、枝上ノ葉ト葉トノ間ノ枝ニ着キテ花穂ヲ成シ、萼・花冠共ニ五裂シ、花穂ノ末端同卷セズ。分果ハ橢圓形ニシテ尖ラズ、表面糙澁ス。和名はないばなハ其花葉ト葉ノ間ニ出ヅルヲ以テ葉内花ノ意ナラント思ハル。

第579圖

じふしちふ科

