

第610圖

すすさいこ

Pycnostelma paniculatum K. Schum.

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ60cm内外。根ハ多數鬚状ヲ成シテ短キ地下莖ヨリ發出ス。莖ハ細長ニシテ剛質、直立シ、節間長シ。葉ハ對生シ、細長披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、全邊ナリ。夏日、梢上葉腋ヨリ花梗ヲ出シ、梗上多ク分枝シテ淡黄綠色ノ小花ヲ着ク。其蕾ハ圓クシテ鈴ニ似タリ、故ニ鈴柴胡ノ和名アリ。萼ハ五深裂シ、裂片狭クシテ尖ル。花冠モ亦五深裂シ、卵狀廣披針形。蓋冠ノ五蓋帽ハ鈍圓形。漢名 徐長卿(誤用)



第611圖

ががいも、(蘿藦)

一名 ごがみ・くさばんや
Metaplexis japonica Makino.

原野ニ自生スル多年生纏繞草本。地下莖ヲ引キテ繁殖シ、莖ハ長ク延ビテ綠色ヲ呈ス。長サ2m内外。葉ハ柄ヲ有シテ對生シ、長心臟形ヲ成シ、全邊ニシテ支脈明ナリ。莖・葉ヲ切レバ白汁ヲ出ス。夏日、葉腋ニ長花梗ヲ出シ、梗末ニ短キ花穂ヲ成シテ淡紫色ノ短梗花ヲ開ク。綠萼ハ五深裂シ、裂片狭クシテ尖ル。花冠五裂シ、面ニ毛アリ。花心ニ蓋冠アリ。蓇葖ハ頗ル大ニシテ獸角狀ヲ成シ、面ニ不齊ノ小突起アリ。種子ニ白色ノ種髮ヲ有シ、風ニ從ヒテ飛ブ。種子ノ白絮ハ綿ノ代用トシ、針挿・印肉ニ用キラル。



第612圖

いけま

一名 やまこがめ・こさ
Cynanchum caudatum Maxim.

山地ニ生ズル多年生ノ纏繞草本ニシテ根ハ肥厚シ、地中ニ直下ス。葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ、心臟形ヲ成シテ尖リ、全邊ヲ成ス。夏日、葉腋ニ長梗ヲ抽クコト6-9cm、梗端ニ白色ノ小花ヲ繖形ニ綴ル。綠萼五深裂。花冠亦五深裂、後チ反向ス。花中ニ蓋冠アリ。花後狭長ナル蓇葖ヲ結び熟スレバ自ラ裂ケテ白絮アル種子ヲ飛ハス。和名いけまハあいぬ語ニシテ巨大ナル根ノ意ト謂フ、之レヲ從來生馬ノ意ニ採リ馬ノ藥ト稱スルハ誤解ニシテ元來此根ニハ毒アリ。漢名 牛皮消(慣用)



こいけま

Cynanchum Wilfordi Hemsl.
(=*Vincetoxicum Wilfordi* Franch. et Sav.;
Cynoconum Wilfordi Maxim.)

中部以南ノ山地山足向陽ノ草地ニ生ズル多年生蔓草。根ハ多肉ニシテ白色或ハ黄白色ヲ呈シテ直下シ或ハ横斜シ往々括レアリ。莖ハ纏繞シテ左卷シ、長サ1-3m許、細長ナル圓柱形ニシテ分枝シ綠色ヲ呈シ其皮強韌ニシテ、切レバ白乳液ヲ出ダス。葉ハ對生シ、長キ葉柄ヲ有スレドモ上部ノ者ハ下部ノ者ヨリ短キ葉柄ヲ具ヘ、卵圓形ニシテ急遽短ク或ハ長ク鋭尖頭ヲ成シ、葉底面ハ深心臟狀耳形ニシテ脈上ニ軟毛ヲ生ジ、表面ハ綠色光澤無ク裏面淡綠色ヲ呈シ、之レヲいけま葉ニ比スレバ小形ニシテ且ツ質稍厚ク、長サ5-10cm許アリ。夏日葉腋ニ葉柄ヨリ短キ一梗ヲ抽キ梗頂ニ繖形花序ヲ成シテ多クノ花ヲ着ク。花ハ小梗ヲ具ヘテ小サク、淡黄綠色ヲ呈シいけま花ノ白色ナルト異ナレリ。萼ハ細小ニシテ五裂シ、花冠ノ裂片ハ五ニシテ稍開出スレドモ反卷スルニ至ラズ是レ亦以テいけまト分ツベシ。和名小いけまハいけまニ似テ小形ナレバ云フ。



すすめのをぎけ

誤稱 いよかづら
Cynanchum japonicum
Morr. et Decne.

海邊ノ山野ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-60cm許。莖ハ直立叢生シ、梢ハ往々伸ビテ蔓性ト成ル。葉ハ對生シテ短柄ヲ具ヘ、倒卵形又ハ橢圓形ヲ成シテ短ク尖リ、全邊ニシテ葉質稍厚シ。初夏、梢頭葉腋ヨリ花梗ヲ抽キ、梗頂ニ帶黄白色ノ有梗小花ヲ繖形ニ攢簇ス。綠萼五深裂シ、花冠亦五深裂シ、往々斜メニ反曲ス。花心ニ蓋冠アリ。花後獸角狀ノ蓇葖ヲ結び、白絮アル種子ヲ飛ハス。從來用ウル漢名ノ白前ハ誤用デリ。和名いよかづらモ亦誤用ナルヲ以テ今之ヲ訂正セリ。



第614圖

むらさきすすめのをぎけ

誤稱 すすめのをぎけ
Cynanchum purpurascens
Morr. et Decne.

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30-60cm許。莖ハ細長ナル圓柱形ニシテ直立シ、綠色ナリ。葉ハ短柄アリテ對生シ、倒卵狀橢圓形或ハ橢圓形ニシテ鋭頭ヲ有シ、基脚ハ鈍形或ハ銳形ナリ。夏秋ノ候、葉腋ヨリ花梗ヲ抽出シ、分枝シテ暗紫色花ヲ開ク。綠萼五深裂。花冠亦五深裂。花心ニ蓋冠アリ。花後獸角狀ノ蓇葖ヲ結び、白絮アル種子ヲ迸散ス。

