

第622圖



第623圖



第624圖



ていかかづら (白花藤)
Trachelospermum asiaticum Nakai.
 (= *Malouetia asiatica Sieb. et Zucc.*; *T. jasminoides Franch. et Sav. non Lem.*)
 山野ニ多キ常綠纏繞性藤本。莖ノ大ナルモノハ徑4cm許ニ及ビ、長サ10m餘ニ達ス。葉ハ對生シ、通常倒卵狀披針形ナレドモ又長短廣狹アリテ一様ナラズ。初夏、葉腋或ハ枝梢ニ梗ヲ出シ聚繖狀ニ分枝シテ香氣アル白色花ヲ開ク。綠萼五深裂シ、花冠ハ高盆形ニシテ舷部ハ五裂シ、裂片回旋襞ヲ成ス。花筒中ニ五雄蕊一雌蕊アリ。薔薇ハ細長キ莢ヲ成シ、長サ15-18cmニ及ビ、熟スレバ開裂シテ白絮アル種子ヲ飛バズ。其小形葉ノ者ヲ特ニセキダカヅラト呼ブ。葉形履物ノ雪駄ニ似タルヲ以テナリ。本種ハ往々赤變セル葉ヲ交ユ、古ヘまさきのかづらト呼ビシハ此者ナリ。花戸ニテちやうじかづらト呼ブ者畢竟同種ナリ。漢名 絡石(誤用)

さかきかづら 一名 にしきらん
Anodendron affine Druce.

(= *Holarrhena affinis Hook. et Arn.*; *Aganosma laevis Champ.*; *Anodendron laeve Maxim.*)

暖地ニ生ズル常綠藤本ニシテ全株平滑ナリ。莖ノ長サ4m以上ニ成長シ大ナル者ハ其直徑12cm内外ニ達シ、分枝シテ纏繞性暗紫色ヲ呈セリ。葉ハ對生シ、狹長圓形ニシテ長サ6-10cm許、全緣、革質、上面暗綠色光澤アレドモ下面ハ淡綠色ヲ呈シ、羽狀支脈ヲ有ス。六月ノ候、枝端ニ圓錐狀ノ聚繖花序ヲ出シ多數ノ黃花ヲ群着ス。萼ハ淡綠色ニシテ五裂ス。花冠ハ高盆形ニシテ舷部ハ五裂シ内面ニ花筒ト共ニ鱗片様ノ白毛ヲ生ジ、開花後ニハ旋回ス。五雄蕊花筒内ニ著生シテ潛在シ柱頭ヲ圍ム。果實ハ卵狀紡錘形ノ薔薇ニシテ上部長ク漸殺シ鈍頭ヲ呈シ外皮ハ平滑綠色ニシテ質硬ク、二箇ヲ生ズル時ハ一直線ニ平開シ其全長凡22cmニ及ビ、内ニ白色ノ長キ種髪ト嘴トヲ有スル扁平種子ヲ藏シ、薔薇開裂スレバ其種子果内ヨリ脱出シ其種髪ヲ開キ風ニ從テ遠近ニ飛散ス。和名さかき蔓ハ其葉狀さかき葉ニ似タルヨリ云フ。錦蘭ハ蓋シ其美稱乎。

つるにちにちさう

Vinca major L.

歐洲原產ニシテ偶ニ栽培セラルル多年生草本。莖ハ多少木質ヲ成シ、細長ニシテ横走シ、稍蔓性ナリ。花ヲ出ス莖ハ短クシテ立ツ。葉ハ有柄對生シ、卵狀ニシテ全邊ナリ。夏日、梢葉腋ニ花梗ヲ出シテ上向シ、淡紫色ノ一花ヲ開ク。綠萼五深裂、裂片狹線形ニシテ緣毛アリ。花冠ハ高盆形ヲ成シ、舷部ハ五裂シ、回旋襞ヲ成ス。五雄蕊花筒内ニ在リ。花柱ノ頂ハ輪形。葉緣ニ黃斑アルモノヲふくりんするにちにちさうト云フ。

けふちくたう科
第625圖

にちにちくわ
Lochnera rosea Reichb.
 (= *Vinca rosea L.*)

西印度原產ニシテ各地ニ栽培セラルル一年生草本。莖ハ直立シ、高サ30-60cm許。葉ハ對生シテ葉柄アリ、長橢圓形全邊ニシテ支脈多シ。夏秋ノ頃、莖梢ノ葉腋ニ葉ヲ追テ紅紫花、稀ニ白花ヲ開ク。綠萼五深裂。花冠ハ高盆狀ニシテ下部細長ナル筒ヲ成シ、舷部ハ五裂シ、回旋襞ヲ呈シ、喉邊花色深シ。五雄蕊花筒中ニ在リ。花柱ノ頂ハ輪狀ヲ成ス。花後細長キ薔薇ヲ結ブ。



第626圖



ちゃうじさう
Amsonia elliptica
Roem. et Schult.

原野ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ60cm許、地下莖ハ地中ニ横臥ス。莖ハ直立シ、圓柱形ニシテ梢ニ分枝ス。葉ハ互生シ、全邊披針形ニシテ尖ル。五月頃、莖梢ニ梗ヲ分チ、聚繖狀ニ藍紫色ノ花ヲ開ク。萼ハ五深裂シ、裂片尖ル。花冠ハ高盆狀ヲ成シ、下ハ筒ト成リ筒内ノ上部ニ毛多ク、舷部ハ五裂シ裂片狹長ナリ。五雄蕊花喉ノ下ニ在リ。花柱ノ頂ハ輪形ヲ呈ス。花後兩岐セル莢状ノ薔薇ヲ結ブ。種子ハ圓柱形ヲ成シ細皺アリテ茶色ヲ呈ス。和名丁子草ハ花形ニ依ル。漢名 水甘草(誤用)

第627圖



いはいちゃん
 一名 みづいちゃん
Fauria crista-galli Makino.

高山ノ濕原ニ生ズル多年生草本。地下莖ハ肥厚、横臥シ、下ニ鬚根ヲ出ス。葉ハ根生シテ長柄ヲ有シ、腎臟形ヲ呈シ、葉頭凹入シ、葉邊ニ鈍鋸齒ヲ有ス。八月頃葉間ヨリ綠色ノ花莖ヲ抽クコト凡20cm内外、梢ニ聚繖狀式ニ枝ヲ岐チテ白花ヲ着ク。綠萼ハ五深裂。花冠ハ五深裂、邊緣皺縮シ、中央ニ縦畦アリ。五雄蕊、一花柱アリ。子房ハ花托ノ放大シテ空洞ヲ成スニ由テ半下位狀ノ觀ヲ呈シ、多卵子ヲ含ム。蒴果ハ宿存萼ヲ伴ヒ、殼片長クシテ四裂シ、多種子ヲ出ス。花托ハ倒圓錐狀ヲ呈シテ脈條アリ。和名ノいはいちゃんハ葉形、いはいちゃんハ產處ヲ表ハス。