

第670圖

こはくうんぼく

Styrax Shiraiana Makino.

中部地方ノ深山ニ生ズル落葉灌木。枝ニハ密ニ星狀毛アレドモ後ニ表皮剝離シテ平滑ト成ル。葉ハ扁圓形、長サ5cm内外、先端急ニ凸出シノ不齊鋸齒アリテ頗ル特狀ヲ呈シ、洋紙質ニシテ剛ク表面ノ脈絡ハ陥入シテ皺縮ノ感アリ。夏月開キ花ス。花序ハ枝端ニ頂生シ、總狀ニシテ十花内外ヨリ成リ、星狀毛ヲ密布ス。花ハ下向シテ開キ白色。萼ハ鐘形ニシテ五裂シ更ニ鋸齒ヲ伴フ。花冠ハ漏斗狀鐘形ニシテ長サ2cm許、下ハ筒狀ヲ成シ上ハ五裂ス。雄蕊ハ十箇アリ、花絲ノ下部ハ單體ヲ成シテ花冠筒部ノ内面ニ着ク。子房ハ小形、卵圓形ニシテ細毛ヲ有シ、花柱ハ直立ス。果實ハはくうんぼクニ似テ宿存萼ヲ伴ヒ、中ニ褐色ノ堅硬種子アリ。和名ハ小白云木ノ意ニシテはくうんぼクノ縁者ニテ其樹小形ナレバ云フ。

えごのき科



第671圖

あさから
Pterostyrax corymbosum
Sieb. et Zucc.

(= *Halesia corymbosa* Nichols.)

中部以南ノ山地ニ生ズル落葉喬木ニシテ高サ10mニ達シ多ク枝ヲ分ツ。葉ハ互生シ、有柄ニシテ廣橢圓形、長サ5cm内外、先端ハ急ニ鋭ク尖リ、微凸鋸齒縁ヲ具ヘ、星狀毛アレド、後ニ落ツ、稍革質ナレドモ軟クシテ表面ハ平滑ナリ。六月枝端ニ複繖房花序ヲ頂生ス。花ハ白色、花軸上ニ列ヲ成シテ竝ビ下垂ス。萼ハ細小ニシテ五裂ス。花冠ハ五深裂シテ正開セズ、裂片ハ狹長長橢圓形ヲ成ス。雄蕊ハ十本ニシテ少シク花冠ヨリ超出シ、花絲ハ中部迄相適合シテハ單體ヲ成ス。子房ハ下位ニシテ短倒圓錐形ヲ成シ細毛アリ、花柱ハ直立シテ少シク雄蕊ヨリ高シ。果實ハ下垂シ、倒卵形ニシテ五翼稜ヲ有シ、殆ンド全ク花後ニ膨大セル宿存萼ニ包マル。和名ハ麻殼即チ麻幹ノ意、其材質脆軟ニシテ折レ易ク宛モあさがらノ如ケレバ云フ。

えごのき科



第672圖

おほばあさから

一名 けあさから

Pterostyrax hispidus Sieb. et Zucc.
(= *P. micranthum* Sieb. et Zucc.)

山地ニ自生スル落葉喬木ニシテ、高サ6-9mニ達シ、幹ハ直聳シ、分枝ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、形チ大ニシテ橢圓形ヲ呈シ、先端ハ尖リ、邊緣ニ小鋸齒ヲ列シ、質薄ク、裏面ニハ星芒狀細毛ヲ密布シテ白色ヲ帯ブ。初夏ノ候、新枝端ニ垂下セル圓錐花穂ヲ成シテ下向セル多數ノ白花ヲ綴リ、稍えごのきノ花ニ似テ小シ。果實ハ細長キ核果ニシテ全面ニ茶褐色ノ毛ヲ密生シ、果穂下垂ス。和名ハ大葉麻殼ノ意ナリ。此木質脆ク、折レ易キコト麻殼ノ如ケレバ云フ。

えごのき科



さはふたぎ 一名 にしごり

Symplocos crataegoides
Buch-Ham.

山地ニ生ズル落葉灌木。高サ2.5m内外アリテ枝極多ク、葉亦繁シ。葉ハ短柄ヲ有シテ互生シ、倒卵形ニシテ邊緣ニ小鋸齒ヲ有シ、兩面常ニ粗澁シ、短毛アリ。五月頃、新枝上ニ新葉ト共ニ圓錐狀花穂ヲ成シテ多數ノ白色細花ヲ攢簇ス。綠萼細小、五裂。花冠深ク五裂シ、梅花ノ態アリ。長キ多數雄蕊、一雌蕊アリ。秋日、小キ歪球形ノ核果ヲ結び、熟スレバ藍色ヲ呈ス。和名ハ蓋シ澤蓋木ノ意ニシテ澤水上ニ繁リテ之ヲ覆フヨリノ名ナラン、又にしごりハにしごりトモ云ヒ、錦織木ノ意ナリ、是レ此灰汁ハ主トシテ紫根染ノ時必要ナレバナリ。

はひのき科



第673圖

たんなさはふたぎ

Symplocos argutidens Nakai.
(= *Palura argutidens* Nakai.)

中部以南ノ山地ニ多キ落葉灌木或ハ小喬木ニシテ高サ3-5mニ達ス。幹ハ灰色ニシテ薄ク剝離シ枝極ハ横ニ擴ガリテ繁ク小枝ヲ岐ツ。葉ハ倒卵狀橢圓形ニシテ長サ5cm内外、葉頭急ニ尖リ、底部ハ銳形、稍革質ニシテ裏面脈上ニハ白毛ヲ有シ、周邊ニハ銳鋸齒ヲ具ヘ、嫩キ枝ノ者ニ於テ特ニ然リ。六月ノ候、小枝端ニ圓錐花叢ヲ成スコトさはふたぎノ如クニシテ多數ノ白花ヲ着ケ遠望スレバ白雪ノ如シ。萼ハ綠色ニシテ細小、五裂ス。花冠ハ平開シ徑凡1cm、五深裂シ裂片ハ鈍頭橢圓形、乾ケバ淡黃色ニ變ズ。雄蕊ハ多數、殆ンド花冠ト同長、白花絲ニシテ黃葯。子房ハ下位、細小、花柱ハ白ニ直立ス。十月果實熟シテ微シク歪メル球形ヲ呈シ、黒碧色ト成リ、さはふたぎノ鮮碧色ナルト異ナレリ。和名ハ耽羅澤蓋木ノ意、耽羅ハたんなニテ朝鮮濟州島ノ古名、此樹初メ同島ニ於テ見出セラレタルさはふたぎ類ナルヲ以テ斯ク名ケタルナリ。

はひのき科



第674圖

はひのき

一名 くらび・とちしば・そめしば
Symplocos prunifolia Sieb. et Zucc.

(= *Bobua prunifolia* Sieb. et Zucc.)

暖地ノ常綠喬木ニシテ高サ10m、幹徑30cmニ達シ、枝葉共ニ繁密ナリ。幹并ニ枝極ハ暗棕紫色。葉ハ有柄ニシテ互生シ、廣披針形或ハ橢圓形ヲ成シ長サ3-7cm許ニシテ尾狀銳尖頭、葉底ハ銳形、邊緣ニハ低鈍鋸齒アリ、厚キ革質ニシテ深黒綠色ヲ呈シ光澤アリ。五月ノ候、前年枝ノ葉腋ニ總狀花序ヲ成シテ小梗アル白花ヲ綴リ、花軸ニハ細毛ヲ密生ス。花ハ同屬ノ他種ト大同小異ノ觀アリテ平開シ凡8mmノ徑アリ。萼ハ綠色、細小、五淺裂。花冠ハ五深裂シ、裂片ハ橢圓形、鈍頭。雄蕊ハ多數ニシテ少シク花冠ニ參差ス。子房ハ下位、細小、花柱ハ直立ス。果實ハ卵狀橢圓形ニシテ小柄ヲ有シ初メ綠色、熟スレバ紫黒色ト成ル。和名灰の木ハ灰汁ヲ得ル爲メ枝葉ヲ燒キ灰ヲ製スルヨリ云ヒ、黒灰ハ樹皮ニ基キシ名、染め柴ハ此葉乾ケバ黃色ト成リ其黃汁ニテ菓子等ヲ染ムル故云フ、とちしばハ予其意ヲ解シ得ズ。漢名 山藥(誤用)

はひのき科



第675圖