

第688圖



さくらさう科

やなぎとらのを
Naumburgia thyrsiflora Reichb.
(= *Lysimachia thyrsiflora* L.)

中部以北ノ寒冷ナル濕原ニ生ズル多年生草本。地下莖ハ多節ニシテ匍匐シ各節ヨリ多數ノ鬚根ヲ發出ス。莖ハ無毛、直立シテ30cm内外アリ。葉ハ長サ5-7cm許、無柄ニシテ對生シ、披針形又ハ線状長椭圓形ニシテ漸尖頭、底部ハ稍鈍形ヲ成ス。夏日、葉腋ニ有柄ノ短總狀花序ヲ出シ多數ノ花ヲ密簇スレドモ其花序ハ葉ヨリ短ク且葉間ニ隱見シテ顯著ナラズ。花ハ黃色。萼片ハ六ニシテ狹シ。花冠ハ萼ヨリ長ク深裂セル六片ハ狹長ニシテ鈍頭。六雄蕊ハ花冠ヨリ超出シ、花絲纖長。子房細小、花柱ハ雄蕊ヨリ低シ。果實ハ小球形ニシテ集團シ、熟スレバ開裂ス。和名ハ柳虎の尾ノ意ニシテ其葉ハやなぎ葉ノ如ク、其花穗ハとらのを(をかとらのを)ノ如ケレバ云フ。

第689圖



さくらさう科

をかとらのを
一名 とらのを

Lysimachia clethroides Duby.

山地・原野ニ生ズル多年生草本。地下莖ヲ引キテ繁殖シ、高サ90cm許アリ。莖ハ單一、圓柱形ニシテ直立シ、基部紅色ヲ呈ス。葉ハ互生シ、有柄ニシテ長椭圓状披針形ニシテ尖リ、全邊ニシテ綠毛アリ、葉肉中ニ細微ナル油點ヲ散布ス。夏日、莖頭ニ總狀花穗ヲ成シテ一方ニ傾キ、多數ノ有梗白花ヲ密着シ、毎花下ニ線形ノ綠苞アリ。萼ハ綠色五片ニシテ宿存ス。花冠ハ五深裂。五雄蕊、一雌蕊アリ。花後多數ノ圓キ蒴果ヲ結ブ。從來用キ漢名ノ珍珠菜ハ誤用、又扯根菜ヲ之レニ用ウルモ亦誤ナリ。和名岡虎の尾ハ此種岡ナドニ生エテ、其花穗獸尾ノ如ケレバ云フ。

第690圖




さくらさう科

ぬまとらのを (珍珠菜)
Lysimachia Fortunei Maxim.

水邊ノ濕地ニ多ク生ズル多年生草本ニシテ、地下莖ヲ引キテ繁殖シ、往々群ヲ成ス。莖ハ直立シ、高サ30cm餘、分枝セズ、其基部ハ紅色ヲ帶ブ。葉ハ互生シ、披針形、全邊ニシテ毛ヲ帶ビズ。夏日、莖頂ニ直立ノ總狀花穗ヲ成スコト10cm内外、白色ノ有梗花ヲ開ク。萼ハ綠色五片ニシテ宿存シ、各片鈍頭ヲ成ス。花冠ハ五深裂シ、裂片ハ鈍頭、長椭圓形。五雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ小ニシテ圓形ナリ。漢名宿星菜(誤用)

第691圖



さくらさう科

のちとらのを
Lysimachia barystachys Bunge.

平野或ハ岡原ニ於ケル稍濕潤ノ草地ニ生ズル多年生草本。高サ50-70cm許、全株短粗毛ヲ密布ス。根莖ハ地中ニ横行ス。莖ハ直立シテ通常枝ヲ分タズ、圓柱形、綠色。葉ハ線状長椭圓形、鈍頭、銳底ニシテ多數莖上ニ互生シ、長サ3-5cm許アリ、葉腋ニ短縮セル小枝ヲ有シテ小形葉ヲ着ク。晚春初夏ノ候、莖頂ニ密ニ白花ヲ着ケシ總狀花序ヲ出シ開花期ニハ一方ニ傾キ花ノ開閉アリテ直立ス。花ニハ短梗アリ、細狹ノ綠苞アリテ其長サ稍小梗ト相等シ。萼ハ綠色小形ニシテ五深裂ス。花冠ハ徑1cm未満ニシテ五深裂シ裂片ハ長椭圓形披針形ヲ呈ス。五雄蕊アリテ花冠裂片ノ半長アリ。子房ハ小ニシテ花柱ハ直立シ雄蕊ニリ低シ。蒴果ハ小球形ニシテ多數直立セル果穗ニ着キ熟シテ日ヲ經レバ赤褐色ト成ル。果内ニ細子多シ。和名ハ野路虎の尾ニシテ此種原野ノ路傍ニ生ジ其草とらのを即チをかとらのをニ似タレバズク云フ。

第692圖



さくらさう科

さはとらのを (星宿菜)
Lysimachia candida Lindl.
var. *leucantha* Makino.

水邊濕地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ30cm内外アリテ叢生シ、質軟カナリ。莖ハ直立シ、多クハ分枝セザレドモ、時ニ梢ニ小枝ヲ分ツコトアリ、又梢葉腋ニハ不發育ノ枝ヲ着ケ、二三小葉ヲ有スルコトアリ。莖ヲ通ジテ多數ノ全邊細長葉ヲ互生ス。夏日、莖末ニ總狀花穗ヲ成シテ細長梗アル多數ノ白花ヲ開ク、花穗初メ短カケレドモ果時ニハ長ク延ブ。綠萼ハ五片、裂片ハ卵形ニシテ尖ル。花冠ハ五深裂シ、裂片長椭圓形。五雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ小ニシテ圓形ヲ呈シ、宿存萼ヨリ短カシ。

第693圖



さくらさう科

ぎんれいくわ
一名 みやまたごばう
Lysimachia decurrens G. Forst.
var. *acroadenia* Makino.
(= *L. acroadenia* Maxim.)

諸國ノ山中多濕ノ陰地ニ生ズル多年生直立草本ニシテ高サ30-60cm、全株無毛ナリ。莖ハ分枝シ稜角アリ、又葉裏ト共ニ一面ニ紫點ヲ布ク。葉ハ長椭圓形、兩端尖リ、全邊、長サ10cm内外、質軟ク、有翼ノ長柄ヲ具フ。夏日、梢頭ニ具、花序ヲ立テ小白花ヲ綴リ、花軸ハ初メヨリ真直ニシテ小梗ハ斜メニ開出シ、苞ハ絲狀鍼形ヲ成シテ略ボ小梗ノ半長アリ。萼ハ五裂シ、裂片ハ卵狀鍼形ヲ成シテ尖レリ。花冠ハ萼ヨリ超出シ、五裂片ヲ成セドモ正開セズ、裂片ハ廣椭圓形ニシテ圓頭ヲ有シ基部ハ短ク狭窄ス。五雄蕊ハ花冠喉下ニ着キテ花冠ト同高ナリ。子房ハ小ニシテ卵圓形、花柱ハ直立シテ微ニ雄蕊ヨリ低シ。蒴果ハ圓小ニシテ熟スレバ上部五裂シテ細種子ヲ出グ。和名ハ銀鈴花乎、又深山牛蒡乎、而シテ此名共ニ能ク其眞ヲ顯ハサザルニハ非ザル乎ヲ想フ。