

第718圖



第719圖



第720圖



なつはぜ

Vaccinium ciliatum Thunb.

落葉灌木ニシテ山地ノ林中ニ多シ。高サ2m内外、多ク分枝ス。葉ハ互生シ、橢圓形卵形或ハ長橢圓状卵形ニシテ銳頭、葉縁ニ刺毛ヲ生ズ。初夏、枝梢ニ長サ6cm許ノ總狀花穗ヲ成シ、横ニ出デテ淡黃赤褐色ノ鐘状小花ヲ着ク。十雄蕊、一雌蕊アリテ子房ハ下位ヲ成ス。漿果ハ小球状ヲ呈シ、上部ニ横界線ヲ印シ、帶褐黑色ニ熟シ、果面白粉アリ、小兒採リ食フ。

くろうすご

Vaccinium ovalifolium Smith.

山地ニ生ズル落葉小灌木ニシテ分枝シ、高サ30cm-1m許。葉ハ殆ンド無柄ニシテ互生シ、橢圓形或ハ倒卵状橢圓形ヲ成シ、全邊ニシテ長サ2-3cm許アリ。六七月頃、枝梢上ニ短梗アル白色ノ壺状花ヲ下垂シ、壺口五淺裂シ、中ニ十雄蕊、一花柱アリ。子房ハ下位ニシテ萼短ク淺ク五裂ス。漿果ハ球形ニシテ熟シテ紫黒色ヲ呈シ、食シ得ベシ。和名ハ蓋シ黒臼子ノ意、臼ハ果頂ノ凹處ヲ指ス。

しゃしゃんぼ(南燭)

一名 わくらは
古名 さしぶのき

Vaccinium bracteatum Thunb.

中部以西ノ淺山ニ多キ常綠灌木或ハ小喬木。高サ2-3m許アリテ多ク分枝シ葉繁シ。葉ハ極メテ短キ葉柄ヲ具ヘ、卵形或ハ橢圓状卵形ニシテ兩端尖リ上部ニハ低キ鋸歯ヲ具ヘ、厚キ革質ニシテ滑澤ナリ。初夏ノ候、偏側性ノ總狀花序ヲ腋出シ、壺状長鐘形ノ白花ヲ排列シ垂レ、毎花短小梗アリ、花ニ伴フ苞ハ革質ノ葉状ヲ成シ多クハ花ヨリ大ニシテ且ツ花後ニ至ルモ殘存ス。萼ハ綠色小形ニシテ五深裂シ、裂片ハ三角形ナリ。花冠ハ長サ7mmアリ、長筒形ニシテ壺口五淺裂シ、裂片反曲ス。雄蕊十本アリテ花筒内ニ潛在シ、花絲稍長クシテ細毛アリ、葯胞ハ上部ニ延ビテ細管状ヲ呈シ頂孔ヨリ花粉ヲ繙出ス。子房ハ下位ニシテ短ク、細毛アリ、花柱ハ花筒内ニ直立ス。果實ハ漿果ニシテ小球形、冬ニ入リテ紫黒色ニ熟シ多少ノ白霜ヲ帶ビ味甘酸ニシテ食フベシ。和名しゃしゃんぼハざさんぽ即チ小人坊ニシテ其實圓小ナラベスケ云フ、わくらはハ病葉ニシテ其紅色ヲ帶ビシ嫩葉ヲ病葉ニ擬シテ呼ビシ稱ナリ、古名ノさしぶのきモ亦しゃしゃんぼト同意義ナリ。

いはつつい

Vaccinium praestans Lamb.

高山ニ生ズル草狀ノ落葉矮小灌木ニシテ長キ地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖ハ高サ僅ニ5-15cm許。葉ハ葉柄ヲ具ヘテ莖梢ニ集リ着キ、廣卵形或ハ橢圓形ニシテ短ク尖リ、葉縁ニ細微ノ鋸歯アリ。七月頃、鱗片間ニ花梗ヲ出シ、帶紅白色ノ一二小花ヲ開ク。花冠ハ鐘形、花口五淺裂シ、十雄蕊、一花柱アリ。子房ハ下位ナリ。漿果ハ紅熟シ、球形ニシテ直徑凡1cm餘、食スペシ。

第721圖



第722圖



くろまめのき

Vaccinium uliginosum L.

高山ニ生ズル落葉小灌木ニシテ、高サ3-6cmヨリ1-1.5mニ達シ、繁ク分枝シ、密ニ葉ヲ着ク。葉ハ小ニシテ褐色ノ小枝ニ互生シ、倒卵形ヲ呈シ、全邊ニ無毛ニシテ先端微凸尖アリ。七月、枝端葉間ニ有梗ノ二三壺状花ヲ出ス。花冠帶紅白色ニシテ邊緣淺ク五裂ス。花中ニ十雄蕊、一花柱アリ。子房ハ下位ニシテ萼ハ五裂ス。漿果ハ球形ニシテ紫黒色ニ熟シ、食フベシ。採テじゃむヲ製ス。

こけもも

Vaccinium Vitis-Idaea L.

常綠小灌木ニシテ普通ニ高山ニ生ジ、高サ凡10-15cmアリ。地下莖ヲ引キ、細莖直立ス。葉ハ互生シテ密ニ着キつけ葉ノ態アリ、長橢圓形又ハ倒卵形ヲ呈シ、全邊ニシテ質厚シ。初夏、短キ總狀花穗ヲ成シテ通常四裂セル帶紅白色ノ鐘状花ヲ開ク。八雄蕊、一雌蕊アリテ子房ハ下位ナリ。秋冬、球形ノ漿果ヲ結ビ、熟シテ紅色ヲ呈ス、直徑凡7-10mm、食フベシ。味甘酸ニシテ往々鹽漬トス。樺太ニテハふれづぶト稱シ、酒ヲ造ル。漢名 越橘(蓋シ誤用)

第723圖

