

第742圖



第743圖



第744圖



いはひげ

Cassiope lycopodioides D. Don.

高山向陽地ノ岩石間等ニ簇集シテ株ヲ成セル常綠小灌木ニシテ草本狀ヲ呈ス。莖ハ分枝シテ横ハリ、互ニ糾錯シテ綠色ノ紐狀ヲ呈シ、細小ナル鱗狀葉ヲ密生ス。七月、莖側鱗葉間ニ長サ2-3cm許ノ花梗ヲ抽キテ白色ノ花ヲ開ク。萼五片。花冠ハ鐘狀ニシテ下向シ、邊緣五裂ス。十雄蕊、一雌蕊アリ。上向セル蒴果ヲ結ブ。

つがざくら

Phyllodoce nipponica Makino.

常綠ノ小灌木ニシテ高山ニ生ジ、簇生シ、高サ通常10-15cm許ナレドモ時=25cm許ニ達スルコトアリ。莖ノ下部ハ横斜シ、地上部ハ直立分枝ス。葉ハ小ク、密ニ莖ニ互生シテ相接シ、線形ニシテ邊緣ニ微齒アリ、上面濃綠色、下面ハ褐色ヲ帶ブ。七月ニ枝端ニ二三ノ花梗ヲ抽キ、淡紅色ノ小キ鐘狀花ヲ開ク。萼五片。花冠側向シ、邊緣五裂シ、十雄蕊、一雌蕊アリ。小キ蒴果ハ上向ス。此種葉ハつがノ如ク花ハさくらノ如シトテ此和名アリ。

あをのつがざくら

Phyllodoce aleutica A. Hell.

高山生ノ常綠小灌木ニシテ高サ凡7-15cm許、莖ノ基部ハ横臥シ枝ハ皆上向シ叢ヲ成ス。葉ハ線形或ハ披針形ヲ呈シ枝上ニ密ニ互生シテ相接シ綠色ナリ。七八月ノ間、枝末ノ葉心ニ在ル鱗狀苞ノ腋ヨリ數條ノ有毛花梗ヲ抽テ、下向セル綠白色ノ壺狀花ヲ着ク。萼五片、毛アリ。花冠口ハ五裂シ、花中ニ十雄蕊アリ。蒴果ハ上向ス。和名ハ綠白色ノ花ニ基ク。

第745圖



みねずはう

*Loiseleuria procumbens Desv.
(=Azalea procumbens L.)*

中部以北ノ高山帶ニ生ズル常綠匍匐ノ矮小灌木ニシテ高サ10-15cm許、密ニ座ヲ成シテ平布シ、枝ハ多岐シテ傾上シ或ハ横出ス。葉ハ密生シテ對生シ、極メテ短キ葉柄ヲ具ヘ、廣線形ニシテ長サ1cm内外、先端圓ク、葉緣ハ著シク外反シ且ツ全體下方ニ弓曲シ、平滑革質ニシテ深綠色ヲ呈スレドモ裏面ハ白シ。七月ノ候細花ヲ開ク。花ハ數個枝端ニ集リテ繖形狀ヲ成シ小梗ノ基部ニハ宿存スル苞アリ。萼ハ紅紫色或ハ淡綠色ニシテ上部紫采アリ、五深裂シ、裂片ハ瘦卵形ヲ呈ス。花冠ハ淡紅白色ニシテ上向シ廣鐘形ニシテ五尖裂シ、裂片開出しテ星狀ヲ呈ス。雄蕊ハ五、花絲長ク、葯ハ縱裂シ紫色ナリ。一子房球形綠色、一花柱アリ。蒴果ハ小形ニシテ直立シ、胞間開裂ヲ成シテ三殼片ト成ル。和名峰ずはうハ山上ニ生ズルすはうノ意ニシテすはうハあららぎ即チいちみヲ指セリ、即チ其葉いちはうノ葉ニ似タレバ云フ。

はこねこめつつじ

Tsusiophyllum Tanakae Maxim.

常綠ノ小灌木ニシテ相州箱根ノ山上ニ生ジ、高サ凡20-60cm許、樹幹屈曲シテ繁密ニ分枝シ、枝ハ輪生様ニ出デ、小枝ニハ毛アリ。葉ハ密ニ互生シ、小形ニシテ倒卵狀長橢圓形ヲ呈シ、全邊ニシテ毛ヲ有シ、殆ンド無柄ニシテ、小枝端ニ輪生様ヲ成ス。七月、葉間ニ白色ノ筒狀花ヲ開ク。花冠ノ筒部長ク、邊端五裂シ、花筒中ニ五雄蕊アリテ、葯ハ縱ニ開裂ス。蒴果ヲ結ブ。

第746圖



第747圖



あづまつりがねつつじ

誤稱 つりがねつつじ

Menziesia ciliicalyx Maxim.

落葉灌木ニシテ山中ニ生ジ、高サ凡1-2m許、幹直立シテ分枝ス。葉ハ互生シテ短キ葉柄ヲ具ヘ、倒卵形全邊ニシテ綠毛アリ、表面綠色、裏面帶白色、小枝端ニ集リテ輪生狀ヲ呈ス。六月ノ候、枝端ニ長サ2-3cmノ有毛花梗數條ヲ繖形狀ニ出シ、1.5cm長ノ筒狀鐘形花ヲ垂ル。萼ハ小ニシテ五片、邊緣刺毛ヲ有ス。口緣五裂セラ花冠ハ白質ニシテ上部紅色ヲ呈シテ頗ル美ナリ。うらじろやうらくハ本品ノ一變種ニシテ其萼片全部或ハ一部長シ、學名ヲvar. *multiflora* Makino ト云フ。主トシテ我邦北地ノ山ニ見ル。