

第838圖

からかさばな科



こえんごろ (胡荽)
Coriandrum sativum L.

東歐原産ノ一年生草本ニシテ高サ凡30-60cm許アリ。莖ハ直立シテ疎ニ分枝シ、細長ニシテ中空ナリ。葉ハ互生シ、質薄クシテ一種ノ臭アリ、脚葉ハ單羽狀或ハ再羽狀ニシテ裂片廣闊ナリト雖モ、上部ノモノハ再羽狀或ハ三羽狀ヲ成シテ裂片狭長ナリ。根生葉并ニ脚葉ハ長柄ヲ有シ、莖生葉ハ柄漸ク短ク、共ニ柄本ハ鞘ヲ成ス。夏日、每枝頂ニ複繖形花穂ヲ着ケ、小白花ヲ開ク。花瓣五片。外圍ノ花ハ外方ノ花瓣殊ニ大ナリ。五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ圓形ニシテ香氣ヲ有シ、往々之レヲ香料トシ、又藥用ニ供ス。生苗葉ヲ時ニ香味料トス。和名ハぼるとがる語ノ coentro ニ出ヅ。

第839圖

からかさばな科



やぶじらみ
Torilis Anthriscus Gmel.

越年生草本ニシテ原野路傍ニ普ク生ジ、高サ60cm内外。莖ハ直立シテ分枝シ、葉ト共ニ毛ヲ被フル。葉ハ互生シ、再羽狀ニ細裂シ、小葉ハ卵狀披針形ニシテ尖鋸齒アリ、根生葉ニハ長柄アリ、莖生葉ハ其柄漸ク短ク、共ニ柄本ハ鞘ヲ成ス。夏日、小枝頂ニ複繖形花穂ヲ成シ、小白花ヲ開ク。五花瓣内曲、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ卵狀橢圓形ニシテ刺毛多シ。果實熟スレバ能ク他物ニ着ク、故ニ藪虱ノ和名アリ。漢名 竊衣(慣用)

第840圖

からかさばな科



をやぶじらみ
Caulalis scabra Makino.

越年生草本ニシテ原野ニ多ク生ジ、高サ60cm許ニ達シ分枝シ、葉ト共ニ細毛アリ。葉ハ互生シ、再羽狀ヲ成シテ細裂シ、葉裏往々白色ヲ帯ビ、又莖ト共ニ紫色ヲ帯ブ。初夏、小枝頂ニ複繖形花穂ヲ成シテ白色又ハ帯紫色ノ小花ヲ開キ、大繖小繖共ニ繖梗少ナシ。五花瓣内曲、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ大ニシテ卵狀長橢圓形ヲ呈シ、毛刺多ク、能ク他物ニ着キ、通常紫彩ヲ帯ブ。

やぶにんじん
一名 ながじらみ

Osmorhiza aristata Makino et Yabe.
多年生草本ニシテ山野ノ樹陰竹林等ニ生ジ、高サ40-60cm許。根ハ質稍硬ク、莖ハ直立シテ分枝シ、葉ト共ニ毛ヲ帯ブ。葉ハ質稍柔ニシテ再羽狀複葉ヲ成シ、小葉ハ卵形ニシテ疎鋸齒アリ。根生葉・脚葉ニハ長柄ヲ有シ、莖生葉ハ其柄漸ク短ク、共ニ柄本ハ鞘ヲ成ス。春末、枝梢ニ複繖形花穂ヲ成シテ小白花ヲ開キ、小繖ニハ雄花ト兩性花トヲ交ユ、大繖小繖ニハ五片ノ苞アリ。五花瓣内曲、五雄蕊、下位子房アリ。果實ハ狭長ニシテ下部漸殺シ、頂ニ二尖ヲ成セル花柱ヲ遺シ、偃毛アリ。本種ノ漢名ヲ野胡蘿蔔ト稱スルハ非ニシテ、其品ハ胡蘿蔔即チにんじんノ野生品のらにんじんヲ指ス。

第841圖

からかさばな科



こしゃく

Anthriscus nemorosa Spreng.
(=Chaerophyllum nemorosum Bieb.)
山中多濕ノ地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ1mニ達ス。根ハ多肉粗大ニシテ地中ニ直下ス。莖ハ直立シテ無毛、縱溝アリ、疎ニ分枝シ綠色ナリ。葉ハ長柄ヲ具ヘテ互生シ、概形三角形、再羽狀ト成リ、裂片ハ更ニ羽狀ニ深裂シ、中裂片ハ長橢圓形鈍頭ナリ。六七月ノ候、莖頂ニ平面ノ複繖形花序ヲ成シ、碎白花ヲ綴リ、繖梗五六條、總苞片ヲ缺キ、小繖梗六七條、披針形ノ小總苞數片ヲ伴ヒ著ルシ。花ハ外輪ノ者大キク、且其花瓣ハ外方ノ一片ヨリ大キク、何レモ倒卵形ニシテ平開シ上部内曲ス。花瓣ハ五、倒卵形、上端ハ内曲ス。雄蕊ハ五。子房ハ下位、二花柱外方ニ反曲ス。果實ハ細長ナル圓柱狀、表面滑澤、縱脊ハ不顯著、八月既ニ熟シ黑色ヲ呈シ長サ1cmニ滿タズ。但人此根ヲ晒シ粉末ト爲シ食用トス。從來本品ヲしゃくト呼ビシガ今之レヲこしゃくと訂正ス。和名 小しゃくハ小形ノしゃくノ意、此種しゃくニ比スレバ其草極メテ小ナレバスク云フ、しゃくの意ハ不明、而シテしゃくハ又さくと呼ビししうど云フ。

第842圖

からかさばな科



うまのみつば (山芹菜)

一名 おにみつば
Sanicula elata Ham.
var. chinensis Makino.

多年生草本ニシテ山林樹下ノ陰地ニ生ジ、高サ凡30-50cm許。莖ハ直立シテ分枝ス。葉ハ三裂シ、側者ハ更ニ二深裂スルヲ以テ五裂掌狀ノ狀ヲ呈シ、深綠色ニシテ表面皺縮シ、裏面ハ葉脈隆起シ、葉縁ニ鋸齒アリ。根生葉ハ長柄ヲ具ヘ、莖生葉ハ其柄漸ク短ク、共ニ柄本ハ鞘ヲ成ス。夏月、梢ニ小枝ヲ分チテ小形ノ複繖形花穂ヲ着ケ、無柄ノ小白花ヲ開ク。小繖中ニ兩性花・雄花アリ。五花瓣内曲、五雄蕊アリ、下位子房ニ長粗毛アリ。果實ハ圓形ニシテ鉤粗毛ヲ密生ス。漢名 變豆菜(誤用)

第843圖

からかさばな科

