

第886圖

ひ
し
科

第887圖

の
ぼ
た
ん
科

第888圖

て
ん
に
ん
く
わ
科

ひめびし *Trapa natans* L. var. *incisa* Makino.

一年生草本ニシテ池沼中ニ生ジ、細長ナル莖ハ水ノ深淺ニ從ヒ自ラ長短アリ。水中ノ莖上各節ニ二三條ノ絲狀根アリテ多數ナル絲狀ノ分枝アリ。葉ハ小ニシテ横徑2cm許、卵狀菱形ヲ呈シ、尖鋸齒アリ、上面光滑ニシテ下面ハ葉脈隆起シ多少毛アリ、葉々莖頭ニ簇集シテ四方ニ織開シ、水面ニ浮泛シテ長葉柄ヲ具フ。柄ノ上部ニハ膨腫部アリテ中ニ空氣ヲ有シ、浮泛ヲ助ク。夏日、有梗白花ヲ葉間ニ出ス。四萼片、四花瓣、四雄蕊、一花柱、下半位子房アリ。核果ハ小形ニシテ四棘刺アリ。棘刺ハ宿存萼片ノ變ジタルモノナリ。

のぼたん (山石榴)

Melastoma candidum D. Don
var. *Nobotan* Makino.

琉球・臺灣等ニ産シ、内地ニテハ時ニ栽培セラルル常緑ノ灌木ニシテ幹ハ分枝ス。葉ハ對生シテ短柄ヲ有シ、卵形又ハ橢圓形ニシテ葉上ニ粗毛多ク、大ナル葉脈數條縱通ス。夏日、枝頭ニ大ナル淡紫色ノ美花ヲ開キ、花梗ハ短シ。萼五片、子房ト共ニ臥毛アリ。花瓣ハ五片ニシテ回旋鑿ヲ成シ、黃色長葯ノ十雄蕊、一花柱ヲ有ス。花後球果ヲ結ビ、後一方開裂シテ赤キ胎座ヲ露出シ、種子ハ細小ナリ。和名ハ琉球名ノ野牡丹ニ出ヅ。

ゆうかりじゅ

Eucalyptus globulus Lab.

濠洲原産ノ常緑喬木ニシテ直幹聳立シ、100m以上ニ成長シ、多ク分枝シテ葉極メテ繁シ。老樹ハ幹皮能ク剝脱ス。葉ハ低枝ノ者ハ卵形ニシテ對生シ、高枝ノ者ハ披針形ヲ成シテ多少彎曲シ、全邊ニシテ表裏ナク、葉肉内ニ小油點ヲ散布シ、樟香アリ。夏日、枝上葉腋ニ綠白色ノ一花ヲ生ジ、極メテ短キ花梗ヲ具フ。萼片合體シテ帽笠狀ヲ成シ、花瓣ト共ニ早く散落シ、多數ノ雄蕊ヲ露出ス。果實ハ倒卵狀ニシテ粗面ヲ有シ、硬シ。樹脂ヲ採リテ藥用ニ供ス。明治十年頃渡來シ、其際之レヲ有加利樹ト書キタリ。

てんにんくわ (桃金娘)

Rhodomyrtus tomentosa Hassk.

常緑小灌木ニシテ琉球・臺灣等ノ暖地ニ生ジ、内地ニテハ時ニ之レヲ溫室内ニ見ル。莖ハ直立シテ分枝シ、枝ハ葉・花梗・花果ト共ニ白毛ヲ被フル。葉ハ有柄對生シ、長橢圓形全邊ニシテ質厚ク、三條ノ主脈縱通ス。夏日、枝上ノ葉腋ニ小枝ヲ出シテ分梗シ、梗端ニ紅紫色ノ美花ヲ開ク。萼片五、花瓣五片、外面ニ細毛ヲ布ク。多雄蕊、一花柱アリ、子房ハ下位。果實ハ廣橢圓狀圓形ニシテ細種子アリ。

しくんし (使君子)

Quisqualis indica L.
var. *villosa* Clarke.

支那ノ暖地ニ生ズル常緑ノ藤本ニシテ莖ハ長ク蔓延シ、細毛ヲ帶ブ。葉ハ對生シテ短柄ヲ具ヘ、長橢圓形ニシテ短ク尖リ、全邊ニシテ毛ヲ帶ブ。夏日、莖端ニ穗狀花穗ヲ成シテ疎ニ紅色ノ無梗花ヲ對生シ、下向シテ開キ、花軸ニ細毛アリ。萼筒極メテ長クシテ宛モ柄ノ如ク、上端五裂ス。花瓣五片、回旋鑿ニシテ平開シ、十雄蕊、一花柱アリ、子房ハ下位ナリ。果實ハ五稜ヲ成シテ兩端尖レリ。此品今普通ニ之レ無ク、只僅ニ偶ニ溫室内或ハ暖地ニ見ルノミ。葉ニ毛ナキ者ヲいんどしくんしト稱ス、即チ *Q. indica* L. ナリ、しくんしハ此一變種ニ係ル。

うりのき (八角楓)

Marlea platanifolia Sieb. et Zucc.
var. *macrophylla* Makino.

山中樹下ノ地ニ生ズル落葉灌木ニシテ、高サ3m許、疎ニ分枝シ、材ハ軟ナリ。葉ハ互生シテ長柄ヲ具ヘ、廣闊薄質ニシテ三、五、七角尖ヲ成シ、葉底ハ心臟形ヲ呈シ、葉緣ニ鋸齒ナシ、主脈ハ掌狀ヲ成シ五條アリ。夏日、葉腋ニ花梗ヲ出シテ上部疎ニ分枝シ、小梗端ニ各可ナリ大ナル白花ヲ着ク。萼短微、花瓣六片、線形ニシテ反卷シ、雄蕊ハ花瓣ノ倍數アリテ黃葯瘦長ナリ。果實ハ廣橢圓狀球形ニシテ熟シテ藍色ヲ呈ス。和名瓜の木ハ其葉、瓜葉ニ似タル故云フ。

第889圖

て
ん
に
ん
く
わ
科

第890圖

し
く
ん
し
科

第891圖

う
り
の
き
科