

第892圖

ざくろ科



ざくろ (安石榴)

Punica Granatum L.

小あじあ邊ノ原産ニシテ通常庭園ニ栽植スル落葉喬木。高サ10m許ニ達シ、幹ハ繁ク分枝シ、嫩枝ハ四稜ヲ成シ、又棘枝アリ、材ハ黄色ヲ呈ス。葉ハ略對生シテ短柄ヲ有シ、狹長長橢圓形或ハ長倒卵形全邊ニシテ滑澤ナリ。六月頃、梢頭ニ多數ノ短梗花ヲ着ケテ開謝相次グ。萼ハ筒狀ヲ成シ、多肉ニシテ六裂シ、表面平滑ニシテ赤色ヲ呈シ、雌性花ニ在テハ稍膨大シ、雄性花ノ者ハ倒卵狀ヲ成ス。花瓣ハ赤色六片ニシテ多少皺アリ。多雄蕊花喉ニ出デ、子房ハ萼筒ニ合同シテ下位ヲ成ス。果實ハ球形ニシテ頭ニ宿存萼裂片ヲ戴キ、果皮黄色肥厚ニシテ不齊ニ開裂シ、種子ヲ露ス。種子ハ往々淡紅色ヲ呈シ、外種皮透徹シテ酸甘ノ液汁ニ富ミ食スベシ。重瓣花ノ品ヲはなざくろト呼ビ、之レニ對シ結實品ヲみざくろト云フ。根ヲ驅蟲藥トス。和名ハ石榴ノ音ニ基ク。

第893圖

みそはぎ科



さるすべり (紫薇)


一名 ひやくじっこう

Lagerstroemia indica L.

支那ノ原産ニシテ通常觀賞樹トシテ庭園ニ栽植スル落葉喬木。高サ3-7m許、枝繁クシテ擴ガリ、小枝ハ四稜ヲ呈シ、樹皮ハ褐色ニシテ滑澤ナリ。葉ハ對生或ハ略ボ對生シ、殆ンド無柄ニシテ橢圓形或ハ倒卵形ヲ成シ、全邊ニシテ質稍厚シ。夏秋ノ間枝端ニ圓錐花穂ヲ成シテ紅色或ハ時ニ白色ノ花ヲ簇着シ、開謝相次ギ、花期頗ル長シ。萼ハ球形ニシテ六裂シ、往々紅紫色采アリ。六花瓣圓形ニシテ著シク皺縮シ、長花爪ヲ具フ。雄蕊多數、外圍ニ長キ六雄蕊アリ。雌蕊一、一花柱雄蕊上ニ出ツ。蒴果ハ橢圓形ニシテ殼片硬シ。和名猿滑リハ其樹膚滑澤ニシテ猿モ亦滑リ落ルト云フヨリ名ク。又ひやくじっこうハ漢名ノ百日紅ニ基ク、即チ其花期ノ長キヲ表ハセリ。

第894圖

みそはぎ科



きばなみそはぎ

Heimia myrtifolia

Cham. et Schlecht.

南米ふらじ原産ノ落葉小灌木ニシテ我邦ニハ明治時代ニ渡來シ、植物園等ニ栽植セラレ、世間一般ニハ之レヲ見ズ。直立叢生シ、高サ1m内外ニ達シ、繁ク分枝シ、枝條瘦細ナリ。葉ハ對生并ニ互生シ、殆ンド無柄ニシテ披針形ヲ呈シ全邊ニシテ枝葉頗ルおとぎりさう屬ノ姿態アリ。夏日、葉腋ニ稍無梗ノ黄色花ヲ開ク。萼ハ綠色鐘形ニシテ十二齒ニ分裂シ、圓形平開ノ六花瓣ト十二雄蕊トアリ。一花柱アル一子房アリ。蒴果ハ球形ニシテ宿存萼ニ包マル。

きかしくさ


Rotala indica Koehne

var. uliginosa Miq.

田間或ハ濕地ニ生ズル一年生ノ柔軟ナル草本ニシテ高サ12-15cm許アリ。下部場地シテ通常分枝シ、節ヨリ白色ノ鬚根ヲ下シ、上部直上シ、通ジテ葉ヲ有シ、圓柱形ニシテ往々紅紫色ヲ呈ス。秋ニ至テ時ニ多クノ短キ小枝ヲ出ス。葉ハ小形對生シ、無柄ニシテ橢圓形或ハ倒卵狀長橢圓形ヲ成シ、全邊ニシテ鈍頭ナリ。夏秋ノ候、葉腋ニ淡紅色ノ單獨無柄ノ細花ヲ開キ、花下ニ二小苞アリ。萼ハ筒狀四裂シテ裂片尖リ、四花瓣細小ニシテ萼縁ニ着ク。四雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ橢圓形ニシテ宿存萼ヲ伴フ。

第895圖

みそはぎ科



みづきかしくさ


Rotala leptopetala Koehne

var. littorea Koehne.

主トシテ田面ニ生ズル一年生草本ニシテ高サ凡10-30cm許アリ。莖ハ淡綠色ヲ呈シ、基部往々横斜シ、白色ノ鬚根ヲ下シ、上部直立シテ通常分枝ス。葉ハ無柄、對生、披針形ヲ成シテ尖リ、全邊ニシテ莖ト共ニ質柔ナリ。秋日、葉腋ニ各一ノ淡紅白色ナル無柄小花ヲ開ク。萼筒四裂シテ裂片尖リ、四花瓣萼筒部ニ着生ス。四雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ球形ニシテ紅紫色ヲ呈シ、宿存萼ヲ伴フ。

第896圖

みそはぎ科



みづすぎな

Rotala Hippuris Makino.

池中ニ生ズル多年生草本ニシテ、外形すぎなもノ外觀ヲ有ス。根莖ハ水底ノ泥中ニ横行シテ鬚根ヲ生ジ、莖ハ直上シ、往々脚部ニ於テ分枝シ、有節ノ圓柱形ヲ成シテ、上部ハ水面上ニ挺出ス。葉ハ輪生シ、沈水葉ハ絲狀ヲ呈シ、先端微シク二裂、氣中葉ハ綠色ヲ呈シテ闊ク且短シ。夏日、各葉腋ニ白色ノ細小白花ヲ單生シ、相並ンデ輪生ス。萼ハ筒狀鐘形ニシテ四裂シ、裂片尖リ、四花瓣萼縁ニ着キ、四雄蕊、一雌蕊アリ。蒴果ハ球形ニシテ宿存萼ニ擁セララル。

第897圖

みそはぎ科

