

第970圖



いはおとぎり

Hypericum kamtschaticum Ledeb.
中部北部ノ高山ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ12-30cm許アリ。莖ハ直立シテ梢ニ短キ枝ヲ分チ、多クハ數莖叢生ス。葉ハ無柄ニシテ對生シ、橢圓形或ハ卵圓形ヲ成シ、全邊ニシテ細黑點ヲ散布ス。秋日、梢ニ有梗ノ黄花ヲ開キ、花徑凡2cm許アリテ美ナリ、蕾ノ時花瓣ノ外面往々赤色ヲ帶ブ。綠萼五片アリ。花瓣五片、日ヲ受ケテ平開ス。黄色ノ多雄蕊三束ヲ成シ、子房ニ長キ三花柱アリ。蒴果ヲ結ビ、宿存萼ヲ伴ヒ、細種子多シ。

おとぎりさう科

第971圖



につくわうおとぎり

Hypericum nikkoense Makino.

下野日光山ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡50cm許ニ達ス。莖ハ叢生シ、直立或ハ基部傾上シ、細長平滑ナル圓柱形、微ニ平扁、梢ニ分枝シ、下部ハ褐紫色ナレドモ上部ハ生時綠色ヲ呈ス。葉ハ對生、無柄、開出シ、狭披針形・披針形・線狀長橢圓形或ハ長橢圓狀披針形、鈍頭或ハ微凹頭、底部鈍圓ニシテ半バ抱莖シ、閃點滿布シ葉縁ニハ黑點アリ、裏面ハ多少帶白色、長サ35mm、幅15mmニ達ス。聚繖花序ハ頂生シ可ナリ多數ノ短梗黄花ヲ着ケ、花徑12-16mmアリ。萼ハ五片、大小不同、披針形、稍鈍頭、花時3-8mm長アリ。花瓣五片、平開、萼ヨリ長ク長橢圓形、鈍圓頭、三束ヲ成シ黄色ナリ。子房ハ卵狀圓錐形、三室、三花柱アリ。蒴ハ狹圓錐形ニシテ尖リ長サ7-10mm許、三縱溝ヲ印シ、三室ニシテ多種子アリ。頗ルふじおとぎりニ似タリト雖モ其葉閃點アルヲ以テ此兩種ヲ別ツコト容易ナリ。和名日光弟切ハ日光山ニ生ズルヨリ名ケタリ。

おとぎりさう科

第972圖



しなのおとぎり

Hypericum senanense Maxim.

中部日本ノ高山ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ15-25cm許アリ。莖ハ數條叢生シテ直立シ、梢末ハ通常短ク分枝ス、圓柱形ニシテ微ニ線條アリ。葉ハ無柄ニシテ對生シ、底部ハ莖ヲ擁シ、卵狀長橢圓形ニシテ鈍頭ヲ有シ、全邊ニシテ透光の細點ヲ極メテ疎ニ散布シ或ハ不明ナリ。夏日、莖梢ニ有梗ノ黄花ヲ開キ美ナリ。花徑2cm内外。綠萼五片。花瓣五片。多雄蕊黄色。子房三花柱。蒴果ハ宿存萼ヲ伴ヒ、細種子アリ。和名信濃弟切ハ此品信州ニ生ズルニ由ル。


おとぎりさう科

えぞおとぎり

Hypericum yezoense Maxim.

北海道并ニ北日本ノ山地ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ10-30cm許アリ。莖ハ直立シ、圓柱形ニシテ稍有稜、梢ニ短ク分枝ス。葉ハ無柄、對生シ、長橢圓狀披針形、鈍頭、全邊ニシテ密ニ散布セル多數ノ透光の細點アリ。夏日、莖梢ニ黄花ヲ開ク。綠萼五片ハ長卵形ニシテ鈍頭ヲ成シ、花瓣五片、多雄蕊ハ三束ヲ成シ、卵形ノ子房ニ長キ三花柱アリ。

第973圖



おとぎりさう科

ともゑさう (連翹)

Hypericum Ascyron L.

山野向陽ノ草地ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ60-90cm許アリ。莖ハ直立シテ分枝シ、四稜ニシテ上部綠色、下部ハ淡褐色ヲ呈シテ木質ヲ成ス。葉ハ無柄ニシテ對生シ、莖ヲ抱キ、披針形、鈍頭、全邊ニシテ質薄ク、透光の細點ヲ疎布セリ。夏秋ノ候、枝頂ニ大形ノ黄花ヲ着ケ、一日花ニシテ日光ヲ受ケテ開ク。綠萼五片、卵形。花瓣五片、歪形ニシテ一方ニ回旋ス。黄色ノ多雄蕊五束ヲ成シ、中央ノ子房一花柱アリテ頂ハ五枝ニ分レ枝端ニ各柱頭アリ。蒴ハ大形ニシテ卵圓形ヲ呈シ、宿存セル花柱ヲ戴キ、五穀片ニ開裂シ、多數ノ細種子ヲ出ス。和名ハ巴草ノ意ニテ其花瓣ノ狀ニ基ヅク。漢名連翹ハ原ト本品ノ稱ナリ、後チ誤テヒラギ科ノ所謂レんげうノ名トス、非ナリ。

第974圖



おとぎりさう科

第975圖

きんしばい (雲南連翹) (一名芒種花)

Hypericum patulum Thunb.

通常人家庭園ニ見ル半落葉小灌木ニシテ褐色ノ多枝ヲ分チ叢ヲ成ス、原ト支那ノ産ナリト雖モ今ハ往々我邦山地ノ人家附近ニ自生ノ姿ヲ成ス。高サ1m内外。葉ハ無柄、對生シ、卵狀長橢圓形全邊ニシテ、質稍薄ク裏面白綠色ヲ呈シ、透光の油點疎布ス。夏日、枝梢ニ美ナル有梗黄花ヲ開キ、聚繖狀ヲ成ス。萼五片、綠色。花瓣五片、圓形、回旋裝、質稍厚ク、光澤アリ。黄色ノ多雄蕊ハ五束ヲ成ス。子房ニ五花柱アリ。蒴ハ卵形ニシテ宿存萼ヲ伴ヒ、五開裂ス。和名ハ從來慣用セル金絲梅ノ漢名ニ基ヅク。



おとぎりさう科