

第976圖

おとぎりさう科



第977圖

おとぎりさう科



第978圖

つばき科



ひやうやなぎ

Hypericum chinense L.

支那ノ原產ノ半落葉小灌木ニシテ、人家ニ栽植セラレ、高サ1m内外アリ、多ク分枝シ、褐色ナリ。葉ハ無柄、對生シ、長橢圓狀披針形ニシテ鈍頭ヲ有シ、全邊ニシテ質薄ク、葉中ニ細微ナル透光的油點密布ス。夏日、梢頭ニ聚繖花ヲ成シテ大ナル有梗ノ黃花ヲ開ク。綠萼五片。花瓣五片、倒卵形。雄蕊多數ニシテ基部五束ト成リ、黃色ニシテ花絲ハ絲狀ナリ。子房ニ長キ一花柱アリテ頂五岐ス。蒴ハ宿存萼ヲ伴フ。和名ハ未央柳ノ意乎或ハ美容柳ノ意乎未詳ナレドモ共ニ其美花賞讚ニ基ヅク。漢名 金線海棠(慣用)

つきぬきおとぎり(元寶草)

Hypericum Sampsoni Hance.

支那ニ多シト雖モ我邦ニモ亦稀ニ野外ニ生ズル多年生草本ニシテ、高サ50cm許ニ達ス。莖ハ直立シテ分枝ス。葉ハ全邊、鈍頭、長橢圓狀披針形ニシテ對生シ、其兩葉ハ葉底聯合シテ莖其中央ヲ串穿スルガ如ク、葉中ニ細微ノ透光油點アリ。秋日、梢ニ聚繖花序ヲ成シ、有梗ノ黃色小花ヲ開ク。綠萼五片。花瓣五片アリ。多雄蕊黃色ニシテ三束ト成リ、三花柱ヲ有ス。蒴果ヲ結ブ。

ひさかき(野茶)

Eurya japonica Thunb.

山地ニ多ク生ズル常綠灌木或ハ亞喬木ニシテ、多枝繁葉ヲ有シ、往々庭樹トシテ栽植セラル。葉ハ短柄ヲ具ヘテ無毛ノ枝上ニ互生シ二列生ヲ成シ、倒披針形ニシテ鈍頭ヲ有シ、細鋸齒アリ、質稍厚クシテ毛ナシ。初春ニ枝上葉腋ニ一乃至三ノ有梗小白花ヲ東生シ、往々帶紫色ヲ呈シ、下向シテ開ク。萼五片、暗紫色。五花瓣アリ。雄花・雌花・兩性花アリテ各株ヲ異ニス。雄蕊ハ多數。一子房、三岐セル花柱アリ。漿果ハ紫黑色ニ熟シ、小種子多シ。漢名 桤(慣用、蓋シ誤用)

はまひさかき

Eurya emarginata Makino.

我邦西南暖地ノ海岸ニ生ズル常綠ノ灌木ニシテ、高サ1.5m内外、多枝繁葉ヲ有シ、小枝ニハ褐色ノ細毛密生ス。葉ハ相接近シテ互生シ、質厚ク、短柄ヲ具ヘ、長倒卵形ニシテ凹頭ヲ有シ、下部略ボ楔形ヲ呈シ、鈍鋸齒アリ。春月、枝上葉腋ニ綠白色ノ有梗數花ヲ東生ス。五萼片、五花瓣アリ。雌雄異株ニシテ雄花ハ多雄蕊ヲ有シ、雌花ハ一雌蕊アリ。漿果ハ球形ニシテ紫黒色ニ熟シ、細種子アリ。

第979圖

つばき科



第980圖

つばき科



さかき

Cleyera ochnacea DC.

我邦中部ヨリ以南諸州ノ山林中ニ生ズル常綠ノ亞喬木ニシテ又通常神社庭或ハ墓地ニ栽植セラル。葉ハ有柄互生シテ二列生ヲ成シ、長橢圓狀倒卵形ニシテ鈍端銳頭ヲ有シ、全邊ニシテ質厚ク、平滑ナリ。枝端ノ芽ハ弓曲シテ鳥爪狀ヲ呈ス。夏日、有梗花ヲ腋生シ、一乃至三花束生シ、下向シテ開ク。綠萼五片。花瓣五片、下部聯合シ、白色ニシテ後帶黃色ト成ル。雄蕊多數、藥ニ逆毛アリ。雌蕊一。漿果ハ球形、黑熟シ、多種子アリ。俗ニ櫟ヲ用ウ、和字ナリ。和名ハ榮樹ニテ四時常綠ナレバ云フト謂ヘリ。漢名 楊桐(蓋シ誤用)

第981圖

つばき科



もっこく(厚皮香)

Ternstroemia japonica Thunb.

我邦暖地ノ山ニ生ズル常綠喬木ニシテ往々大樹ト成ル、又庭樹トシテ人家ニ栽植セラル。葉ハ有柄互生シ、全邊ニシテ長橢圓狀倒卵形ヲ成シ、鈍頭ヲ有シ、下部楔形ヲ呈ス、平滑ニシテ質厚ク、無毛ナリ。夏月、枝上ニ長梗ヲ有ス小白花ヲ開キ、下ニ向フ。綠萼五片。花瓣五片、平開ス。多雄蕊、一雌蕊。漿果ハ球形或ハ廣橢圓形ニシテ皮厚ク、開裂シテ丹赤色ノ種子ヲ露ハス。