

第982圖

つばき科



ひめしゃら
一名 さるなめり・あからぎ
Stewartia monadelpha
Sieb. et Zucc.

山林中ニ生ズル落葉喬木ニシテ幹ハ直立シ、著シキ高サニ達ス。樹皮ハ平滑ニシテ淡赤黄色ヲ帯ビ、林中ニ在テ特色ヲ呈ス。葉ハ有柄互生シ、鋭尖頭ヲ有スル長卵形ニシテ鋸齒ヲ有シ、葉質稍薄クシテ裏面ニ細毛ヲ布ク。夏月、枝上ニ白色ノ有梗花ヲ腋生シ、花下ニ二片ノ葉狀苞ヲ具フ。綠萼五片。花瓣五片、下部聯合ス。單體多雄蕊、一雌蕊アリ、花柱ハ五岐ス。蒴果ヲ結ビ、五殼片ニ開裂ス。和名ハ姫娑羅ニシテなつつばきヲ誤テ娑羅樹ト云ヒ、本種ハ其樹ニ類シテ小ナル故云フ。又樹皮平滑ナル點ハやくじつこうニ似ルヨリさるすべリノ一名アリ。

第983圖

つばき科



山中ニ生ズル落葉喬木ニシテ又往々庭樹トシテ栽植セラル。幹枝ハ通常其舊外皮剝離ス。葉ハ有柄互生シ、橢圓形ニシテ鋭頭ヲ有シ、邊緣ニ鋸齒アリ、質稍厚クシテ下面ニ絹様ノ長毛ヲ帯ブ。夏日、腋生有梗ノ大ナル白花ヲ開ク。徑凡5cm内外アリ。花下ニ接シテ梗頂ニ二片ノ苞ヲ具フ。綠萼五片ニシテ白絹細毛ヲ有ス。花瓣五片ニシテ皺アリ、瓣裏ニ白絹毛ヲ帯ビ、邊緣ニ細齒アリ、基部ハ相聯合ス。單體ヲ成セル多雄蕊ヲ具ヘ、一雌蕊アリテ花柱ハ五岐セリ。蒴果ハ卵形ニシテ尖リ、五殼片ニ開裂ス。和名ハ夏椿ノ意ニシテ夏時ニ椿様ノ花ヲ開ク故ニ云フ、又娑羅樹ハ之レヲ印度ノ該樹ト誤認セシニ基ク。

第984圖

つばき科



つばき (山茶)
Camellia japonica L.

邦内諸州ノ山地ニ生ズル常綠喬木ニシテ其變種ハ觀賞品トシテ普ク庭園ニ栽植セラル。全體無毛ニシテ、繁密ナル綠葉ハ有柄ニシテ互生シ、橢圓形ニシテ短ク尖リ、葉緣ニ細鋸齒ヲ有シ、質厚クシテ平滑ナリ。春日、枝端ニ無柄ノ大形花ヲ着ケ、下ニ向フテ開キ、赤色ヲ呈ス。綠色ノ萼片ハ花芽ノ鱗片ト共ニ覆瓦裝ヲ成シ、花瓣五片ハ正開セズシテ下向シ、基部ハ相聯合ス。雄蕊多數單體ヲ成シテ花冠ノ基部ニ附着シ、花心ニ無毛ノ一子房アリテ花柱ハ三裂ス。蒴果球形ニシテ果皮厚ク、胞背開裂ヲ成シテ暗褐色ノ大ナル種子二三ヲ出ス、此種子ヨリ椿油ヲ搾取ス。自生ノ品ヲやぶつばき又ハやまつばきト稱ス、園藝品ニハ種々ノ種類アリ。和名ハ厚葉木ノ意ト云フ、又津葉木ノ義ニテ葉ニ光澤アル故云フナラントモ言ハル、椿ハ和字ニテ春盛ニ花サク故此字ヲ作りシナリ。支那ノ椿(チン)ト混同スベカラズ。

たうつばき

Camellia reticulata Lindl.

支那原産ノ常綠亞喬木ニシテ往昔我邦ニ渡來セシモノナリ。觀賞品トシテ人家ニ栽植セラルルコト雖ドモ世間ニ多カラズ。一見つばきト相類ス。葉ハ有柄互生シ、橢圓形ニシテ兩端尖リ、葉緣ニ細鋸齒ヲ有シ、葉面ハ脈上溝路ヲ印ス。葉質厚クシテ平滑ナリ。春日、枝端ニ無柄花ヲ開ク。萼ハ綠色ニシテ芽鱗ト共ニ覆瓦裝ヲ成シ、花瓣ハ五片或ハ多片ニシテ基部聯合シ赤色・淡紅色・帶紅白色或ハ白色ヲ呈ス。雄蕊ハ多數ニシテ單體ヲ成シ、子房ニ毛アリテ花柱ハ三裂ス。和名ハ唐椿ノ意ナリ。漢名 南山茶(誤用)

第985圖

つばき科



さざんくわ (茶梅)

Camellia Sasanqua Thunb.

九州・四國ノ山中ニ野生スル常綠小喬木ニシテ多枝繁葉、又觀賞ノ爲メ庭園ニ栽植セラルルコト多シ。嫩枝ニ細毛アリ。葉ハ有柄互生シ、橢圓形ニシテ兩端尖リ、細鋸齒アリ、質稍厚ク、葉柄・葉裏中脈上ニ細毛アリ。花ハ枝端ニ着キテ晩秋ニ開キ、無柄ニシテ稍大形ナリ。萼ハ綠色ニシテ芽鱗ト共ニ覆瓦裝ヲ成ス。花瓣五片、倒卵形ニシテ平開シ、後チ散落ス、山地ノ者ハ白色ナレドモ園藝品ニハ種々ノ色アリ。雄蕊多數。子房一箇、細毛ヲ帯ビ、花柱三裂ス。蒴果ハ球形ニシテ表面ニ細毛アリ、三殼片ニ胞背開裂シ少數ノ暗褐色種子ヲ出シ、此種子ヨリ油ヲ採ル。和名ハ多分山茶花ト書キ之レヲさざんくわト訓ズルハ非ナリ、山茶花ハ元來つばきノ名ナリ。

第986圖

つばき科



ちゃ (茶・茗)

Thea sinensis L.

支那竝ニ本邦ノ原産ノ常綠灌木ニシテ多枝繁葉、嫩枝ニハ細毛ヲ帯ブ。暖地ノ山中ニハ野生アリト雖ドモ、通常ハ採葉製茶ノ爲メ栽植セラレ所謂茶園ヲ成ス。葉ハ有柄互生シ、長橢圓狀披針形ニシテ鋸齒ヲ有シ、質厚ク葉面光澤アリ、支脈間稍凸面ヲ呈ス。花ハ秋月葉間ニ腋生シ、綠梗アリテ點頭シテ開キ、萼蕾ハ球形ヲ呈ス。元來聚繖花序ナレドモ梗上ニ一花ノモノ多シ。萼五片、深綠色、花瓣五片、白色、圓形ナリ。雄蕊多數ニシテ黃葯ヲ有シ、花柱ハ三裂ス。蒴果次年ノ秋ニ熟シ、扁圓ニシテ鈍三隅ヲ有シ、三殼片ニ胞背開裂ヲ成シ、暗褐色ノ大ナル三種子ヲ出ス。

第987圖

つばき科

