

第1000圖

あふひ科



もみぢあふひ

Hibiscus coccineus Walt.

北米原産ニシテ明治初年ニ渡來シ花草トシテ庭園ニ栽植セリ。多年生ノ木質草本ニシテ毛ナク帶白綠色ヲ呈シ、高サ1-2m許アリ。莖ハ數條叢生シテ直立ス。葉ハ長柄ヲ有シテ互生シ、掌狀ニ三乃至五深裂シ、裂片ハ狹長ニシテ尖リ疎齒ヲ有ス。夏日、赤色ノ有梗大花ヲ腋生シ、側向シテ開キ、美ナリ。花下ノ小苞ハ狹長、多數。萼ハ五深裂、裂片卵狀披針形ヲ成ス。五花瓣平開シ瓣間間隙アリ、各片倒卵形ヲ呈シ下部狹窄シ基部ハ聯合ス。單體雄蕊柱ハ頗ル長ク下ハ裸出ス。柱頭ハ五枝ニ岐ル。蒴果ハ尖ル。和名ハ葉形ニ基ク。

第1001圖

あふひ科



ぶっさうげ (扶桑)

Hibiscus Rosa-sinensis L.

蓋シ支那ノ原產、我邦ニハ舊ク渡來シ、觀賞品トシテ栽培ス。常綠ノ小灌木ニシテ高サ1-2.5m許、幹ハ直立、分枝シ、無毛ナリ。葉ハ有柄互生シ、廣卵形或ハ卵形ニシテ尖リ、不齊ノ粗鋸齒ヲ有シ、葉面深綠色光澤アリ、柄本ニ鍼狀線形ノ托葉アリ。夏秋ノ間、新枝ノ葉腋ニ有梗赤色ノ大形花ヲ開ク。花下ノ小苞ハ線狀披針形ニシテ尖リ數片アリ。萼ハ五裂シ、花瓣五片、回旋襞ニシテ廣漏斗形ヲ呈シ、底部ハ聯合ス。蕊柱ハ赤色ニシテ斗出シ、單體蕊柱ハ上部ニ多雄蕊ヲ着ケ、花柱頭ハ五枝ニ岐レ柱頭ハ頭狀ナリ。蒴果ハ卵形、無毛。和名ハ漢名ノ一ナル佛桑ニ基キ之レニ花ヲ加ヘタルモノナリ。

第1002圖

あふひ科



ぎんせんくわ (野西瓜苗)

一名 てうろさう

Hibiscus Trionum L.

中部あふりか原產ニシテ時ニ觀賞品トシテ栽培スルヲ見ル。一年生草本ニシテ高サ30-60cm許、直立或ハ斜臥シテ分枝シ、白粗毛ヲ有ス。葉ハ有柄、互生シ、三乃至五深裂ス、上部ノモノハ三深裂シテ其中片最モ長ク、裂片ニハ粗齒アリ、下部ノ葉ハ五淺裂シ、基部ノ葉ハ卵圓形ニシテ分裂セズ。夏秋ノ間、葉腋ニ淡黃色ノ有梗花ヲ出し、午前日光ヲ受テ開キ、正午前ニ凋ム。花下ノ小苞ハ凡十一片ニシテ緣毛ヲ有シ線形ナリ。萼ハ五裂シ、膜質透明ニシテ網狀脈ニ粗毛アリ。花瓣五片、回旋襞、基部ハ聯合ス。單體雄蕊柱ハ短ク、花柱ハ頂部五枝ニ岐レ柱頭ハ頭狀ヲ成ス。蒴果ハ膨ミタル宿存萼内ニ在リ。和名銀錢花ハ其花ニ基キ、ごじくわノ夜落金錢ニ對シテ名ケシモノ、てうろさうハ朝露草ニテ花戶ノ稱ナリ。

ほんてんくわ (三角楓)

Urena sinuata L.

暖國ニ生ズル灌木狀多年生草本ニシテ内地ニテハ九州南部ノ薩州ニ野生状態ヲ成ス。高サ1m内外ニ達シテ多ク分枝シ、星芒狀ノ細毛ヲ圓柱狀ノ莖面ニ被フル。葉ハ有柄ニシテ互生シ線狀ノ小形托葉ヲ具ヘ、五深裂ノ掌狀葉ヲ成シ、裂片ハ倒卵形或ハ菱狀倒卵形ニシテ下部ハ狹窄シ邊緣ニ鋸齒アリ、裂片間ノ裂縫ハ鈍底ヲ有ス、深綠色ニシテ葉面特ニ淡黃綠斑ヲ印シ、兩面星芒狀細毛ヲ疎布ス。秋日、枝上葉腋ニ短柄ノ小紅花ヲ開ク。花下ノ小苞ハ五裂。萼五裂。花瓣五片ハ倒卵形ニシテ下部聯合ス。單體雄蕊柱花中ニ立チ、花柱ハ五條ニシテ頂部二裂シ、柱頭ハ頭狀。蒴果ハ壓扁セル球形ニシテ果面ニ硬鈎毛ヲ有シ、五室ニシテ每室一種子アリ。和名ハ梵天花ノ意、蓋シ印度花草ノ意ニテ名ケシ乎。漢名三角楓ハたうかへでト同稱ナリ。

第1003圖

あふひ科



はひあふひ

Malva rotundifolia L.

歐洲原產ノ多年生草本ニシテ毛ヲ帶ブ。時ニ植物園ニ見、又偶ニ人家庭園ニ栽植ス。莖ハ強ク、地中ニ深入セル根頭ヨリ抽出シテ匍匐ス。葉ハ長柄ヲ有シテ互生シ、腎臟狀圓形ニシテ底部心臟形ヲ呈シ、邊緣五乃至七淺裂シ、鈍鋸齒アリ。春ヨリ秋ニ互テ葉腋ニ帶紅白色ノ有梗小形花ヲ簇生ス。花下ノ小苞ハ三片。萼ハ五裂ス。花瓣ハ五片、四頭。單體雄蕊柱短シ。花柱多數。心皮ハ多數輪列シ、細毛アリ。此種明治年間小石川植物園ニ栽培セラル、世間ニ之レヲ種ウルモノハ固ト皆該園ノたねナリ、然レドモ今ハ稀ニ之レヲ見ルニ過ギズ。

第1004圖

あふひ科



ぜにあふひ (錦葵)

*Malva sylvestris L.*var. *mauritiana* Mill.

舊ク我邦ニハ普通ニ人家ニ栽植セラル越年生草本ニシテ高サ60-90cm許アリ。莖ハ直立、圓柱形ヲ呈シテ綠色ナリ。葉ハ長柄ヲ有シテ互生シ、圓形ニシテ五乃至九淺裂シ、邊緣ニ鈍鋸齒アリ、底部ハ通常廣心臟形ヲ呈ス。五六月ノ候、葉腋ニ有梗花ヲ簇生シ、下方ヨリ梢ニ向フテ開キ進ム。花下ノ小苞ハ三片ニシテ分生ス。萼ハ綠色ニシテ五裂ス。花瓣五片、平開シ、倒心臟狀楔形ニシテ基部聯合ス、淡紫色ニシテ紫脈アリ。又白色淡紅色ノ異品アリ。單體雄蕊柱花中ニ立チ、花柱ハ絲狀ニシテ多數ナリ。心皮ハ輪列シ、宿存萼ヲ伴フ。和名錢葵ハ花形ニ基ク、而シテ漢名ニハ錢葵無シ。

第1005圖

あふひ科

