


第 1060 圖

かへで科



第 1061 圖

かへで科



第 1062 圖

かへで科



みねかへで

Acer Tschonoskii Maxim.

山地ニ自生スル落葉喬木、葉ハ有柄ニシテ對生シ、掌狀ニシテ五尖裂シ、裂片ハ卵狀披針形又ハ卵形ニシテ銳尖頭、邊緣ハ缺刻狀ニシテ重鋸齒ヲ有ス。兩面殆ド平滑ナレド、下面ノ底部ニ於テ赤色ノ毛生ズ。長幅各6-7cm。葉柄モ赤色ノ毛ヲ生ジ、葉面ヨリ短シ。花ハ夏月ニ開キ、葉面ヨリ短總狀ヲ成シ、萼片花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ殆ド直角ヲ成シテ開キ、無毛、翅ハ薄ク、長サ2cm、幅1cmアリ。こみねかへでニ似タルモ、萼・花瓣ハ二倍程長ク、翅果ノ翅廣クシテ直角ヲ成ス事等ニヨリテ區別セラル。和名ハ峰かへでノ意ニシテ高山ニ生ズルニ由リ名ク。本種ハ山ノ下方ニ見ズ。

こみねかへで

Acer micranthum Sieb. et Zucc.

山地ニ生ズル亞喬木。葉ハ有柄ニシテ對生シ、五掌狀ニシテ稍深ク裂ケ、裂片ハ卵狀披針形ニシテ先端尾狀銳尖ヲ成シ、邊緣ハ重鋸齒、底部ハ心臟形ヲ成ス。上面ハ無毛ナレドモ下面ニ於テハ主脈、特ニ脈腋ニ褐紅色ノ毛アリ。長サ6-9cm、幅5-8cm。葉柄ハ葉面ヨリ短ク褐色毛ヲ粗生ス。花ハ夏月ニ開キ、帶紅黃色ニシテ總狀花序ヲ成シテ着キ、極メテ小サク、徑僅ニ3mm許、萼片・花瓣各五、雄蕊八。翅果ハ鈍角又ハ一直線ニ近ク開キ、平滑、翅ハ膜質ニシテ長サ2cm内外、幅7mm内外アリ。和名ハ峰かへでニ似テ花實共ニ小ナルニ由テ名ケラレシナリ。

うりかへで

一名 めうりのき

Acer crataegifolium Sieb. et Zucc.

落葉灌木ニシテ山地ニ生ジ、高サ3m内外。葉ハ有柄ニシテ對生シ、卵狀披針形ニシテ先端ハ尾狀銳尖ヲ成シ、底部ハ圓形ニシテ心臟狀ヲ成ス、長サ7-10cm、幅4cm内外ニ達シ、邊緣ニ小鉗鋸齒ヲ有ス、上面ハ綠色無毛ナレドモ、下面ハ粉白、殆ド無毛ナレドモ中脈及ビ中脈側脈ノ合スル處ニ赤褐色ノ毛茸ヲ生ズ。葉ハ時ニ三淺裂シテさんざしノ葉ノ如クナルコトアリ。葉柄ハ葉面ヨリ短ク、全ク無毛ナリ。花ハ淡黃色ニシテ萼片花瓣各五、雄蕊八アリ、五月頃新葉ト共ニ總狀ヲ成シテ開キ。翅果ハ無毛ニシテ殆ド平開シ、兩端ノ長サ4.5cmニ達ス。和名瓜かへでハ其枝ノ膚色きうりナドノ瓜ノ色ト同ジキ故云フ。めうりのきハ女瓜の木ノ意ニシテ是レハうりはだかへでニ對シテ其樹ノ小形ナルヲ表セシ名ナリ。

うりはだかへで

Acer rufinerve Sieb. et Zucc.

山地ニ生ズル落葉喬木。枝皮ハ綠色ニシテ平滑無毛ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、卵形ニ近ク、淺ク三裂又ハ五裂ス、中央ノ裂片最大、側方ノ者ハ中大、下方ノ者ハ最小、邊緣ニ重鋸齒アリ、底部ハ圓形又ハ心臟形ヲ成ス、長サ10-16cm、幅6-12cm、葉面ハ稍平滑ナレドモ、下面ニ於テハ葉脈腋ニ沿ヒテ稍密生ス、葉面ヨリ頃アリテハ葉脈腋ニ著シ。葉柄ハ葉面ヨリ短ク、亦褐色毛ヲ生ズ。花ハ五つヲ成シテ總狀花序ト共に出デ、硫黃色ニシテ下垂ス。萼片花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ稍直角ヲ成シテ相開キ、濃褐色ノ毛ヲ密生シ、翅ハ長サ1.5-2cm、幅7-10mm許、真直又ハ彎曲ス。和名瓜膚かへでハ其樹皮ノ色ニ基キシモノナリ。

第 1063 圖

かへで科



第 1064 圖

かへで科

てつかへで

一名 てつのき

Acer parviflorum Franch. et Sav.

落葉喬木ニシテ山地ニ生ジ、高サ5m内外。葉ハ有柄ニシテ對生、廣キ五角形ヲ成シ、長サ10-15cm、幅10-20cm、淺ク五裂ス。裂片ハ三角狀ニシテ銳頭、重鋸齒緣ヲ有シ、底部ハ心臟狀ヲ成ス、上下面トモ長ズレバ無毛ニ近シ。葉柄ハ無毛ニシテ葉面ト同長又ハ稍之ヨリ長ク、徑2mmニ達スル者アリ。花ハ白黃色ニシテ長サ10cm内外ノ黃褐色ヲ呈セル總狀圓錐花穗ヲ成シ、七八月ノ頃出グ。萼片・花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ殆ド直角ヲ成シテ相開キ、褐色ノ毛ヲ被ル、翅ハ長サ3cm、幅1cm許アリ。和名鐵かへでハ其材黑色ヲ呈スルニ由リ斯ク云フ。



第 1065 圖

かへで科

からこぎかへで

Acer Ginnala Maxim.

高サ數mニ達スル落葉喬木ニシテ山地ニ自生ス。葉ハ有柄ニシテ對生シ、卵狀橢圓形ニシテ長サ5-7cm、幅3-4cm、頭部ハ尖リ、底部ハ圓形又ハ稍心臟狀圓形ヲ成ス、葉緣ハ不規則ナル缺刻狀ニシテ重鋸齒ヲ有ス、表面ハ無毛ナレドモ裏面ハ葉脈ニ沿ヒテ淡褐色ノ絨毛ヲ密生ス。葉柄ハ葉面ト同長ニシテ殆ド無毛ナリ。五六月ノ候、黃綠色ノ花ヲ總狀ニ開キ、枝端ニ頂生ス。萼片花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ成熟スレバ長サ3.5cmニ達シ、狹角度ヲ成シテ相開キ、果實ニ長絨毛ヲ生ジ果梗ニモ亦毛ヲ生ズ。

