

第1066圖



いたやかへで
一名 ときはかへで・つたもみぢ
Acer pictum Thunb.

山地ニ生ズル落葉喬木ニシテ高サ20m内外ニ達ス。葉ハ有柄ニシテ對生シ、掌狀ニシテ五-七尖裂又ハ淺裂シ、裂片ハ卵狀又ハ三角狀ニシテ銳尖頭尾狀ヲ成シ邊緣ハ全邊ナリ、底部ハ截形又ハ心臟形、無毛平滑ナリ、然シ下面ノ脈ハ特ニ其基部ニ於テ毛アリ。葉面ノ長サ5-10cm、幅ハ長サニ同ジク或ハ之レヨリ廣シ。葉柄ハ平滑ニシテ葉面ヨリ常ニ長シ。葉ノ形・大小・裂片ノ形狀等非常ニ變化多シ。花ハ淡黃色ニシテ複總狀ヲ成シ葉ト共ニ出づ。萼片花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ無毛ニシテ直角又ハ銳角ヲ成シテ開キ、翅ハ鋸形ニシテ長サ1.5cm、幅7mmアリ。和名板屋かへでハ其葉能ク繁リ恰モ板屋ノ如ク雨露ノ漏ルル事ナシトノ意ニテ斯ク名クト雖モ、是レ元來ハはうちはかへでノ名ナリ。常磐かへでハ紅葉セズ常ニ綠色ナリト云フニ基ク。又薦もみぢハ其葉狀ニ由テ名ケン稱ナリ。

第1067圖



ゑんこうかへで
一名 あさひかへで
Acer pictum Thunb.
var. *dissectum* Wesmael.

諸國ノ山地ニ生ズル小喬木。高サ3-5m許ニシテいたやかへでノ變種ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、五乃至七深裂シ、裂片ハ披針形或ハ披針狀橢圓形ニシテ有尾銳尖頭ヲ呈シ、全邊ニシテ質薄ク葉裏無毛ニシテ光澤アリ、通常葉柄長シ。秋ニ入レバ黃葉スルコトイタヤカヘでニ同ジ。花ヲ生ジ難シ。本變種ニ似テ質稍剛ニシテ葉裏ノ中脈ニ粗毛ヲ生ズル者亦多シ。うらげゑんこうかへで〔*subvar. nikkoense (Honda)*〕ト云フ。又葉ノ裂片更ニ三尖裂或ハ中邊ニ小突起アル者アリテ裏面ニハ毛ヲ生ズ、之ヲやぐるまかへで(*subvar. subtrifidum Makino*)ト云ヒ、稀品ニ屬ス。和名ハ猿猴かへでノ意ニシテ其葉ノ裂片瘦長ナルニ基ク。

第1068圖



えぞいたや
一名 くろびいたや(同名アリ)
Acer Miyabei Maxim.

本州中部以北、北海道ニ生ズル落葉喬木ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、横廣キ五角形ニシテ長サ7-10cm、幅8-15cmアリ、深ク五裂シ、上方ノ三裂片ハ大キク、劍狀ヲ成シ、邊緣ニ一二ノ粗鈍鋸齒アリ、下方ノ二裂片ハ小サシ、上下面共ニ葉脈ニ褐毛ヲ密生ス、底部ハ截狀心臟形ヲ成ス。葉柄ハ非常ニ長ク15cmニ達スル者アリ。花ハ黃褐色ニシテ繖房狀ヲ成シ、葉ト共ニ出づ。萼片花瓣各五、雄蕊八本アリ。翅果ハ一直線又ハ後方ニ稍反リ返リ、褐色ノ毛茸ヲ被ル、翅ノ長サ2cm内外、幅1cmアリ。和名黑皮板屋ハ元來いたやかへでノ樹皮ノ黑色ヲ帶ビタル者ノ稱ナリ。

第1069圖


**かちかへで**

一名 おにもみぢ

Acer diabolicum Blume.

山地ニ自生スル落葉喬木ニシテ高サ10-20mニ達ス。葉ハ有柄ニシテ對生、稍五角形ヲ成シ、五尖裂ヲ成ス。上部ノ三裂片ハ大キク、幅廣キ短劍狀ヲ成シ、邊緣ニ二三ノ粗大鋸齒ヲ有ス。長幅共ニ10-15cm許、幼時褐色ノ絨毛ヲ密生スレドモ長ジテ毛少ク成リ、上面ハ漸次平滑ニ近ヅクト雖モ、下面ハ尙短柔毛ヲ殘スニ至ル。葉柄ハ長ク、葉面ト殆ド同長。花ハ暗紅色ニシテ繖房狀ヲ成シ、葉ト共ニ出づ。萼片・花瓣各五、雄蕊八アリ。翅果ハ無毛ニシテ直角又ハ銳角ヲ成シテ開キ、翅ハ鋸形ニシテ長サ1.5cm、幅7mmアリ。和名板屋かへでハ其葉能ク繁リ恰モ板屋ノ如ク雨露ノ漏ルル事ナシトノ意ニテ斯ク名クト雖モ、是レ元來ハはうちはかへでノ名ナリ。常磐かへでハ紅葉セズ常ニ綠色ナリト云フニ基ク。又薦もみぢハ其葉狀ニ由テ名ケン稱ナリ。

第1070圖

**はなのき**

一名 はなかへで

*Acer rubrum L.*var. *pycnanthum* Makino.

主トシテ木曾川流域ノ山間ノ湿地ニ自生スル落葉喬木ナレドモ往々舊クヨリ栽植セラレテ巨木ト成レル者アリ。其高キ者ハ15mニ達ス。葉ハ對生有柄、たうかへでニ似テ鋸齒アリ、三淺裂シ、心臟底ヲ成シ、下面ハ粉白ナリ。秋季紅葉ス。雌雄異株ニシテ、雄花ハ多數集リテ新葉ノ萌發ニ先チテ開キ、萼片花瓣略同形ニシテ真紅色ヲ呈シ、遠望轉タ美觀ヲ呈スルヲ以テ花の木ノ名ヲ得タリ。翅果ハ開度銳角、熟スレバ九十度ニ達スル者多シ。珍奇ナルかへでノ種類トシテ自生地ニ就キ天然紀念物ニ指定サレシ者アリ。此種近江花澤村ニ名木アリ。A. *rubrum* L.ハ北米ノ產ナリ。

第1071圖

**たうかへで(三角楓)***Acer trifidum Hook. et Arn.*

支那原產ノ落葉喬木ニシテ庭園ニ植栽セラル。葉ハ有柄ニシテ對生シ、洋紙質ニシテ上端三淺裂、底部ハ鈍形又ハ圓形ヲ成ス。裂片ハ稍三角形ヲ成シ、殆ド全邊、幼時ハ白色ノ柔毛ヲ有スレドモ長ジテ無毛ト成リ、上面ハ光澤ヲ有シ、下面ハ青綠色ニシテ稍白色ヲ帶ブ。葉柄ハ葉面ト稍同ニシテ無毛ナリ。稚木ノ葉ハ成樹ノ葉ト異ニシテ三尖裂シ、裂片廣披針形、銳尖頭ニシテ葉緣ニ鋸齒アリ。四五月ノ候花ヲ開キ、淡黃色ニシテ繖房狀ヲ成シ、五萼片、五花瓣、八雄蕊ヲ有ス。翅果ハ無毛ニシテ殆ド平行ヲ成シテ開キ、翅ノ長サ1.5-2cmアリ。一變種ニひとつばたうかへで(var. *integrifolium* Makino)アリ、葉分裂セザルヲ常トスレドモ時ニ二三淺裂スル者アリ、稀品ナリ。和名ハ唐かへでノ意ニシテ、唐ハ支那ヲ指ス、本種ハ往時支那ヨリ渡來セシニ由リ斯ク名ケタリ。