

第1072圖



第1073圖



ちごりのき 一名 やましば

Acer carpinifolium Sieb. et Zucc.
高サ7m内外ノ落葉喬木ニシテ山地ニ自生ス。葉ハ有柄ニシテ對生シ、長橢圓狀披針形ニシテ長サ12cm内外、幅5-6cm、先端尾狀銳尖、底部圓形又ハ稍心臟形ヲ成ス、葉緣ハ銳キ重鋸齒ヲ有ス、表面ハ平滑、裏面ハ中脈ニ沿ヒテ密生スル絨毛ヲ有ス、側脈ハ平行シテ葉緣ニ達シ、二十内外ヲ算ス。雌雄異株ニシテ四月開花シ、萼片花瓣各五アリ、雄花ハ雄蕊八本ニシテ長穗狀ヲ成スト雖モ、雌花ハ短總狀ヲ成ス。翅果ハ長サ2-3cm許、果梗ト共ニ無毛、稍直角ニ近キ開度ヲ以テ開ク者、稍平行ニ近キ者又ハ鈍角ヲ成ス者モアリ。

ひとつばかりへで

一名 まるばかりへで

Acer distylum Sieb. et Zucc.
本州中部ノ山地ニ生ズル落葉喬木ニシテ高サ8-10m=達ス。葉ハ有柄、對生、倒卵圓形ニシテ長サ10-20cm、幅8-14cm、先端鈍狀ノ短尾狀ヲ成シ、底部ハ深心臟形ヲ成ス。幼時兩面ニ褐色ノ粗毛ヲ生ズレドモ、老熟スレバ殆ド平滑ト成ル。葉緣ハ波狀鉗鋸齒ヲ有ス。葉柄ハ短ク4cm内外ヲ算スルノミ。花ハ淡黃色ニシテ萼片花瓣各五アリ、總狀花序ヲ成シ五六月ノ頃開ク。雄蕊概ね八本、子房ハ密絨毛ヲ被ル。果穗ハ小枝端ニ在テ上向ス。翅果ハ銳角ヲ成シ時ニ殆ド平行ニ近キ者アリ、短毛ヲ被ル。翅ノ長サ2-2.5cmニ及ブ。和名一つ葉かへでハ分裂セザル單葉ヲ表シ、丸葉かへでハ葉形ニ基ク。

みつでかへで

Acer cissifolium C. Koch.

高サ3-5m許ノ落葉喬木ナリ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、三出複葉ヲ成シ長葉柄ヲ具フ。小葉ハ卵狀橢圓形ニシテ兩端尖リ、大ナル者ハ長サ10cm、幅4cm=達ス、葉緣ハ粗ナル鋸齒ヲ有シ、表面ニハ剛毛ヲ散布シ、裏面ハ概ね無毛ナレドモ、中脈ト側脈トノ合スル處ニ絨毛叢アリ。稀ニ下方ノ二小葉ノ更ニ二分スル事アリ。花ハ黃色ニシテ長穗狀ヲ成シ春ニ開ク。萼片花瓣ハ各四、雄蕊四五アリ。果穗ハ長サ20cm内外アリ。翅果ハ長サ3cm内外ニシテ、短毛アリ、銳角ヲ成シテ開ク。果梗及果軸ニ疎毛ヲ生ズ。和名三つ手かへでハ葉狀ニ基ク。

めぐすりのき 一名 ちやうじやのき

Acer nikoense Maxim.

山地ニ生ズル落葉喬木ニシテ高サ10m内外ニ達ス。葉ハ有柄ニシテ對生シ、三出邊緣ハ不規則ナル波狀鉗鋸齒、中央ノ一小葉ハ狹底ニシテ小葉柄ヲ有スレドモ側葉ノ二小葉ハ無柄ニシテ底部ノ下方鉗形ヲ成ス、共ニ長サ6-10cm、幅2.5-5cm許アリ、上面ハ稍無毛ナレドモ、下面ハ特ニ葉脈ニ於テ褐色長絨毛ヲ密生ス。葉柄ハ2-4cm内外ニシテ嫩枝ト共ニ褐色長絨毛密生ス。花ハ白色ニシテ三出、葉下ト共ニ出づ。萼片・花瓣ハ五、雄蕊十二トアリ。翅果ハ大ニシテ銳角又ハ平行ヲ成シテ開キ絨毛ヲ密布ス。翅ハ稍弧狀ヲ成シ長サ3-4cm、幅1-1.5cmアリ。樹皮ヲ煎ジテ洗眼料ト爲スト云フ、故ニ眼藥の木ノ稱アリ。

くろたきかづら


Hosiea japonica Makino.

我邦南部ノ林中ニ生ズル落葉藤本。葉ハ長柄アリテ互生シ、卵形ヲ呈シ長サ5-10cm、先端ハ銳尖シ底部ハ心臟形ヲ成ス。邊緣ニハ齒牙狀鋸齒アリテ膜質、微毛アリ。雌雄異株ナリ。花序ハ少數花ノ圓錐狀或ハ總狀ニシテ、總軸ハ短ク、腋生ス。花ハ懸垂シ、徑1cm内外。萼ハ小形、五深裂ス。花冠モ亦五深裂シ、裂片ハ平開シテ披針狀橢圓形ヲ呈シ、先端尾狀ニ尖リ、肉質ナリ。雄蕊ハ五本、細小ノ附屬物ト互生ス。雌蕊ハ壺状ヲ呈シ、柱頭ハ五岐ス。果實モ亦懸垂シ平扁ナル橢圓形ニシテ赤熟ス。初メ予之レヲ土佐國黒瀧山中にテ見出ス、由テ黒瀧蔓ノ名ヲ命ゼリ。

第1075圖



第1076圖



第1077圖



みつばうつぎ (省沽油)

Staphylea bumalda Sieb. et Zucc.

山地ニ自生スル落葉ノ小灌木ニシテ枝樺多シ。葉ハ有柄ニシテ對生シ、三出複葉、小葉ハ卵狀披針形ニシテ銳尖頭、基部ハ銳形或ハ稍楔狀成シ、短柄ヲ有ス、ヲ短毛ニシテ、邊緣ニハ芒尖細鉗鋸齒アリ。初夏ニ枝白シテ頂生セル聚繖的圓錐花序ヲ呈シ、花被ハ平開セズ。萼ハ五片倒卵狀長橢圓形ニシテ鉗頭、萼片ヨリ微ニ長シ。雄蕊五アリテ花瓣殆ド同長。雌蕊一。子房ハ上部兩岐シ各一花柱ヲ有ス。果實ハ薄質膨脹ノ蒴果ニシテ二室ヲ成シ、下部ハ聯合シ、上部ハ離在ス。各室ニ滑澤ナル種子一二箇アリ。嫩葉食フベシ。和名ハ三葉空木ノ意。