


第1174圖



第1175圖



第1176圖



さんせう (蜀椒)
古名 はじかみ
Xanthoxylum piperitum DC.
山中ニ生ズレドモ又通常人家ニ栽植セラルル落葉灌木。幹ノ高キ者ハ3mニ餘リ、多ク分枝シ、枝上ニ刺ヲ有ス。葉ハ互生シ、奇數羽状複葉ニシテ五-九對ノ小葉ヲ具フ。小葉ハ小形ニシテ長卵形或ハ卵形或ハ長橢圓形ヲ成シ、先端細マリテ微凹頭ニ終ル、邊緣ニ鉗鋸齒アリ。葉ニ香氣アリ。雌雄異株。春日葉腋ニ短キ複總狀花序ヲ成シテ綠黃色ノ小花ヲ綴ル。花被五片。雄花ニハ雄蕊五箇アリ。子房ハ離生シ基部ニ柄ヲ具フ。秋日平滑ナラザル果實ヲ結ビ、開裂シテ黑色ノ種子ヲ出す。嫩葉ヲ食用トシ果實ヲ藥用又ハ香味料トス。刺ノ殆ド無キ變種ヲあさくらざんせう (var. *inerme* Makino) ト稱シ、多ク人家ニ栽植ス。和名ハ山椒ノ意ナレドモ山椒ハ漢名ニ非ズ、古名ノはじかみハはじかみらノ略ト謂ハル、はじハ酔花即チはぜるノ意ニシテかみらハにらノ古名ナリ、即チ其皮殼開裂シ且皮味辛辣ニシテ韭ノ味ニ似タルヨリ來リシ名ナリ。漢名秦椒(誤用)

ふゆざんせう (秦椒)

一名 ふだんざんせう

Xanthoxylum planispinum
Sieb. et Zucc.

暖國ノ山野ニ生ズル常綠灌木。高サ3m餘ニ達シ、枝上ニ扁平ナル刺ヲ具フ。葉ハ奇數羽状複葉ニシテ五乃至七箇ノ小葉ヨリ成リ、葉柄及ビ葉軸ニハ羽アリ時ニ刺ヲモ具フ。小葉ハ長橢圓形乃至披針形ヲ成シ、尖銳頭、基部モ亦尖リ、長サ4-10cm許、質厚ク、邊緣ニ細鈎鋸齒ヲ具フ。雌雄異株。夏日葉腋ニ淡黃色ノ小花ヲ短キ總狀或ハ複總狀花序ニ綴ル、後微臭、辛味アル果實ヲ結ビ、開裂シテ黑色光輝アル種子ヲ吐ク。果實ノ表面ニハ疣アリ。和名冬山椒ハ其葉冬月モ尚存スルヲ以テ云フ。葉ノ臭味佳ナラズ故ニ通常食用ト爲サズ。漢名竹葉椒(蓋シ同物乎)

第1177圖

こか
Erythroxylon Coca Lam.

南米ペルニニ産シ、藥用植物トシテ熱帶地方ニ栽培セラルル灌木ニシテ繁ク分枝ス。高サ1-2m許。莖ハ紫褐色ヲ呈シ、平滑ナラズ。嫩枝ハ平滑ナリ。葉ハ柔カク黃綠色ヲ成シテ互生シ、長サ6cmニ及ビ、披針形或ハ長橢圓形ヲ成シ、底部ハ狹窄シテ短柄ト成リ、葉頭ハ稍鈍形ニシテ微小刺ニ終ル、全邊ニシテ中脈ノ兩側ニ各一條ノ縱脈アリ。初夏、黃綠色ノ小形花ヲ綴ル、一處ニ凡ソ三箇ノ有梗花相集リ、枝上ニ出づ。萼ハ小ニシテ五裂シ、五花瓣ハ内部ニ附屬物アリ。十雄蕊アリテ二輪ヲ成シ、長柄アリ。花柱三箇長橢圓形ノ子房ニ着ク。核果ハ小ニシテ卵狀長橢圓形ヲ成シ、赤熟シ一種子ヲ藏ス。乾シタル葉ヲ古柯葉ト稱シ、其精分ノこかいんハ局部麻醉藥トシテ有名ナリ。和名ハコカ (Coca) ノ種名ニ基キ、Coca ハ其產地ノ土名ナリ。



第1178圖

あま (亞麻)

一名 ぬめごま

Linum usitatissimum L.

中央亞細亞ノ原產ニシテ用途多キ爲メ廣ク栽培セラルル一年生草本。莖ハ細長ニシテ高サ1m許、梢ニ枝ヲ分ツ。葉ハ互生シ、小形ニシテ長サ2-3cm、線形或ハ披針形ヲ成シ銳尖シ、全邊ナリ。夏月、紫碧色或ハ白色ノ花ヲ開ク。花ハ聚繖花序ヲ成シ、五萼片ハ卵形、銳尖シ、三脈アリ。五花瓣ハ萼ノ倍長、倒卵形ニシテ先端凹ク且ツ多少波狀ヲ成ス。雄蕊五箇、假雄蕊五箇アリ。子房ニハ長キ五花柱ヲ有ス。花後圓キ蒴果ヲ結ビ、種子ハ長橢圓形、平扁、平滑、黃褐色ナリ。莖皮ノ纖維ハ織物ノ原料トシテ古來著名ナリ。又亞麻仁油ハ其種子ヨリ搾取セル油ナリ。和名ハ漢名亞麻ノ音ナリ、又ぬめごまハ滑り胡麻ノ意ニシテ其種子面ノ滑澤ナルニ基ヅク。



第1179圖

まつばにんじん

一名 まつばなでしこ

Linum stellareoides Planch.

原野ニ多ク生ズル二年生草本。莖ハ直立シテ細長、高サ50cm許。梢ニ於テ分枝ス。全株無毛ニシテ葉ハ全邊、線形、銳頭ニシテ三主脈ヲ有ス、長サ2-2.5cm許、花ヲ着ケタル枝ノ葉ハ甚ダ小サシ。夏日、梢ニ聚繖狀ヲ成シテ多數ノ小形花ヲ開キ、淡紫色ニシテ愛スベシ。五萼片ハ卵狀披針形ヲ成シ、先端尖リ、邊ニハ黒キ腺體アリ。五花瓣ノ長サ凡ソ萼片ノ三倍長ニシテ5-10mm許。五雄蕊、一雌蕊アリ。花後圓キ蒴果ヲ結ビ、宿存萼片伴フ。和名ハ松葉人參或ハ松葉撫子ノ意ナリ。にんじんノ名適當セズ、なでしこ其花葉ノ外觀ニ基ヅク。

