

第 1222 圖

まめ科



しろえんごう (荷蘭豆)

今日通名 えんどう

Pisum sativum L.

歐洲原産ニシテ今昔ク畑ニ培養スル越年生ノ攀緣草本、秋ニ下種ス。全株無毛ニシテ直上セル莖ノ高サ 1m 内外、圓柱形ニシテ中空ナリ。葉ハ一乃至三對ノ小葉ヨリ成リ、多少長キ葉柄ヲ有シ、先端ハ分岐セル卷鬚ト成リ他物ヲ把卷ス。小葉ハ卵形乃至橢圓形ニシテ全縁或ハ時ニ少數ノ鋸齒アリ、先端ハ鈍頭、小微凸頭アリ。葉柄ノ基部ニハ大ナル葉狀ノ二托葉ヲ具ヘ、各凡ソ半心臟形ヲ成シ、粗ナル牙齒ヲ有ス耳部ハ互ニ相重ナル。春日、葉腋ニ花軸ヲ抽キ、通常二箇ノ白色蝶形花ヲ開キ側向ス。花ハ小梗ヲ具ヘ稍大形ニシテ長サ 2-2.5cm。萼ハ綠色ニシテ五裂シ宿存ス。旗瓣ハ開張シテ立ち凹頭ヲ有ス、翼瓣ハ略ボ圓形ニシテ雙者相接シ、龍骨瓣ハ小ナリ。花後線形乃至劍形ニシテ平滑ナル扁莢ヲ結ビ、長サ 5cm 許。種子ハ球形ニシテ白色。嫩莢及種子ヲ食用トス。和名ハ白豌豆ノ意ナリ。

第 1223 圖

まめ科



れんりさう (山藜豆)

Lathyrus palustris L.var. *linearifolius* Ser.

草原ニ生ズル多年生草本ニシテ細長ナル地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖ハ直立シ高サ 30-60cm ニシテ綠色ヲ呈シ兩側ニ狹翼アリ。葉ハ有柄互生シ、羽狀ニシテ一乃至三對ノ小葉ヨリ成リ先端ニ分岐セザル一卷鬚ヲ有ス。小葉ハ並ビテ立ち、線形又ハ披針形ニシテ兩端尖リ、全邊ニシテ先端ニハ微凸尖アリ、中脈ノ兩側各三條ノ支脈縦通ス、長サ凡 5-10cm ナリ。葉柄本ニ殆ド一直線ニ兩岐セル綠色托葉アリテ其裂片線形ニシテ尖レリ。五六月頃、葉腋ニ長キ一花軸ヲ抽クコト 10-15cm、上部ニ短小梗アル紅紫色蝶形ノ數花ヲ總狀花序ニ着ク。萼ハ斜鐘形ヲ成シ先端五裂ス。旗瓣ハ大ニシテ卵狀圓形、凹頭。翼瓣ハ花爪アル廣卵形ニシテ旗瓣ヨリ小。龍骨瓣ハ殆ド白色ニシテ更ニ小、短花爪アリテ鋭頭ヲ有ス。十雄蕊二體ヲ成シ即チ其九雄蕊ハ同一點ヨリ著シク融合ス。莢ハ線形ニシテ無毛ナリ。和名ハ連理草ノ意ニシテ其小葉ノ兩對シテ連生セル狀ニ基キテ云フ。

第 1224 圖

まめ科



ひめれんりさう

一名 ベにざらさ

Lathyrus ugoensis Matsum.

我邦ノ北地ニ生ズル多年生草本。莖ハ多少蔓性ニシテ長サ 60cm ニ達シ、兩翼アリテ扁平狀ヲ呈ス。葉ハ互生シテ短柄ヲ具ヘ、一乃至三對ノ小葉ヨリ成リ、先端ハ分岐セル卷鬚ト成リ他物ニ纏フ。小葉ハ披針形或ハ線狀長橢圓形ニシテ兩端細マリ、先端ニハ微凸頭アリ、長サ 3-4cm、幅 0.5-1cm 許。葉柄本ノ托葉ハ小形ニシテ半箭形ヲ成シ、先端鋭ク尖ル。五六月ノ頃、葉腋ニ 6-9cm 長ノ花軸ヲ抽キ、先端ニ少數ノ紅紫色蝶形花ヲ着ケ側ニ向テ開ク。旗瓣ハ大形ニシテ翼瓣龍骨瓣ハ小形ナリ。莢ハ扁平ニシテ長サ 4cm 内外、毛アリ。和名ハ姫連理草ノ意ナリ。

ひろはのれんりさう

Lathyrus latifolius L.

歐洲原産ノ多年生蔓性草本ニシテ明治初年ニ渡來シ、稀ニ觀賞ノ爲メ庭園ニ培養セラル。莖高サ 90cm 許ニシテ葉ノ先端ニ生ジテ多岐セル強キ卷鬚ニ由テ他物ニ纏絡シ直上シ、顯著ナル翼アリ。葉ハ互生シ有柄ニシテ一對ノ小葉ヨリ成リ、小葉ハ卵狀披針形ニシテ長サ 5-10cm 許、先端尖リ微凸頭アリ、三乃至五脈アリテ判然ス。葉柄ニモ亦翼アリ。托葉ハ披針形ヲ成シ或ハ稍半箭形、小葉ノ如キモ小ナリ。夏日、葉腋ヨリ生ズル長キ花梗上ニ紅紫色ノ數花ヲ總狀ニ着ケテ美ナリ。萼ハ鐘狀ニシテ淺ク五裂ス。旗瓣ハ甚ダ大。翼瓣ハ龍骨瓣ハ旗瓣ヨリ小ナリ。花後扁平ノ莢ヲ結ブ。中ニ稜角アル數粒ノ豆ヲ容ル。和名ハ廣葉の連理草ノ意ナリ。

じゃかうれんりさう

一名 ジャかうえんどう・すゐーとびー

Lathyrus odoratus L.

地中海沿岸ノ原産ニシテ今ハ廣ク園圃ニ栽培セラルル一年生蔓草ニシテ全株白粗毛ヲ布ク。莖ハ立ちテ攀緣シ高サ 2m ニ達シ狹翼ヲ具ヘ葉ト共ニ多少ノ粉白色ヲ呈ス。葉ハ疎ニ互生シテ短柄ヲ具ヘ、羽狀複葉ナレドモ小葉ハ唯最下部ノ一對ノミヲ殘シテ他ハ卷鬚ニ變ゼリ。小葉ハ卵狀橢圓形ニシテ兩端尖リ、粗毛アリ、長サ 3cm 内外ニシテ斜開シ、裏面粉白、表面ハ蒼綠色ナリ。葉柄ハ太クシテ兩翼ヲ有シ基部兩側ニハ狹キ耳狀ノ托葉ヲ存ス。花梗ハ腋生、遙ニ葉ヲ抽キテ立ち、長サ 20cm 内外、莖ト質ヲ同ジクス。五月頃、花梗ノ上部ニ總狀ヲ成シテ二乃至四花ヲ開ク。花ハ豐大、蝶形ヲ呈シ、長サ 2-3cm、旗瓣ハ闊大ナリ。園藝種多クシテ白・淡紅・紅・紫・碧色等種々ノ色アリ。花後粗毛ニ蔽ハレタル長橢圓形ノ扁莢ヲ結ブ。切花トシテ賞用セラル。和名ハ麝香連理草又ハ麝香豌豆ナリ、すゐーとびーハ Sweet Pea ニシテ西洋ノ俗名ナリ。

はまえんごう

Lathyrus maritimus Bigel.

海濱砂場(極メテ罕ニ湖邊或ハ河原)ニ生ズル豌豆様ノ多年生草本ニシテ長ク地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖長サ 30-60cm 許、方形綠色ニシテ強く地面ニ横斜ス。葉ハ帶白綠色ヲ呈シ、互生シテ短柄ヲ有シ、三乃至六對ニシテ通常五對ノ小葉ヲ具ヘ、先端ハ一條ノ卷鬚ト成ル。小葉ハ長橢圓形・橢圓形或ハ卵形ヲ成シ、鈍頭ニシテ小微凸頭アリ。托葉ハ大形ニシテ小葉ヨリ稍大ニシテ半箭形ヲ成シ先端尖レリ。五月、葉腋ニ 6-9cm ノ長花梗ヲ抽キ、總狀花穗ヲ成シテ美ナル赤紫色ノ蝶形花ヲ綴リ側ニ向テ開キ、後碧色ニ變ズ。萼ハ五裂シ、裂片ハ筒部ヨリ稍長シ。旗瓣ハ圓形凹頭、翼瓣ハ龍骨瓣ハ旗瓣ヨリ小ナリ。雄蕊十箇二體ヲ成シ、一雌蕊アリ。莢ハ無柄、線狀長橢圓形ニシテ扁平、長サ 5cm 内外。和名ハ濱豌豆ノ意。漢名 野豌豆(誤用)

第 1225 圖

まめ科



第 1226 圖

まめ科



第 1227 圖

まめ科

