


第 1228 圖



いたちささげ
一名 ゑんどうささ
Lathyrus Davidii Hance.

本属中ノ異采者ニシテ山野ノ陽地ニ生ズル多年生草本。莖ハ高サ 90cm ニ達シ、圆柱形ニシテ直立或ハ傾斜ス。葉ハ互生シ有柄ニシテ羽狀複葉ヲ成シ、二乃至四對ノ小葉ヲ有シ、葉軸ノ末端ニ分岐セル卷鬚ヲ具フ。小葉ハ橢圓形ニシテ長サ 4-8cm 許、先端ハ鈍頭ヲ成シ、質軟ク下面ハ緑白色ヲ呈ス。托葉ハ大ナル半箭形ヲ成シ、長サ 2-4cm、末端尖ル。夏日、葉腋ニ一條又ハ稀ニ二條ノ有梗ナル總狀花序ヲ成シテ多數ノ花ヲ開キ傾下ス。蝶形花ニシテ長サ凡 15mm、黄色ヲ呈シ、後褐色ニ變ズ。萼ハ鐘形ニシテ極メテ淺ク五齒ヲ成シ下方ノ者稍長シ。花瓣ハ上部ニ於テ上向キニ反ル。莢ハ小梗ヲ有シ長サ 6-8cm 許ニシテあづきノ莢ニ似タリ。和名鰐豆ノいたちハ蓋シ後チ褐色ニ變ズル黄色花ニ基キシモノ乎、同獸ノ毛色ハ黄赤色ナリ、又豌豆草ハ草狀ニ由ル。漢名 苳芒決明(誤用)

第 1229 圖



すすめのゑんごう(薇)
Vicia hirsuta Koch.

普ク諸州ノ田野山麓ノ地ニ生ズル越年生草本ニシテ多少細毛アリ。莖ハ基部ヨリ分枝シ、立チ或ハ傾キ纖弱細長ニシテ四稜アリ、長サ 30-50cm 許。葉ハ羽狀複葉ニシテ六乃至八對ノ小葉ヲ有シ、先端ハ分岐セル卷鬚ト成ル。小葉ハ線狀長橢圓形ヲ成シ小形ニシテ長サ 1cm 内外、先端凹狀截形ニシテ微尖、底部ハ狹窄ス。托葉ハ小形ニシテ多クハ四深裂ス。四五月ノ候、葉腋ニ纖長ナル花梗ヲ抽キ、上部ニ白紫色ノ小蝶形花三四箇ヲ着ク。萼ハ五裂ス。翼瓣・龍骨瓣ハ旗瓣ヨリ短シ。莢ハ小形、長サ 8mm ニシテ細毛ヲ被リ通常二種子ヲ入ル。種子ハ扁圓形ニシテ黒色光輝アリ。全草ヲ茶トシテ飲ミ又牧草ト爲スベシ。和名ハ雀野豌豆ニシテ雀ノ豌豆ノ意ニハ非ズ、此草ハ野豌豆(からすのゑんどう)ニ似テ小形ナルニ由リ小鳥ナル雀ヲ其上ニ加ヘ草體ノ小ナルヲ表セリ。漢名 小巢菜竝ニ翹搖(共ニ誤用)

第 1230 圖



かすまぐさ
Vicia tetrasperma Moench.

普ク諸州ノ芝生・草地・山麓地等ニ生ズル越年生草本ニシテ草狀略ボすめのゑんどうニ似タリ、莖ハ瘦長ニシテ毛ナク、30-50cm 許アリ。葉ハ互生シテ羽狀ヲ成シ質軟ニシテ無毛ナリ、葉軸ノ先端ハ一或ハ二岐セル卷鬚ト成ル。小葉ハすめのゑんどうヨリ少シク大ニシテ三乃至六對ヲ成シ、線狀橢圓形又ハ線形、先端一般ニ截形ニシテ微凸頭ヲ有シ底部ハ狹窄ス。四五月ノ候、葉腋ヨリ生ズル細キ花梗梢ニ通常二箇ヅツ淡紅紫色ノ小蝶形花ヲ着ク。萼ハ五尖裂シ、旗瓣闊ク、翼瓣龍骨瓣ハ短小ナリ。莢ハ極メテ短キ小柄ヲ有シ線狀長橢圓形、長サ 10-15mm、扁平ニシテ平滑無毛、三乃至四箇ノ種子ヲ含ム。和名ハかす間ぐさノ意ナリ、本種ハ其草狀宛モからすのゑんどうトすめのゑんどうトノ中間形ヲ呈スルヨリ斯ク云フ。

からすのゑんごう(野豌豆)
一名 やはずゑんどう・いらら
Vicia sativa L.

普ク諸州ノ田野・山麓地等ニ多ク生ズル越年生草本。全株有毛、稀ニ無毛。莖ハ多ク基部ヨリ分岐シ、四角ヲ成シ、多少地上ニ傾臥シ、長サ 60-90cm 許アリ。葉ハ互生シ、羽狀複葉ニシテ三乃至七對ノ小葉ヲ有シ、先端ハ分岐セル卷鬚ヲ成シ物ニ纏フ。小葉ハ倒卵形ヨリ線形ニ至ルマデ種々ニシテ先端ハ凹頭ヲ呈シ往々矢筈形ヲ成シ微凸尖アリ。托葉ハ半箭形、多クハ尖齒アリテ一箇ノ腺點ヲ具フ。四五月、一二箇ノ帶紅紫色蝶形花ヲ葉腋ニ着ク。萼ハ五尖裂ス。旗瓣ハ廣闊ニシテ凹頭ヲ成シ、翼瓣ハ旗瓣ヨリ短小ニシテ濃紅紫色ヲ呈シ、龍骨瓣ハ殆ド翼瓣ト同長ナリ。莢ハ長形ニシテ熟シテ黒ク、中ニ約十顆許ノ種子ヲ含ミ、往々田間ノ小兒之レヲ炒リテ食フ。洋品ハ通常サードウェットト稱シ草狀豐大佳良ノ牧草トシテ栽培ス。和名鳥野豌豆ハ雀野豌豆ニ對シ其花葉竝ニ莢ノ大ナルヨリ云ヒ又熟莢ノ黒色ナルモ亦鳥ニ對シテ頗ル適セリ。

つるなしからすのゑんごう
一名 つるなしやはずゑんどう
Vicia sativa L. var. normalis Makino.

往々田野ニ生ズル越年生草本。全體からすのゑんどうト相同ジト雖ドモ單ニ其葉末卷鬚ヲ成サズ之レニ代ルニ小葉ヲ以テスル異アリ。莖ハ多ク基部ヨリ分岐シ、四角ヲ成シ、多少地上ニ傾臥スト雖ドモ多株叢生スル時ハ能ク相依テ直立ス。葉ハ互生シテ羽狀ヲ成シ、小葉ハ三乃至七對、倒卵形・長橢圓形・長倒卵形等ヲ呈シ、先端ハ凹ミ、微凸頭アリ、基部ハ尖リ、小葉ノ柄ハ甚ダ短シ。四月頃、葉腋ニ通常一二箇ノ蝶形花ヲ着ク。帶紅紫色ニシテ萼ハ鐘狀五尖裂、旗瓣ハ中央以下ニ於テ縊レアリ上方ハ短卵形ヲ成シ、翼瓣ハ濃紅紫色ヲ呈ス。雄蕊十箇、二體ヲ成シ、分着セル者ハ其先端僅ニ分ルノミ。子房ハ無柄、花柱ハ短シ。莢ハ長クシテ廣線形ヲ呈シ熟シテ黒色、數粒ノ種子ヲ容ル。からすのゑんどうノ一變種ニシテ、和名ハ蔓無し鳥野豌豆ノ意ナリ。


いぶきのゑんごう
誤稱 からすのゑんどう
Vicia sepium L.

我邦ニテハ近江伊吹山ニ特産スル多年生草本ニシテ地下莖ヲ引テ繁殖ス。概形からすのゑんどうト相似タリ。莖ハ稍地上ニ傾臥シ或ハ直上シ多少蔓様ヲ成シテ稜アリ。葉ハ互生シ、羽狀複葉ニシテ先端ニ分岐セル卷鬚ヲ有シ他物ニ纏ヒ莖ノ上立ヲ翳ク。小葉ハ四乃至七對ヲ成シ、卵形又ハ長橢圓形ニシテ長サ 2-3cm、先端多少截形ナレドからすのゑんどうノ如カラズ。微凸頭ヲ有ス。托葉ハ半箭形、多少尖齒アリ。初夏、葉腋ニ短總狀花序ヲ成シテ通常二乃至三花ヲ有シ、萼ハ濁紫色、花冠ハ淡紫色ニシテ旗瓣ニ紫條アリ。花後扁莢ヲ結ビ長サ 3cm 餘、前端嘴狀ヲ成シ熟シテ黒ク、中ニ六乃至十種子ヲ容ル。本品ハ歐洲ノ普通品ナレドモ我邦ニ於テハ其野生トシテハ唯伊吹山下ニ之レヲ見ルニ過ギズ、蓋シ往昔外國ヨリノ渡來品ナラン。和名ハ伊吹野豌豆ノ意ニシテ伊吹ノ豌豆ノ義ニハ非ズ。

第 1231 圖



第 1232 圖



第 1233 圖

