

第1234圖



第1235圖



第1236圖



くさふち

Vicia Cracca L. var. japonica Miq.
原野或ハ山麓地帶等ノ草中ニ生ズル多年生草本ニシテ地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖ハ強壯ナル蔓性ニシテ長ク伸ビ綠色ニシテ稜線多ク多少細毛ヲ帶ブ。葉ハ互生シ無柄ニシテ羽状複葉ヲ成シ先端ハ分岐セル卷鬚ト成リ他物ニ卷絡ス。小葉ハ多數ニシテ互生シ兩側各八乃至十三片アリテ鮮綠色ヲ呈シ、線狀披針形ニシテ長サ1.5-3.5cm、葉頭鈍圓形ニシテ微凸尖アリ。托葉ハ二深裂シ裂片ハ狹クシテ尖レリ。六月ノ候、梢葉腋ニ花梗ヲ抽キ穗狀様ノ偏側生總狀花序ヲ成シテ藍紫色ノ多數蝶形花ヲ開キ、甚ダ優美ナリ。花ハ長サ6mmニシテ萼ハ筒形ヲ成ス。花瓣ハ長シ。莢ハ長サ凡2.5cm、無毛ニシテ中ニ通常五種子ヲ入ル。牧草ニ可ナレドモ我邦ニテハ未だ利用セラレズ。和名ハ草藤ノ意ニシテ其草狀ト花狀トニ基ク。

おほばくさふち

Vicia pseudo-Orobos Fisch. et Mey.
var. *Tanakae* Makino.
(=V. *Tanakae* Franch. et Sav.)
山麓地帶或ハ原頭等ニ生ズル多年生草本。莖ハ綠色ヲ呈シ、細クシテ蔓狀ヲ成シ稜アリテ毛ナシ。葉ハ互生シテ短柄ヲ具ヘ羽状複葉ニシテ小葉ハ橢圓形・卵形或ハ長卵形ヲ呈シ、長サ3-6cm許ニシテ先端尖リ、互生或ハ對生シテ兩側各二乃至四片ヲ有シ、葉軸末ニ一或ハ兩岐セル卷鬚ヲ具ヘ長ク延ビテ他物ニ纏フ。托葉ハ綠色小形ニシテ銳頭、齒牙緣ヲ成ス。秋日、葉腋ニ10cm内外ノ花軸ヲ出シ、偏側生總狀花穗ヲ成シテ多數ノ紫碧色花ヲ開ク。花ハ長サ10-15mm。萼ハ筒形ニシテ先端ハ淺ク分レテ尖ル。花瓣ハ稍長シ。莢ハ長サ25-30mmニシテ無毛、熟スレバ赤褐色ヲ呈ス。種子ハ圓形、黑色ナリ。和名ハ大葉草藤ノ意ナリ。

つるふちばかま


Vicia amoena Fisch.
var. *sachalinensis* Fr. Schm.

原野竝ニ山足地帶等ニ生ズル多年生蔓草ニシテ地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖ハ長ク伸ビ卷鬚ニ由テ他草ノ上ニ繁衍シ、方形ニシテ葉裏ト共ニ細毛ヲ被ル。葉ハ互生シ殆ド無柄ニシテ羽状複葉ヲ成シ先端ハ分岐セル卷鬚ト成リテ他物ニ纏フ。小葉ハ葉軸ノ兩側各五乃至七片ニシテ或ハ對生シ或ハ互生シ、長橢圓形又ハ線狀橢圓形ヲ成シ、銳頭又ハ鈍頭ニシテ微凸尖アリ。托葉ハ齒牙緣アリ。總狀花序ハ花梗ヲ有シテ腋生シ長サ7-10cm許、秋季ニ短小梗アル多數ノ紅紫色蝶形花ヲ開キくさふぢノ花ヨリ大キク、長サ凡12mm。萼ハ鐘形ニシテ短ク五裂シ裂片尖レリ。旗瓣ハ倒卵形、翼瓣ハ旗瓣ト稍同長。莢ハ長橢圓形ニシテ無毛ナリ。和名ハ蔓藤椅ノ意ニシテ蔓ハ草狀、藤椅ハ紫色花ニ擬セシナリ。

第1237圖



第1238圖



なんてんはぎ(歪頭菜)

一名 たにわたし・ふたばはぎ
Vicia unijuga A. Br.

山麓地帶或ハ原頭ニ生ズル多年生草本ニシテ根ハ強シ。全株無毛、莖ハ叢生シ直立或ハ傾斜シ高サ30-60cm許、瘦長ニシテ質硬ク四稜アリテ綠色ヲ呈ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ一對二片ノ斜ニ開出セル小葉ヨリ成リ、卷鬚無シ。小葉ハ長橢圓形或ハ廣披針形ニシテ葉頭ハ銳尖、葉底ハ銳形ヲ呈シ、長サ3-7cm許アリ、全邊ニシテ緑毛アリ。托葉ハ綠色ニシテ稍腎臟形ヲ呈シ一側方ハ銳尖ヲ成シ一側方ハ尖粗齒アリ。夏秋ノ間、葉腋ニ花軸ヲ抽キ上部ニ短總狀花序ヲ成シテ小梗アル紅紫色ノ蝶形花ヲ開ク。花長凡12mm。萼ハ短筒形ニシテ先端ノ五裂片ハ線形ナリ。旗瓣ハ倒卵形ヲ成ス。花後長サ5cm許ノ無毛平滑ナル莢ヲ結ブ。農家往々其嫩莢ヲ食フ、あづき菜ト呼ブ。和名南天萩竝ニ二葉萩ハ其葉状ニ基キ、谷渡しハ其名稱適切ナラズ、或ハ時ニ莢弱ク偃臥スルコトアルヲ以テ鉛側ニ横タブ意味ニテ斯ク名ケン乎。

みやまたにわたし

Vicia unijuga A. Br. var. *bifolia*
Makino. (=V. *bifolia* Nakai.)

我邦中部ノ山中樹陰ニ生ズル多年生草本。高サ30cm内外。地下ニ細キ根莖アリテ往々横走セル分枝ヲ有ス。莖ハ直立シテ細ク、之曲シテ稜角アリ。葉ハ互生シ極メテ短キ葉柄ヲ具ヘ疎ニ莖上ニ散着シテ二小葉ヨリ成リ、小葉ハ披針形長サ3-4cm、銳尖頭ヲ有シ基脚ハ狭ク、不明ノ微鈍齒アリテ多少波皺シ質極メテ薄シ。夏日、葉腋ヨリ出ヅル短梗上ニ葉ヨリ短キ總狀花序ヲ直立シテ着ケ、紅紫花ヲ開ク。各花ノ下ニハ廣卵形ノ苞アリ。花ハ細長クシテ偏側生ヲ成ス。萼ハ筒形ニシテ先端斜形ヲ呈シ五齒アリ。旗瓣ハ直立シテ開カズ。なんてんはぎニ似テ、葉ハ細長ク、質菲薄、花序ニハ苞アリ且ツ彼ヨリハ高處ニ生ズルヲ以テ區別スペシ。

第1239圖

