

第 1378 圖

いばら科



えびがらいちご

一名 うらじろいちご

Rubus phoenicolasius Maxim.

山地ニ生ズル落葉灌木ニシテ莖ハ初メ直立スルモ後蔓様ト成ル。全株ニ紫赤色ノ剛毛狀腺毛ヲ密生シ、其毛間ニ散生セル刺ヲ見ル。葉ハ五生有柄、三出複葉、小葉ハ卵形又ハ廣卵形、長サ4-8cm、幅3-6cm、鋭頭圓底ニシテ邊緣缺刻狀鋸齒ヲ有シ、上面ニハ散毛アレドモ下面ニハ白綿毛ヲ密布ス。頂小葉ハ大形ニシテ時ニ三裂スルコトアリ。托葉ハ線狀披針形。花ハ初夏ニ開キ枝端ニ密總狀花序ヲ成シテ着ク。萼片ハ狭披針形ニシテ長ク尖リ開花時ニハ平開シ、外面ニ腺毛密布ス。花瓣ハ五片、淡紅紫色ニシテ倒卵狀鐘形ヲ成シ、直立ス。雄蕊ハ多數ニシテ極メテ短シ。核果ハ相集リ圓形ヲ呈シテ赤熟シ、種子ニ皺アリ。和名ハ蝦蟇毒ノ意、其莖并ニ葉柄ニ紅紫色ノ粗毛多キヲ以テ之ヲレヲえびノ殻ニ喩ヘシ者ナリ、裏白莓ハ葉裏白色ナルヲ以テ云フ。

第 1379 圖

いばら科



なはしろいちご (紅梅消)

一名 あしくだし・さつきいちご・さとめいちご

Rubus parvifolius L.

(=R. triphyllus Thunb.)

原野ニ自生スル匍匐性ノ落葉小灌木ニシテ莖ハ長サ1.4m内外ニ達シ、直立莖ハ30cm内外ニシテ殆ド毛無ク小刺ヲ生ズ。葉ハ五生三出或ハ時ニ羽狀五小葉複葉、小葉ハ菱狀倒卵形、圓頭、楔底或ハ截底、邊緣ハ缺刻狀粗齒牙ヲ有シ、或縁ハ時ニ二裂若クハ三裂シ、上面ハ無毛ニシテ綠色ナレドモ下面ニハ白色ノ毳毛ヲ密生シ、長幅各2-5cm許アリ。托葉ハ線狀披針形ニシテ全縁ナリ。花ハ夏ニ開キ疎聚繖花序ヲ成シテ枝ノ上部ニ腋生或ハ頂生ス。萼裂片ハ卵狀披針形鋭尖頭、上下兩面ニ毳毛密生シ、下面ノ基部ニハ小刺ヲ生ズ。花瓣ハ五片アリテ淡合シ淡紅紫色、倒卵狀鐘形ニシテ萼片ヨリ短シ。核果ハ稍粗大ニシテ數粒相集リ小球形ヲ成シ六月熟シテ深赤色ヲ呈シ食フベシ。和名苗代莓ハ六月苗代時ニ其實熟スルヨリ云フ、あしくだし(筑前ノ方言)ハ之ヲ煎ジ飲メバ腹中ノ悪キノモノヲ下スノ意乎、阜月莓ハ陰曆五月ニ其實熟スルヨリ云ヒ、早乙女莓ハ早乙女ノ田植ユスル時節ニ其實熟スルヲ以テテスク云フ。漢名 藕田蕪(誤用)

第 1380 圖

いばら科



くろいちご

Rubus Kinashii Lev. et Vnt.

(=R. exsuccus Makino.)

山地ニ生ジ放縱生長ヲ成ス落葉亞灌木。莖ハ細長ニシテ多少蔓ノ如ク延ビテ分枝シ逆向ノ刺アリ又細毛ヲ布ク。葉ハ疎ニ莖上ニ五生シ長柄アリ羽狀三出葉ナレドモ往々五小葉ヲ成ス者アリ、小葉ハ廣卵形ニシテ平坦、鋭頭或ハ鋭尖頭、底部ハ圓形或ハ截形、不整ノ齒牙縁ヲ有シ、下面ハ白色ノ毳毛ヲ密布シ脈上小刺アリ。托葉ハ鉞狀ニシテ葉柄ノ基脚ニ沿着ス。六七月ノ候、側生ノ小枝端ニ繖房花序ヲ頂生シテ少數ノ花ヲ開ク、花梗ニハ密毛アレドモ刺ナク細シ。萼片ハ兩面白毛ニ富ム。花瓣ハ五片ハ小形、白色ニシテ鐘狀倒卵形ヲ呈ス。八月、核果ハ小形ニシテ聚合シ徑8mm許ノ球狀ヲ成シ熟スレバ紫色ヲ經テ黒熟シ特狀ヲ呈ス。和名黒莓ハ其實熟スルヲ以テ云フ。

ときんいばら (酴醾)

一名 ぼたんいばら

Rubus Commersoni Poir.

(=R. rosifolius Sm.)

var. coronarius Sims.)

支那ノ原産ニシテ往時我邦ニ渡來シ、今ハ廣ク觀賞ノ爲メ人家ニ栽培セラルル落葉小灌木ニシテ地下莖ヲ引テ繁殖ス。莖ハ直立シ或ハ傾斜シ高サ1m内外ニ達シ、綠色ニシテ稜アリ、疎ニ分枝シ、無毛ニシテ眞直ノ刺ヲ散生ス。葉ハ五生シ奇數羽狀複葉、下方ノ者ハ五小葉アレドモ花ニ近キ者ハ三小葉ト成ル。小葉ハ卵狀披針形、鋭頭、鈍底或ハ圓底、邊緣重鋸齒或ハ缺刻狀鋸齒ヲ成シ、上面ハ多數ノ斜上支脈ニ沿テ皺ヲ成シ兩面ニ毛ナキモ小腺毛アリ、葉軸ニ尖鉤刺ヲ散生ス。托葉ハ狭線形。花ハ五六月ノ候ニ開キ側生ノ小枝端ニ單生シ大形ノ白色重瓣花ニシテ一見いばら屬ノ花ノ如シ。花後實ヲ生ゼズ。和名頭巾薔薇ハ其八重咲ノ花ヲ山伏ノ前額上ニ戴ケルときん(頭巾又ハ兜巾)ノ頂ノ十二髮積ニ擬セシモノナリ、牡丹薔薇ハ其重瓣花ニ基キテ云フ。

第 1381 圖

いばら科



ばらいちご

一名 みやまいちご

Rubus Commersoni Poir.

var. illecebrosus Makino.

(=R. illecebrosus Focke; R. Commersoni Poir. var. simpliciflorus Makino.)

山地ニ生ズル草狀ノ小灌木ニシテ長ク地下莖ヲ引テ盛ニ繁殖ス、莖ハ無毛ニシテ直立シ一般ニ低ククレドモ高キ者ハ40cm餘ニ達シ、綠色ニシテ稜アリ尖刺ヲ散生シ、上部ハ疎ニ分枝ス。葉ハ有柄五生シ奇數羽狀複葉、小葉ハ二-三對、短キ小葉アリ、披針形ニシテ鋭尖頭、圓底、長サ4-8cm、幅1-3cm、邊緣ハ重鋸齒或ハ缺刻狀鋸齒ヲ成シ、兩面無毛、上面ハ多數斜上セル支脈ニ沿フテ皺ヲ成ス。托葉ハ披針形全縁ナリ。花ハ七月ニ開キ白色ニシテ枝端ニ單生シ徑3cm許、花梗ハ無毛ニシテ小刺アリ。萼片ハ卵狀三稜形ニシテ上部漸尖シ長尾頭ヲ成シ細毛アリ。花瓣ハ五片平開、廣橢圓形又ハ倒卵形、萼片ヨリ長シ。核果ハ小形、多數相聚合シテ橢圓形ヲ呈シ赤熟ス。本種ハときんいばらト同種ト斷ズベキ理由アリ。和名刺莓ハ莖葉ニ尖銳刺多キヲ以テ名ク、深山莓ハ山中ニ多クレバ云フ。

第 1382 圖

いばら科



ふゆいちご

一名 かんいちご

Rubus Buergeri Miquel.

山地ノ樹陰側等ニ多ク生ズル常綠ク蔓性小灌木ニシテ莖ハ直立或ハ横斜シ高サ凡20-30cm許、絨毛ヲ布クト雖ド毛刺無シ、別ニ長キ匍枝ヲ引キ長キ者凡2m許ニ達シ通ジテ短柄ノ葉ヲ着ケ其末端ニ新苗ヲ生ジテ繁殖ス。葉ハ五生シ長柄アリ稍圓狀五角形ニシテ淺ク五裂シ、底部ハ心臟形、裂片ハ圓頭或ハ鈍頭、細齒牙縁、上面ハ毛少キモ下面ハ葉柄ト共ニ毛茸ヲ密生ス。夏日葉腋ニ短花軸ヲ出シテ五-十箇ノ白花ヲ着ク。萼片ハ五、三角狀披針形、鋭尖頭、内外面ハ花梗ト共ニ絨毛ヲ密生ス。花瓣ハ五片、長橢圓形ニシテ萼片ヨリ稍長シ。核果ハ多數聚合シテ圓形ヲ成シ下ニ宿存萼ヲ伴ヒ冬日赤熟シテ食フベシ。和名冬莓ハ其實冬ニ熟スルヨリ云ヒ、寒莓ハ同ジク寒中ニ熟スルヲ以テ云フ。漢名 寒莓(誤用)、是レ蓬蘽ノ一名ニシテ我がふゆいちごニ非ズ。

第 1383 圖

いばら科

