

第1402圖

いばら科



## なんきんななかまご

一名 こばのななかまど

*Sorbus gracilis* K. Koch.

山地ニ生ズル落葉灌木ニシテ高サ2m内外、幼條ニ毛アリ。葉ハ奇數羽状複葉。小葉ハ三-四對、上部ノ者大形ニシテ下部ニ至ルニ從ヒ遡次小形ト成ル、橢圓形ニシテ銳頭、下半部ハ全緣、上半部ハ鈍狀鋸齒緣ヲ成ス。葉柄ニハ軟毛多ク生ズルモ、葉面ハ無毛ナリ。托葉ハ大形、葉狀、稍圓形ヲ成シ、鋸齒緣ヲ呈ス。花ハ頂生繖房狀花序ヲ成シテ初夏ニ開キ黃綠色ヲ呈ス。萼ハ倒圓錐形、五淺裂、裂片ハ卵形、殆ド無毛。花瓣ハ五、白色、卵狀橢圓形ナリ。雄蕊ハ二十、花柱ハ二-三。果實ハ球形、徑6mm内外、紅熟ス。和名南京七竈ハ其樹矮小ナルヲ以テ斯ク名ケ敢テ外來ヲ意味セズト謂フ、小葉の七竈ハ其葉ななかまどニ比スレバ小形ナルヲ以テ云フ。

第1403圖

いばら科



## ざいふりぼく

一名 しでざくら

*Amelanchier asiatica* Endl.

中部以南ノ山地ニ生ズル小喬木。幹ハ無毛、帶紫色ナリ。葉ハ上面ハ無毛ニシテ下面ハ幼時白色又ハ肉色ノ綿毛密布スルモ老成スレバ無毛ト成ル、橢圓形ニシテ銳頭、鈍底、長サ5-7cm、幅2.5-4cm許、邊緣ハ微小鋸齒ヲ有シ、十-十三對ノ支脈アリ。長葉柄アリ。春時、短枝頂ニ繖房狀總狀花序ヲ成シテ白花ヲ擴開シ花梗ニ毛アリ。萼ニハ綿毛密布シ萼片ハ披針形ニシテ反捲ス。花瓣ハ五片ニシテ線形、長サ10-15mm、幅2-3mmアリ圓頭ヲ成ス。雄蕊ハ二十、萼筒ヨリ稍長シ。花柱ハ五、基部癒着シ、微毛アリ。梨果ハ小球形、徑6mm内外、宿存萼ヲ具フ、熟スレバ紫黒色ヲ呈ス。和名ハ采振り木ノ意ニシテ花穗ヲ采配即チ塵ニ擬セシナリ。四手櫻ハ同ジク其花穗ノ見立テニシテ白木綿或ハ白紙ノ四手ヲ掛ケシ如ク白ク見ユル故云フ。漢名扶搖(誤用、此樹ハ一ニ高飛又ハ獨搖ト稱シ我ガはこやなぎニ似タルPopulus屬ノ一種ニシテ葉圓ク葉柄扁弱能ク微風ニモ搖クナリ)

第1404圖

いばら科



## うしころし

一名 かまつか

*Pourthiae villosa* Decne.

(=Crataegus villosa Thunb.)


山野ニ生ズル落葉ノ灌木又ハ小喬木ナリ。葉ハ倒卵形或ハ狹長倒卵形或ハ楔狀倒卵形、急銳尖頭、楔狀底、長サ4-10cm、幅2-5cm内外、細尖鋸齒緣、表面初メ毛アリテ後裸出シ裏面ニハ細毛アリ。支脈ハ中脈ノ兩側各五-八條アリ。春時白色ノ小花ヲ枝端ニ頂生セル繖房狀ニ綴リ、果時ニ及シ花軸・花梗ニ褐色ノ皮目多シ。萼ハ短鐘狀、花梗ト共ニ毛アリ、五淺裂、裂片ハ鈍狀三角形。花瓣ハ五、倒卵狀圓形、楔底。雄蕊ハ二十、花瓣ト稍同長。花柱ハ三、基部癒合シ、其下部ニ軟毛密生ス。果實ハ卵狀球形又ハ廣卵狀橢圓形、長サ7-9mmアリ、紅熟ス。材頗ル粘軟ニシテ堅ク、鎌ノ柄ニ用キラルルニ由リ鎌柄ノ名ヲ得、又牛ノ鼻ニ綱ヲ通ス時此木ヲ以テ鼻障ニ孔ヲ穿ツヨリ牛殺しト稱ス。一變種ニ葉小形ニシテ毛ナク、繖房花序稍小形、花モ亦小ナル者アリ、けなしらしころし(var. laevis Dipp. =*Crataegus laevis* Thunb.)ト稱ス。

第1405圖

いばら科

あかめもち  
一名 そばのき  
誤稱 かなめもち  
*Photinia glabra* Maxim.

溫暖ノ地ニ生ズル常綠小喬木ニシテ又多ク藩籬ニ作ル。葉ハ有柄互生、革質平滑、倒披針狀長椭圓形、5-10cm、底部狹窄シ先端銳尖、邊緣ニ細鋸齒アリ、葉面少シク光澤アリ下面黃綠ヲ帶ビ中脈ハ下面ニ隆起セリ、葉柄1-1.3cm。托葉鍼形、早落ス。新葉ハ紅色ヲ帶ビテ美シク落葉前ニハ復タ紅葉ス。花ハ五六月發ラキ小ニシテ白色、花序ハ圓錐形ニシテ横ニ擴リ徑7-13cm、萼花軸平滑、皮目無シ。萼筒ハ短キ倒圓錐形、萼齒三角形。花瓣廣椭圓形乃至圓形、基脚綿毛アリ流下シテ花爪ヲ成シ花時背反ス。雄蕊二十許。子房半上位二室、二花柱接在並列シ基脚癒合セリ。蜜腺黃色。果實ハ橢圓狀球形、徑5mm許、宿存萼片ヲ頂ク、秋冬ノ候熟シテ紅色ヨリ云ス。和名赤芽モテ要もちト呼ビ其材ニテ扇形ノ要ヒ、之ヲ誤リテ要もちト呼ビ其材ニテ扇形ノ要ヒ造ルト云フハ妄ナリ、薺麥の木ハ其白花滿開ノ狀薺麥花ニ似タルヨリ云フ、そばヲ稜角ノ意トスルハ非ナリ。



第1406圖

いばら科

びは(枇杷)  
*Eriobotrya japonica* Lindl.

九州四國ノ山地(主トシテ石灰岩地)ニ野生アレドモ通常果樹トシテ栽植セラル常綠喬木。高サ10m内外アリテ枝極開出、圓キ樹冠ヲ成ス。嫩枝ハ密ニ淡褐色ノ絨毛ヲ被フル。葉ハ大形ニシテ短柄互生、長椭圓形或ハ倒披針狀長椭圓形ニシテ長サ15-20cm、銳頭狭底、邊緣ハ低波狀鋸齒アリ、表面ハ暗綠色初メ有毛ナレド後チ無毛多少ノ光澤ヲ存シ脈絡陷入シテ凹凸アリ、裏面ハ淡褐色ノ絨毛ヲ密布ス、質厚クシテ剛硬ナリ。晚秋初冬ノ候ニ長サ5-6cm許ニシテ分枝平開セル三角狀圓錐花序ヲ成シテ白花ヲ開包マル。花軸・花梗・萼片共ニ密ニ淡褐色ノ絨毛を包ム。梨花ハ五萼五瓣、芳香アリ、翌夏ニ至リテ果球形ノ梨果黃熟シ食フベク、果面ニ綿毛アリ、中ニ巨大ノ赤褐色ノ種子ヲ藏ス。茂木びはハ果長ク、田中びはハ唐びはハ一品種ニシテ果實大キク徑4cm内外アリ。往々葉ヲ民間藥トス。和名ハ漢名枇杷ノ音ナリ、枇杷ハ樂器ノ琵琶ニ似タル故名ク。



第1407圖

いばら科

すみ  
一名 ひめかいだら・こりんご・みづばかいだら  
*Malus Toringo* Sieb.  
(=*Pyrus Toringo* Sieb.; *P. Sieboldii* Regel; *Malus Sieboldii* Rehd.)

山地ニ多キ落葉樹、樹高10m=達シ、枝ハ擴散シ廣キ樹冠ヲ作ル、小枝ハ帶紫色ニシテ往々刺化セリ。葉ハ有柄互生、長椭圓形、橢圓形、卵狀橢圓形等ニシテ尖リ、邊緣鋸齒アリ、長サ4-10cm、幅2-8cm。葉面深綠色、新葉ハ軟毛ヲ被リ、成葉ハ無毛乃至有毛。葉柄1.5-5cm許。托葉鍼形、早落ス。枝端ノ葉ハ時々三裂乃至羽狀ニ分裂シ、其托葉ハ葉狀ト成リテ多少殘存ス。花ハ三-七箇ニシテ短キ新枝ノ先端ニ繖形ニ出ゾ。花梗細長、1-3cm。萼筒臺形、萼片披針形、尖リ、内面綿毛アリ外面ハ萼筒・花梗ト共ニ有毛乃至無毛、花時開張乃至背反ス。花徑2-5cm、花瓣開ケ白白色ナルモ蕾時ハ紅色ヲ帶ブ、瓣片ハ橢圓形乃至圓形。梨果三-七箇、繖開シ形小ニシテ球形、6-10mm、紅色或ハ黃色、果頭ニ萼片脱痕ヲ戴ク。四月ヨリ六月ニ至リテ開花シ九月ニ果實成熟ス。和名ズミハそみ(染み)ノ意ニシテ其皮ヲ染料ニ使用ス故ニ云フ。姫海棠ノ花狀。小林檎ハ其小果ニ基キシ稱ナリ。漢名棠梨(誤用)

