

第 1432 圖

まんさく科



まるばのき
一名 ベにまんさく
Disanthus cercidifolia Maxim.

本州中部以西ノ山地ト四國ノ山地トニ生ズル落葉灌木。高サ1-3m。葉ハ長柄アリテ互生シ、卵圓形或ハ圓形、銳頭或ハ鈍頭、心臟底、全邊、長サ5-10cmヲ算シ厚膜質ニシテ毛ナク上面綠色下面帶白色、秋ニ紅葉シ美ナリ。晩秋葉將ニ謝セントスルノ候葉腋ニ短梗ヲ出ダシ梗頂ニ背ヲ合セテ接着セル二花ヲ開キ暗紅色ニシテ腥臭アリ、梗本ハ鱗片數箇ヲ以テ包マル。萼ハ小形、花瓣ハ五片開出シテ星芒狀ヲ成シ各片狭長ニシテ上部漸殺シ先端ハ絲狀ヲ呈ス。雄蕊五箇ハ短シ。花柱二箇、子房ハ二室。蒴ハ年ヲ越エテ次年ノ花時ト同期ニ熟シ、大形ニシテ厚扁シ稍扁キ圓形ニシテ凹頭ヲ有シ、二顆相並ビ殼質ニシテ帶白綠色ヲ呈シ後暗褐色ニ變ジ、四短片ニ開裂シテ各室ニ黑色ノ光澤アル種子ヲ三箇以上藏ス。和名圓葉の木ハ其圓形葉ニ基ツキ、ベに満作ハ其赤色花ニ基キテ稱ナリ。

第 1433 圖

とべら科



とべら
一名 とびらぎ・とびらのき
Pittosporum Tobira Ait.

海岸地方ニ多ク自生スル常綠灌木ニシテ特ニ根皮ニ一種ノ臭氣アリ。高サ2-3m。葉ハ互生ナレドモ枝ノ上部ニ密接シテ生ズ、質厚ク表面稍光澤アリ乾ケバ革質ト成ル、倒卵狀長橢圓形、圓頭或ハ鈍頭、楔底、長サ8-10cm、幅3cm内外、兩面無毛ニシテ葉緣往々下面ヘ反捲ス。花ハ六月ニ開キ白色ニシテ後黃變シ芳香アリ、頂生ノ聚繖花序ヲ成シテ擡簇ス。雌雄異株ナリ。萼片ハ五、卵形銳頭毛緣ナリ。花瓣ハ筒形ニシテ有花爪、上部ハ平開或ハ反卷ス。雄蕊ハ五、雄花ニ於テ長ク、雌花ニ於テ短クニシテ不實ナリ。子房ハ卵形ニシテ三心皮ヨリ成リ一花柱アリ、雄花ニ於テハ不實ナリ。果實ハ球形、徑10-15mm、熟スレバ三裂シ赤キ種子ヲ出ス。節分ニ之ヲ扉ノ木ト云フ。漢名 海桐花 (誤用、此品ハ蓋シ同屬ノ他種ニシテ支那ニ産スル者ナリ)

第 1434 圖

とべら科



しまとべら
一名 たうそよご
Pittosporum undulatum Vent.

濠洲原産ノ常綠灌木ニシテ我が内地ニハ明治初年ニ小笠原島ヨリ移入シ植物園等ニ栽培ス。葉ハ互生シテ枝端ニ集リ略ボ輪生様ヲ呈シ、披針形或ハ長橢圓形ニシテ兩端尖リ、邊緣ハ波狀鋸齒緣或ハ全緣ニシテ鋸アリ、長サ6-8cm、幅2-3cm、幼時毛アルモ後全ク無毛ト成リ乾ケバ革質ヲ呈ス。花ハ白色ニシテ芳香アリ、五-六月ノ頃聚繖花序ヲ成シテ枝端ニ開ク。萼片五、花梗ト共ニ毛多ク生ジ、披針形銳頭ニシテ先端背反ス。花瓣ハ長橢圓狀筒形ニシテ萼片ノ倍長アリ、先端平開ス。花ハ單性ニシテ雌雄異株ナリ。雄蕊ハ五アリ、雄花ニ於テ長ク、雌花ニ於テ短ク不實ナリ。果實ハ球形ニシテ無毛、徑1cm内外、熟スレバ三裂ス。種子ハ赤色ナリ。和名島とべらハ初メ海島ヨリ來リシ故云フ。唐そよごハ國外ヨリ來リ其葉そよご葉ニ彷彿タルヲ以テ云フ。

すぐり

Ribes grossularioides Maxim.

信濃國特産ノ落葉灌木ニシテ叢生シ多ク分枝シ高サ1m内外、葉腋下ニ三強針ヲ有ス。葉ハ互生或ハ枝上ノ短枝ニ叢生シ葉柄アリ、稍圓形、截底或ハ稍心臟底、淺ク三-五裂シ裂片ハ粗鈍齒牙緣、兩面毛アリ、毛緣或ハ腺毛緣ヲ成ス。葉面ハ長幅共ニ3cm内外。葉柄ハ2cm内外、毛多シ。花ハ五月ニ開キ葉腋ニ單生、白色ヲ呈シ下垂ス。萼筒ハ卵形、稍無毛、裂片ハ長橢圓形、長サ6mm内外、多ク反曲シ、花瓣ハ披針形、萼片ノ半長アリテ多クハ直立ス。雄蕊五、花瓣ト同長。花柱ハ雄蕊ト同長、先端二裂ス。果實ハ平滑、廣橢圓形或ハ球形ノ漿果ニシテ下垂シ熟シテ褐赤色ヲ呈ス、食スベシ。本種ハせいやうすぐり即チぐーすべリニ似タリト雖ドモ別種ナリ。和名ハ蓋シ酸塊ノ意ニシテ酸味アル實ニ基ツキテ稱ナリ、くりくり石ノくり(塊)竝ニくりくり坊主或ハくりくり眼玉ノくりト同意味ニシテ圓キ實ヲ表ハセシ辭ト思フ。

第 1435 圖

ゆきのした科



せいやうすぐり

一名 まるすぐり
すぐり (誤稱)

Ribes Grossularia L.

歐洲・北あふりか・西南あじあノ原産ニシテ明治初年ニ渡來セシ落葉小灌木。處々ニ栽培セラレ。叢生シ高サ1m内外ニシテ分枝シ、葉腋ノ下ニ一-三岐セル強針ヲ有ス。莖ニハ時ニ刺毛アリ。葉ハ互生或ハ枝上ノ短枝ニ束生シ葉柄ヲ有シ、稍圓形ニシテ長幅共ニ2-3cm許、底部ハ稍心臟形、三-五裂シ裂片ハ粗鈍齒牙緣アリ、兩面毛多ク、又毛緣ヲ成ス。四-五月ノ候花ヲ簇葉間ニ出シ、通常白色ノ一花ヲ下垂ス。花梗ハ短ク上部ニ二小苞ヲ具フ。萼筒ハ橢圓形ニシテ毛アリ、裂片ハ五、長橢圓形ニシテ反曲ス。花瓣ハ五、細小、倒卵形ニシテ直立ス。雄蕊五、花瓣ヨリ稍長シ。果實ハ球形ノ漿果、徑2cm内外、有毛ニシテ黃綠色ニ熟シ食用トス。通常之レヲすぐりト呼バハ非ナリ。西洋ニテハ俗ニGooseberry 或ハ English Gooseberry ト云フ。

第 1436 圖

ゆきのした科



ふさすぐり

一名 あかすぐり
Ribes rubrum L.

歐亞大陸ノ原産ニシテ明治年間ニ渡來シ今ハ諸處ニ栽培セララル落葉小灌木ニシテ高サ1m内外ニ達シ、枝ハ無毛無刺ナリ。葉ハ互生シ長柄アリ、五掌狀裂ヲ成シ、裂片ハ不齊鋸齒緣、銳頭ナリ、葉底ハ心臟形ヲ呈ス。上面ハ無毛ナレドモ下面ニハ柔毛アリ、葉柄ニハ毛少シ。春日葉腋ニ總狀花序ヲ出シテ下垂シ多數ノ花ヲ着ク。花ハ帶綠或ハ帶紫白色ニシテ短梗ヲ有ス。萼片ハ杯形ニシテ無毛其裂片ハ廣倒卵形ニシテ平開ス。花瓣ハ小形ニシテ直立ス。雄蕊五、花瓣ト同長ナリ。花柱ハ兩岐ス。果實ハ赤色平滑ノ小形漿果ニシテ食用トスベシ。西洋ニテハ俗ニ Red Currant 或ハ Wild Currant ト云フ。和名ヲ房酸ぐりト云フハ其果實房(ふさ)ヲ成セバナリ。又赤酸ぐりト云フハ其果實赤色ヲ呈スレバナリ。

第 1437 圖

ゆきのした科

