


第 1468 圖

ゆきのした科



第 1469 圖

ゆきのした科



第 1470 圖

ゆきのした科



ねこのめさう

Chrysosplenium Grayanum Maxim.

山中或ハ山足等濕潤ノ地ニ生ズル多年生小草本ニシテ全體淡綠色ナリ。莖ハ横臥シ、節ヨリ根ヲ下ス。花莖ハ高サ5-20cm。葉ハ對生シテ葉柄アリ、卵形ニシテ鈍鋸齒ヲ具ヘ、長サ5-15mmアリ、花ニ近キ者ハ多クハ殊ニ黃色ヲ呈ス。三四月ノ候莖頭ニ淡黃色ノ小花ヲ集メ開ク。花ハ徑2mm許、萼片ハ四箇、稍方形圓頭ニシテ直立シ内側凹ム。花瓣無シ。雄蕊四本、萼片ト對生シテ其レヨリ短ク、葯ハ黃色ナリ。花柱ハ極メテ短シ。蒴果ハ深く二裂シ、裂片不同、頂ニ一縫線アリ猫兒ノ晝間眼睛ニ似タリ、故ニ猫ノ眼草ノ名アリ、是レ原ト漢名ノ猫兒眼睛草ニ基ケドモ此漢名ノ者ハ本品ニ非ズテたかとうだい科ノとうだいぐさと爲ルヲ正トス。種子ハ微小ニシテ滑澤褐色、顯微鏡下ニ窺ヘバ小乳頭狀突起ヲ布クヲ見ル。漢名 猫兒眼睛草(誤用)

やまねこのめさう

Chrysosplenium japonicum Makino.

諸國人家附近ノ陰地或ハ石垣ノ間等ニ生ズル多年生草本。全株鬚毛ヲ散生シ、淡綠色ニシテ極メテ多汗脆弱ナリ。根際ニ長サ2-3mm、汚紫色ノ肉芽ヲ有ス特徴アリテ匍枝ヲ缺ク。根葉ハ三四、圓形心臟底、長柄アリ、低鈍齒牙縁ヲ有ス。莖ハ高サ10-15cm、三四ノ銳稜アリ、二三ノ小形葉ヲ互生ス。早春莖頭ニ無瓣ノ細線花ヲ綴ル。花下ニ倒卵形或ハ卵圓形ノ葉狀苞アリ。萼片ハ四箇、廣卵形鈍頭ニシテ開出シ綠色。雄蕊ハ短花絲ヲ有シテ八本アリ。花柱ニハ平板狀ノ子房上壁ニ相反シテ立ツ。蒴果ハ初メ兩角狀ナレドモ五月ノ候開裂シ低平ナル四小片相開キテ盃狀ヲ呈シ徑5mmニ達シ、底ニ暗褐色ノ小種子ヲ露ハス。種子ハ橢圓形、一側有胚、鏡下ニ照ラセバ全面ニ微小毛ヲ布クヲ見ル。我邦本屬ノ品種多キモ大抵對生葉ヲ有シ互生葉品ハ甚ダ鮮ナン。

みやまねこのめさう

一名 いはばたん・よつばゆきのした

Chrysosplenium macrostemon

Maxim.

山地ノ溪側ニ生ズル多年生小草本ニシテ莖ハ通常高サ10-20cm許、紫色ヲ帶ブ。葉ハ對生ニシテ長キ柄ヲ具ヘ、下部及ビ匍枝先端ノ者ハ往々大形ト成リテ對葉頗ル著シ、葉片ハ卵形或ハ廣卵形ヲ呈シ邊緣ニ顯著ナル鋸齒ヲ有シ、綠紫色ニシテ大抵葉面ニ汚白斑アリ。四月頃莖梢ニ枝ヲ分チ、淡黃綠色ノ小花ヲ開ク。花序ノ葉ハ細長シ。萼片ハ四箇、卵形ニシテ概ネ平開シ、花瓣ヲ缺ク。雄蕊ハ八本、萼片ヨリ長クシテ花上ニ超出シ、葯ハ黑紫色ヲ呈シ黃花粉ヲ吐ク。蒴果ハ深く二裂シ、種子ハ縱ニ十餘ノ稜線アリ、稜上ニ疣狀突起ヲ列生ス。和名ハ深山猫眼草ノ意。岩牡丹ハ其傍枝ノ葉狀ニシテ牡丹花狀ヲ呈スルニ基ヅキ、四葉虎耳草ハ同ジク其葉對生シテ著シク見ユルニ基ヅク。

はなねこのめ

Chrysosplenium stamineum

Franch.

主トシテ關東地方ノ山間溪側ニ生ズル多年生小草本。花莖ハ高サ5cm内外、直立シテ頂ニ花序ヲ有スレドモ其他ノ莖ハ花後ニ根際ヨリ出デテ四方ニ匍匐伸長ス。共ニ暗紫色ヲ帶ビ、細クシテ多漿軟質、白縮毛ヲ布ク。葉ハ小形有柄ニシテ概ネ對生シ時ニ互生ヲ交ヘ圓卵形長サ5-8mm、少數ノ鈍鋸齒アリテ暗綠色ヲ呈ス。花序ハ頂生、花球ニシテ二三花ヨリ成リ早春開花ス。花ハ無瓣ニシテ上向ス。萼片ハ白色ニシテ四箇、直立シ集リテ鐘形ヲ呈シ、長サ5mm許、長倒卵形鈍頭、縱脈顯著ニ見ユ。雄蕊ハ八箇、花絲ハ細長、直立シテ萼片ヲ抽キ葯ハ紫黒ノ點狀ナルヲ以テ白色萼片トノ對照著シ。雌蕊一箇、花柱ハ二岐シ其高サ雄蕊ニ同ジ。熟スレバ蒴果ハ互ニ擴ガレル兩角狀ヲ呈シ、腹縫線ニ沿ヒテ縱裂ス。種子ハ微小粒、鏡下ニ見レバ縱脈アリテ脈上ニ乳頭狀突起ヲ有ス。和名花猫ノ眼ハ其白花特ニ著シク感ズルヨリ云フ。

つるねこのめさう

Chrysosplenium flagelliferum

Fr. Schm.

山地ノ溪側又ハ濕岩上ニ生ズル多年生小草本ニシテ花莖ハ高サ5-15cmアリ。莖葉ハ互生シ長キ柄アリ、小形ニシテ倒卵形或ハ稍圓形ヲ呈シ、上半ニ深キ少數ノ鈍齒ヲ有ス。匍枝ハ瘦長ニシテ先端地ニ就キ根ヲ下ス。根葉ハ長柄ヲ有シ、圓形ニシテ心臟底、邊緣ニ鈍齒ヲ具ヘ、毛茸ヲ散生シ大形ト成ル。四五月ノ候莖頂ニ枝ヲ分チ、淡黃綠色ノ小花ヲ開ク。萼片ハ四箇、卵形ニシテ平開シ、花瓣ヲ缺ク。雄蕊ハ八本ニシテ萼片ヨリ短ク、葯ハ黃色ナリ。蒴果ハ淺ク二裂シ、種子ハ平滑ナレド顯微鏡下ニテハ微細ナル乳頭狀突起ヲ布ク。和名蔓猫眼草ハ其匍枝長ク伸ブルヲ以テ云フ。


あらしぐさ

Boykinia lycopodium Engl.

中部及北部高山ノ草地ニ生ズル多年生草本ニシテ莖ハ高サ20-40cm、根莖ハ横走シ、匍枝ヲ有ス。葉ハ長キ柄アリ、概形圓形ニシテ掌狀尖裂シ、不齊ノ缺刻狀鋸齒アリ。莖下部・葉柄ハ褐毛ヲ有シ、莖上部・花序ハ短腺毛ヲ密布ス。七八月、莖上ニ聚繖花序ヲ成シ黃綠色ノ小花ヲ開ク。萼ハ五裂シ、裂片ハ稍三角形、長サ2mm許、花瓣モ五箇アリ筒形ヲ呈シ萼片ト略ボ同長ナリ。雄蕊ハ五本。花柱ハ二箇。蒴果ハ半バ萼ト癒合シ、先端ハ二裂シ、其頂ハ横ニ一縫線アリテ開裂シ、内ニ微細ナル種子ヲ藏ス。此種初メ加州白山ニ採集セラレ和名ヲあらしぐさと名ケラル、蓋シ氣象急激即チ所謂荒れ多キ高山ニ生ズルヨリ此名ヲ命ゼシナラン。

第 1471 圖

ゆきのした科



第 1472 圖

ゆきのした科



第 1473 圖

ゆきのした科

