


第1480圖



第1481圖



ゆきのした科

第1482圖



494

くろくもさう  
一名 いはぶき*Saxifraga fusca* Maxim.

深山溪側等ノ濕潤ナル地ニ生ズル多年生草本。根葉ハ簇生シ、長柄ヲ有シ、腎臟形或ハ略圓形ヲ呈シ心臓底、邊緣ニ極メテ粗大ノ歯牙ヲ列シ、漿質ニシテ無毛ナリ。七八月ノ候高サ15-30cm許ノ花莖ヲ抽キ梢ニ圓錐花序ヲ成シテ暗紅紫色ノ小花ヲ開ク。花莖ハ縮毛ヲ有シ、莖葉ヲ缺ク。萼ハ五裂シ、裂片ハ卵形。花瓣ハ五片、長幅圓形ニシテ鈍頭微凹端、長サ2mm餘。雄蕊ハ十本。花瓣ヨリ遙ニ短ク、花柱ハ二箇。北海道ニハ花梗絲狀ニ長ク花色綠褐色ナル一變種ヲ產シ、えぞくろくもさう(var. *divaricata* Franch. et Sav.)ト稱ス。和名黒雲草ハ其花色ニ基キテ云ヒ、岩ぶきハ其草岩石地ニ生ジ其葉ふきノ如ケレバ云フ。

## くもまぐさ

*Saxifraga Merkii* Eisch.  
var. *Idsuroei* Engl.

本州中部高山ノ石礫地ニ生ズル多年生小草本ニシテ高サ通常10cm以内。根莖ハ細ク、横臥ス。葉ハ簇生シ、笠形或ハ楔形ニシテ先端ハ概ね三齒ヲ有シ、稍無柄ナリ、上面及ビ邊緣ニ毛ヲ散生シ、長サ1-2cm許。七八月頃花莖ヲ抽キ、莖上ニ一乃至三花ヲ着ク。花莖ハ短腺毛ヲ密布シ、苞ハ小形ニシテ長幅圓形。萼ハ五裂シ、裂片ハ卵圓形。花瓣ハ五箇、白色ニシテ廣卵形ヲ呈シ短花爪ヲ有シ、長サ4-5mm許。雄蕊ハ十本ニシテ花瓣ヨリ短ク、花柱ハ二本。蒴果ハ先端二裂ス。和名ハ雲間草ニシテ此品時々雲ノ往来スル高山ニ生ズルヨリ此名アリ。變種名 *Idsuroei* ハ伊藤圭介博士ノ息ナル伊藤謙(ユヅル)氏ノ名ニ資リシ者ナリ。

## しこたんさう

*Saxifraga bronchialis* L.

中部以北ノ高山帶ノ岩隙ニ生ズル多年生小草本ニシテ莖ハ多數簇生ス。葉ハ密生シ、披針狀線形ニシテ先端芒狀ニ尖リ、無柄、邊緣ニ短剛毛ヲ布キ、裏面ハ往々暗紫色ヲ帶ブ、長サ5-10mm、幅1-2mm許。花莖ハ高サ3-10cmニシテ線形ノ莖葉ヲ互生シ、短腺毛ヲ散生ス。七八月頃莖頂ニ聚繖花序ヲ成シテ數箇ノ小花を開ク。萼ハ五裂シ、裂片ハ橢圓形ニシテ通常鋭頭。花瓣ハ五箇、帶黃白色ヲ呈シテ通常先端ニ近ク紅色、下部ニ黃色ノ細點シ、長サ5-7mm許。雄蕊ハ十本。花柱ハ二岐ス。蒴ハ二嘴ヲ有ス。和名ハ色丹草ノ意ニシテ此草初メ北海道根室國色丹島ヨリ來リシ故名ク。

第1483圖

むかごゆきのした  
*Saxifraga cernua* L.

本州中部ノ高山草本帶ニ生ズル多年生小草本ナリ。根葉ハ長柄ヲ具ヘ、腎臟形ニシテ心臓底ヲ成シ掌狀ニ五-九淺裂シ、漿質ナリ。莖ハ高サ7-17cm、莖葉ヲ互生シ、莖及ビ葉柄ニハ軟毛ヲ布ク。莖葉ハ短柄或ハ無柄ニシテ五-七淺裂シ、苞葉ハ卵形ニシテ分裂セズ。花ハ通常莖頂ニ一箇生ジ、他ノ苞腋ニハ紅色ノ珠芽ヲ生ズル殊態アリ。花梗ニハ短腺毛ヲ密布シ、初メ點頭シ後直立シテ八月ノ候白花ヲ開ク。萼ハ五裂シ、裂片ハ卵形ナリ。花瓣ハ五箇、倒卵形ヲ呈ス。雄蕊ハ十箇。花柱ハ二箇アリ。和名ハ零餘子虎耳草ノ意ニシテむかごハ葉腋ノ珠芽ニ基ヅク。



ゆきのした科

第1484圖




ゆきのした科

## やまはなさう

*Saxifraga sachalinensis* Fr. Schm. 北地ノ高山或ハ溪側ノ岩上等ニ生ズル多年生草本ナリ。葉ハ簇生シ、卵形ニシテ基部狹窄シテ柄成リ、邊緣ニ不齊ノ歯牙ヲ有シ、兩面共ニ軟毛ヲ布キ、裏面ハ七月ノ候、葉心ヨリ花莖ヲ抽クコト10-40cm、圓錐花序ヲ成シテ多數ノ小白花ヲ開ク。花莖・花梗ニハ短腺毛ヲ密生シ、後部反基部リハ杏色。二雌蕊。花葉ハ五片ニシテ長卵形ニシテ呈黃斑アリハ杏色。二雌蕊。花葉ハ深ク二裂ス。和名ハ山端ト云フ地アリ。本品始メテ此處ニ採リシ故斯ク名ケタリ。

第1485圖



ゆきのした科

## やぐるまさう

*Rodgersia podophylla* A. Gray. 高山ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ高サ1m内外。葉ハ長柄ヲ有シ、概ね掌狀五出、大ナルハ徑50cmニ達ス。小葉ハ倒卵狀楔形ヲ呈シ、先端三乃至五裂シ、不齊ノ鋸齒ヲ有ス。全體ニ微毛ヲ散布シ、托葉ノ膜質ニシテ邊緣鱗片狀ニ細裂ス。ナリテ短柄ヲ有シテ掌狀三出、上部ノ葉ハ短柄ヲ有シテ聚繖圓錐花序ヲ成シテ短縮毛布ス。萼ハ五深裂、裂片ハ長卵形ニシテ呈シ、長サ3mm許。花瓣ハ白色ヲ呈シ、長サ7mm許。雄蕊ハ十本ニシテ萼片ヨリ開出、二花柱。蒴ハ橢圓形ニシテ先端ニ宿存花柱ヲ有ス。和名矢車草ハ葉蓋シ誤用由リテ名ク。漢名鬼燈檠(蓋シ誤用)

495