

第 1504 圖

べんけいさう科



## まるばまんねんぐさ

一名 まめごけ・のびさやし

Sedum Makinoi Maxim.

隨處ノ岩上或ハ石垣上ニ生ズル多年生草本。莖ハ鈍方形ニシテ綠色ヲ呈シ、花ヲ生ゼザル者ハ地ニ臥シ或ハ匍匐シ節ヨリ鬚根ヲ出ス、花ヲ生ズル者ハ下部ハ平臥スルモ上部ハ直立シ高サ10cm内外ニ達ス。葉ハ對生シ、長サ1cm内外アリ多肉ニシテ倒卵形或ハ圓狀倒卵形ヲ成シ下部狹窄シ全邊ニシテ先端短ク稍尖リ表面滑澤ナリ。七月頃莖頂分枝シ枝ハ開出シテ多數ノ黃花ヲ着ケ苞アリ。萼五片ハ綠色筒形ニシテ稍背反シ上部多肉ニシテ其長サ花瓣ノ半ニ達セズ。花瓣ハ五片、披針形ニシテ尖リ、雄蕊十箇アリテ内外兩列ヲ成シ、其内列五箇ハ花瓣ト對生シテ其基部ニ合着ス。子房五箇ハ斜上生ヲ成シテ先端尖リ、成熟スレバ開出ス。心皮基部ノ鱗片ハ倒卵形ニシテ先端凹入ス。和名ハ圓葉萬年草ノ意ナリ、豆苔ハ草狀ニシテ如ク小ク其葉形豆ノ如ク圓小ナレバ云ヒ、野火消シハ草多肉ニシテ野火ヲ消シ止ムノ意ナリ。

第 1505 圖

べんけいさう科



## たいとごめ

Sedum oryzifolium Makino.

海濱岩石ノ間隙或ハ崖壁等ニ生ズル多年生草本。莖ハ細キ圓柱形ニシテ綠色ヲ呈シ地上ニ匍ヒテ多數分枝シ主莖ノ上方ハ側枝ト共ニ直立シテ叢生狀ヲ成シ、花ハ側生セル枝上ニ着キ主莖ノ頂ニハ花ヲ生ゼズ。高サ凡5-7cm許。葉ハ小ニシテ多肉質、圓柱狀倒卵形或ハ倒卵狀橢圓形ニシテ互生シ、花ヲ生ゼザル莖ニ在テハ密ニ相重ナリテ生ズ、往々赤色ニ染ム。夏日莖頂分枝シ黃花ヲ連生シ苞アリ。萼片ハ五箇、短ク圓柱狀ヲ成シ、花瓣亦五箇、廣披針形ニシテ尖ル。雄蕊十箇ニシテ其内列五箇ハ花瓣ニ對生シ其基部ニ附着ス。心皮ハ五箇ニシテ稍直立シ、熟スルニ從ヒ斜上ス。心皮基部ノ小鱗片ハ短クシテ倒卵狀橢圓形ヲ成シ先端圓狀截形ヲ呈ス。和名ハ大唐米ノ意ニシテ土佐幡多郡柏島ノ方言ナリ、大唐米ハだいとうまいニシテ時ニたいまいト呼ブ、下等ナル米ニシテ漢名ヲ秬一名占稻ト云フ、米粒ニ赤白ノ二種アリ。

第 1506 圖

べんけいさう科



## ひめれんげ

一名 こまんねんさう

Sedum subtile Maxim.

谿間ノ石上或ハ濕潤ナル山地ノ石上或ハ山地石壁間ニ生ズル軟キ多年生草本。莖ハ纖細綠色ニシテ多ク分枝シテ横臥シ、花ヲ生ゼザル莖ハ低ク直立或ハ稍平臥シ其末端ニ葉柄アリテ微シク尖リ長サ約1cm許ノ圓形葉ヲ叢生ス、花ヲ生ズル莖ハ直立シ高サ5-10cm許アリテ簇生シ、互生セル線形葉ヲ有ス。初夏莖頂分枝シ枝上ニ苞ト共ニ多數ノ小黃花ヲ着ク。萼片五箇、線狀ニシテ花瓣ヨリ稍短ク綠色。花瓣ハ五片、廣披針形ニシテ先端尖リ、内外兩列ノ十雄蕊ヲ有シ外列ノ五者ハ花瓣ト互生シ内列ノ五者ハ花瓣ノ基部ニ附着ス。子房ハ五箇アリテ略直立シ其基部ノ小鱗片ハ扁平ナル小棍棒狀ナリ。和名ハ姫蓮華ノ意ニシテ其座ヲ成シテ叢生セル葉ノ狀ヲ蓮花ニ擬シタルモノ、小萬年草ハまんねんぐさニ似テ小形ナルヲ云フ。

## みせばや

一名 たまのを

Sedum Sieboldi Sweet.

我邦北地ニ生ズル多年生草本ニシテ多ク人家ノ庭或ハ盆栽トシテ培養セラル。莖ハ一株ニ多數相集リテ出デ更ニ撓シテ垂下シ節アリテ長サ30cmニ達シ、強韌ニシテ少シク紅色ヲ帶ブルコトアリ。葉ハ三片宛輪生シテ層ヲ成シ、多肉圓形ニシテ基部廣楔形ヲ呈シ、長サ2.5cmニ達シ、前縁ニ鈍齒ヲ有シ、粉白色ヲ呈ス。十月頃莖端ニ多數ノ淡紅花ヲ球狀ニ簇生シテ開ク。萼片ハ五箇ニシテ花瓣ノ半ニ達シ鏡狀披針形ヲ呈ス。花瓣五片ハ廣披針形ニシテ先端尖リ、雄蕊ハ十箇アリテ其外列者五本ハ花瓣ト互生シテ花瓣ヨリ微ニ長ク、内列者五本ハ花瓣ト對生シテ其下部ニ附着シ微ニ花瓣ヨリ短シ。子房五箇、卵形ニシテ下ハ短柄狀ヲ呈シ上部ハ花柱ト成リテ尖リ、子房下ノ小鱗片ハ倒卵狀方形ヲ成シ上縁截形ナリ。和名見せばやハ誰レニ見セバヤトノ意ニシテ其花ノ優美ナルヲ表ハシ、玉の緒ハ其花穗ヲ玉ニ擬シ莖ヲ其緒ニ準ラヘシナリ。

## まうせんごけ

Drosera rotundifolia L.

山地原野ノ向陽濕地ニ生ズル食蟲植物ノ多年生草本ニシテ莖ハ極メテ短縮シアリト雖ドモ水ゴケ中ニ生ズル者ハ時ニハ可ナリノ長サヲ有スルコトアリ。葉ハ根生シ長柄ヲ有シテ杓子狀ヲ呈シ淡紅ヲ帶ビ、葉面上ニハ紅紫色ノ腺毛多數ニ直生シ其長キ者ハ往々5mmニ達スルモノアリ、微小ナル蟲類來テ之ニ觸ルレバ忽チ粘着シテ動作ノ自由ヲ失ヒ、蟲體ニ向テ傾着セル腺毛ノ分泌液ノ爲メ消化セラル。夏日葉間ヨリ瘦長ナル無葉ノ花莖即チ葶ヲ抽キテ直立シ、15-20cm許アリテ莖上ニ穗狀様ノ總狀花序ヲ成シテ數花乃至十數花ヲ偏側ニ着ケ、花穗ハ初メ一方ニ卷曲シ開花スルニ從ヒ漸次ニ直立ス。花ハ短梗ヲ具ヘ、小形、白色。萼ハ深く五裂シ裂片ハ長橢圓形。花瓣ハ五片ニシテ稍倒卵形。雄蕊五箇。花柱ハ三箇、各深く二岐ス。蒴果ハ熟スレバ三裂シ細種子ヲ散ズ。var. longipetiolata Lev. ハ唯水ゴケ等ノ中ニ生ジテ其環境ニ從ヒ葉柄ノ殊ニ長形ヲ呈スルニ至リシ者ノミ、故ニ之レヲ斯克變種トスルハ非ナリ。和名毛氈苔ハ其毛多キ葉ト其蘇苔様ヲ呈セル草姿ニ基ク。

## こまうせんごけ

Drosera spathulata Labill.

(=D. Loureiri Hook. et Arn.)

山麓或ハ原野ノ濕潤セル向陽地ニ生ズル食蟲植物ノ多年生草本。全體小形ニシテ能ク群ヲ成シテ生ジ紫赤色ヲ呈セリ。葉ハ根生シテ地面ニ平布シ數葉車輪狀ヲ呈シ、線形ニシテ葉頭ハ圓形、下部漸次狹窄シテ葉柄部明確ナラズ。葉上紫紅色ノ腺毛密布シ、微小蟲ヲ粘着捕獲ス。夏日葉中ヨリ纖長ナル花莖即チ葶ヲ抽テ直立スルコト10-15cm許、淡紅色ノ短梗小花ヲ穗狀様ヲ呈セル偏側生總狀花序ニ綴ル。花穗ハ初メ一方ニ卷曲シ開花ニ從テ直立ス。萼ハ鐘形ニシテ深く五裂シ裂片ハ長橢圓形。花瓣ハ五箇ニシテ倒卵形。五雄蕊。花柱ハ三箇アリテ各深く二裂ス。蒴果ハ三裂シ細種子ヲ散ズ。和名ハ小毛氈苔ノ意ニシテ全草小形ナルヨリ小ト云フ。


第 1507 圖

べんけいさう科



第 1508 圖

いしもちさう科



第 1509 圖

いしもちさう科

