

第 1570 圖

ふうてうさう科



せいやうふうてふさう

一名 くれおめさう・はりふうてふさう

Cleome spinosa L.

(=C. pungens Willd.)

熱帯亞米利加ノ原産ニシテ明治初年ニ渡來シ花
草トシテ往々栽植セラルル一年生草本ニシテ全
株粘毛ニテ覆ハレ且小刺ヲ散生ス。莖ハ直立シ
テ分枝シ高サ 1m 内外アリ。葉ハ互生シ掌狀複
葉ヲ成シ、小葉ハ五或ハ七片アリテ長橢圓狀披
針形ヲ呈シ全縁ニシテ長サ 9cmニ達ス。下部ノ
葉ハ長葉柄ヲ有シ柄本ニ托葉刺ヲ具フ。夏秋ノ
候梢頭ニ總狀花序ヲ成シ、長花梗ヲ有スル紅紫
色或ハ白色ノ四瓣花ヲ開ク。苞ハ單形ニシテ狭
卵形ナリ。萼片四箇、線狀披針形ニシテ反轉シ、
長サ約 6mm。花瓣ハ倒卵形ニシテ底部狹長ナル
花爪ヲ成シ、長サ 2cm 内外。雄蕊四箇、藍色或
ハ紫紅色ニシテ花瓣ヨリ超出シ、長サ其二三倍
ニ達ス。雌蕊ハ一箇ニシテ花後線形ノ長蒴果ヲ
結ビ長サ 11cm 許アリ其下半部ハ狹長ニシテ柄
狀ヲ呈ス。種子ハ腎臟形ナリ。和名ハ西洋風蝶
草ノ意ナリ。

第 1571 圖

ふうてうさう科



ふうてふさう (白花菜)

一名 やうかくさう

Gynandropsis gynandra Merr.

(=Cleome gynandra L.; C. pentaphylla L.;

Gynandropsis pentaphylla DC.; Pedicellaria

pentaphylla Schrank.; G. viscida Bunge.)

元來西印度原産ノ一年生草本ナレドモ往々熱國
ノ海邊ニ生ジ臺灣ニモ之レヲ見ル、我邦内地
ニテハ稀ニ栽植セラルルニ過ギズ。莖ハ直立シ高
サ 30-90cm、紫色ヲ帯ビ粘毛ヲ布ク。葉ハ互生
シ掌狀複葉ニシテ長柄ヲ有シ、小葉ハ五片ニシ
テ倒卵形、全縁、時ニ微鋸齒アリ。夏梢頭ニ
粘着性ノ總狀花序ヲ成シテ白花ヲ開ク。花下ニ
三出葉狀ノ苞アリ。萼ハ四片、線狀披針形。花
瓣ハ四片、長サ 1.5cm 許、倒卵形、脚部長花爪
ヲ有ス。雄蕊柄ハ長サ 1.5cm 許、其上ニ六雄蕊ヲ開
出シ黃葯ヲ有ス。子房柄ハ雄蕊柄ト同長ナリ。
花後長角ヲ結ビ長サ 10cm 内外ニ伸ビ、殆ド平滑
ナリ。種子ハ黑色ニシテ圓狀腎臟形ナリ。和名
ハ風蝶草ノ意ニシテ其花姿ニ基キテ名ケラレ、
やうかくさうハ漢名ノ羊角菜(白花菜ノ異名)ニ
由來セシ名ナリ。

第 1572 圖

ふうてうさう科



ぎょぼく

一名 あまき

Crataeva religiosa Forst.

廣ク熱帯地ニ分布シ我邦領域ニテハ琉球臺灣ニ
見ル常緑ノ大喬木ニシテ往々栽植セラルルコト
アリ。全體無毛平滑ニシテ葉ハ互生シテ長柄ヲ
有シ三出複葉ヲ成ス。小葉ハ全邊、狹倒卵形ヲ
成シ先端尖リ左右ノ小葉ハ基部不同ニシテ長サ
5-13cm 内外ニ達シ、裏面ハ多少帯白色ナリ。六
七月ノ候枝端ニ繖房花序ヲ成シテ稍密ニ黃白色
ノ花ヲ着ク。萼ハ四片、長橢圓形ニシテ基脚花
盤ニ着生シ長サ 3mm 許。花瓣四片ハ長サ 2cm ニ
達シ、卵形、基部狹花爪ヲ成ス。雄蕊ハ多數、
長ク超出シ、子房柄基部ニ着生ス。花後漿果ハ
卵形稍垂下シ長サ 3cm 許。種子多數ヲ藏シ、圓
狀腎臟形、徑 8mm 許アリ。材輕軟ナルヲ以テ擬
魚ヲ作り釣魚ノ時ノ餌トス故ニ魚木ノ名アリ、
あまきハ琉球ノ土言ナリ。

むらさきけまん

一名 やぶけまん

Corydalis incisa Pers.

山足ノ地或ハ路傍或ハ畑地ノ側ニ生ズル柔軟
ナル越年生草本ニシテ秋ニ生ジ乳液ナク水液ア
リ。地下莖ハ小形多肉ニシテ長橢圓形ヲ呈シ通
常地面ニ横臥ス。葉ハ直立シ、高サ 17-50cm ニ
達シテ稜アリ。莖ハ長柄ヲ有シテ根生シ并ニ莖
ニ生シ、二三回羽狀ニ細裂シ、裂片ハ卵狀楔
形ニシテ深キ缺刻ヲ有シ、柔弱ナリ。春末初夏
ノ候梢頭稍分枝シテ多數ノ紅紫花ヲ直立セル總
狀花序ニ着ク。苞ハ楔狀長橢圓形ニシテ缺刻ヲ
有ス。花冠ハ筒狀唇形ニシテ一方開口シ一方距
ヲ成ス。雄蕊ハ三箇宛ニ體ヲ成ス。蒴ハ長橢圓
形ニシテ兩端狹窄シ、熟スレバ果皮急開シ黑色
光滑ナル種子ヲ彈散ス。和名紫華鬘ハ此草けま
んさうノ類ニテ花紫色ナルヲ以テ云フ。藪華鬘
ハやぶけまんさうノ意ニシテ本品能ク藪際ニ生
ズルヨリ名ケシナリ。漢名 紫葶(誤用)

第 1573 圖

けし科



じろぼうえんごさく

Corydalis decumbens Pers.

原野或ハ山足地ニ生ズル多年生草本。地下莖ハ
不定形ノ塊狀ヲ成シ徑 1cm 位ニ達シ、數莖數葉
之ヨリ出ヅ。莖ノ高サ 17cm 許、纖弱ニシテ稍斜
上生ナリ。葉ハ少數、根生葉ハ長柄、莖葉ハ短
柄ヲ有シ、二回分裂スルヲ常トス。裂片ハ倒卵
狀楔形ニシテ全縁或ハ二三裂シ先端微凸頭ア
リ。苞ハ菱狀卵形、尖頭ニシテ分裂セズ。春日疎
ナル總狀花序ヲ成シ少數ノ紅紫花ヲ着ク。花冠
ハ一方唇狀ニ開口シ、一方ニ距アリ。雄蕊六箇、
兩體ヲ成ス。和名ハ次郎坊延胡索ノ意ニシテ延
胡索ハ此類ノ漢名ナリ、之レヲ次郎坊ト名ケシ
所以ハ伊勢ニテすみれヲ太郎坊ト呼ビ此種ヲ次
郎坊ト稱シ小兒其花ヲ五ニ勾引シテ以テ勝負ヲ
決スルコトアリ、乃チ其名ニ基キテ之レヲ次郎
坊延胡索ト爲セシナリ、世人往々之レヲびち
り又ハやぶえんごさくト云フハ非ナリ。

第 1574 圖

けし科



やぶえんごさく

一名 びちり・やまえんごさく

Corydalis remota Fisch.

var. genuina Maxim.

山野ニ生ズル柔軟ナル多年生草本。地下ニ直徑
1cm 許アル球狀ノ一塊莖ヲ有シ、其塊莖ヨリ纖
細ナル一莖ヲ生ジテ地上ニ出ヅ高サ凡 17cm 内
外ニ達シ、地下ニテハ塊莖ヨリ凡 5cm 許離レテ
卵狀披針形長サ 1.8cm 許ノ一鱗片アリ。葉ハ有
柄ニシテ二回分裂シ、最終裂片ハ卵形或ハ橢圓
狀卵形ヲ呈シ、下面粉白色ヲ呈ス。晩春、總狀花
序ヲ成シテ五-十箇ノ淡紅紫色花ヲ着ク。苞ハ菱
狀卵形ニシテ先端三-五裂シテ指狀ヲ成ス。花冠
ハ一方唇狀ニ開口シ、一方眞直ニ或ハ多少彎曲
シテ稍長キ距ヲ有ス。一變種ニささばえんごさ
く(var. lineariloba Maxim.)アリ、葉ノ裂片狹
長ニシテ線狀長橢圓形ヲ成ス。和名ハ藪延胡索、
山延胡索ノ意ニシテ延胡索ハ此類ノ漢名ナリ、
びちりハ花ヲ押潰ス時ノ音ニ基キシ名ナリ。

第 1575 圖

けし科

