

第1588圖



第1589圖



第1590圖



ほそばやまぶきさう

Hylomecon japonicum Prantl.
var. *lanceolatum* Makino.

(= *Stylophorum lanceolatum* Yatabe.)
やまとぶきさうノ一變種ニシテ山野樹下ノ地ニ生ズル多年生草本。高サ30cm内外アリテ莖ハ直立シ葉ト共ニ軟ナリ。根葉ハ長柄アリ、五乃至七小葉ヲ有シ、各圓形或ハ長橢圓形ナリ。莖葉ハ三乃至五小葉ヲ有シ、小葉ハ無柄、長橢圓狀披針形或ハ線狀披針形ヲ成シ、葉緣ニ規則正シキ細鋸齒ヲ有ス。小葉ノ長サ上方ニテ6-10cm許アリ。四五月頃、花梗ヲ上葉ノ腋ニ生ジ、一乃至四個ノ黄色四瓣花ヲ生ズ。萼片ハ二片、綠色ニシテ早落ス。花瓣ハ四片ニシテ略ボ圓形、長サ2cm以上。花後狹圓柱形ニシテ長サ8cmニ達スル蒴ヲ直立ス。

せりばやまぶきさう

Hylomecon japonicum Prantl.
var. *dissectum* Makino.

(= *Stylophorum japonicum* Miq.
var. *dissectum* Franch. et Sav.)
やまとぶきさうノ一變種ニシテ山野樹下ノ地ニ生ズル多年生草本。莖ノ高サ10-30cm許。根葉ハ長柄アリ、頭大羽狀複葉ニシテ小葉ハ五片乃至七片ヲ有ス、各小葉ハ外形菱狀卵形ニテ深ク細裂シテ深缺刻状ヲ成シ、各裂片ハ先端尖ル。莖葉ハ三乃至五小葉ヲ有シ同様深ク細裂ス。四五月頃花梗ヲ生ジ黄色四瓣花ヲ生ズ。萼片ハ二片、綠色ニシテ早落ス。花瓣ハ略ボ圓形、長サ2cm以上。多雄蕊、一雌蕊ヲ具ヘ、花後狹圓柱形ノ蒴果ヲ直立ス。和名ハ芹葉山吹草ニシテ其分裂セル葉狀ニ基ク。

くさのわう(白屈菜)

Chelidonium majus L.

路傍・林際・石壁間等ニ生ズル越年生草本。主根ハ地中ニ直下スル瘦長ナル圓錐狀ニシテ分枝シ柑黃色ヲ呈ス。莖ハ直立シ軟質ニシテ柑黃色液ヲ含ミ、高サ50cm内外ニ達ス。葉ハ互生シ一回或ハ二回羽狀ニ分裂シ裂片ノ先端鈍形、上面綠色、下面面粉白色ニシテ微毛ヲ生ズ。初夏ノ候、枝端ニ繖形狀ヲ成シテ數箇黃色ノ四瓣花ヲ開キ、毎花長小梗ヲ具フ。萼片二片ハ橢圓形、長サ9mm許、外面柔疎毛アリ。花瓣ハ長卵形、長サ12mm許、内ニ多雄蕊一雌蕊ヲ具フ。蒴果ハ狹圓柱形、果柄ト同長ニシテ長サ3.5cmニ達ス。元來有毒植物ノ一ナレドモ又薬用トスペシ。和名ハ草の黃ノ意ニシテ其草黃汁ヲ出ス故ニ云フト謂ヘリ、又丹毒瘡ヲ治スル以テ瘡(くさ)の王ナラントモ謂ヒ、又草の王ナラン乎トモ謂ヒ敢テ確タ定説ナシ。

はなびしさう

一名 きんえいくわ
Eschscholzia californica Cham.

明治初年渡來ノ觀賞植物ニシテ北米ノ原產ナリ。元來ハ多年生草本ナレドモ通常一年草ノ觀ヲ成セリ。莖高サ30-50cm許、全體白色ヲ帶ビ、互生セル有柄葉ハ絲狀ニ細裂シテ柔質ナリ。夏日、叢生葉中ヨリ花梗ヲ抽キ梗頂ニ一黃花ヲ開ク。花托ハ漏斗狀ヲ成シ徑4mm許アリ。萼ハ二片ニシテ廣椭圓形、帽狀ヲ成シテ長サ2cm許、開花ノ際脱落ス。花瓣ハ四箇、扇形ニシテ光澤アリ、日光ヲ受ケテ開花ス。花中多雄蕊一雌蕊ヲ有ス。雄蕊ハ花絲短ク、藥長シ。花柱ハ不同ニ四裂ス。花後長形ノ蒴果ヲ結ビ、其長サ8cm許、全長ニ瓦リ二裂シテ黑色粒狀ノ種子ヲ散布ス。和名ハ菱草ハ花形花菱紋ニ似タルヨリ云ヒ、金英花ハ亦其黃花ニ基キシ名ナリ。

第1591圖



をさばぐさ

Pteridophyllum racemosum
Sieb. et Zucc.

深山樹下ノ陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ短厚ナル地下莖ヲ具ヘ鬚根ヲ出セリ。葉ハ多數根生シテ叢生シ長サ6-15cmニ達シ、鈍頭倒披針形ニシテ葉上粗毛散生シ多數規正ニ羽狀深裂シ、各裂片ハ線狀長橢圓形鈍頭ニシテ上部不顯著ナル小鋸齒アリ、底部不同形ニシテ前下方ノ基部ニ小耳片アリテ二-三齒ヲ成シ每齒端鬚狀ヲ呈ス、下部小葉ハ漸次微小成リ遂ニ消失ス。葉柄基部ニハ鱗片狀體アリ。夏日20cm内外ノ花莖ヲ抽出シ、總狀花序ヲ成シテ疎ニ且稍點頭セル白色四瓣ノ有梗花ヲ開ク。苞ハ小形。小花被ハ纖弱。萼二片、橢圓形、長サ2mm許。花瓣ハ長橢圓形、長サ6mm。雄蕊四個アリテ花瓣ト互生ス。子房ハ扁圓形、花柱ハ絲狀ニシテ柱頭ヘ二耳裂ス。花後球狀ノ蒴ヲ結ビ熟スレバ二裂シ、稍長形ノ種子二個或ハ四個ヲ出ス。和名幾葉草ハ其橢圓狀ヲ呈セル葉狀ニ基キテ呼ビシナリ。

第1592圖



第1593圖



げっけいじゅ

一名 ろーれる

Laurus nobilis L.

明治三十八年頃ニ渡來シ今ハ諸處ニ栽培セラル。南歐原產ノ常綠樹ニシテ高サ12m許ニ及ビ多枝繁葉、小枝ハ綠色ナリ。葉ハ互生シ、長橢圓形ニシテ長サ8cm内外、全邊、波狀ヲ成シ、平滑、革質、深綠色ニシテ葉ヲ損傷セバ一ノ清香ヲ放ツ。雌雄異株ニシテ春日葉腋ニ黃色ノ小花ヲ擴簇ス。嫩蕾ハ球形ヲ成セル總苞ノ中ニ閉在ス。花被ハ四深裂シ裂片ハ倒卵形ヲ成シ、雄蕊ハ八-十四箇普通十二箇、花柱ハ短ク柱頭ハ稍頭狀ヲ成ス。果實ハ橢圓狀球形ニシテ十月頃暗紫色ニ熟ス。葉ハ香料トシテ頭髮用「ベーラム」ノ原料ヲ供給シ又料理ニ用フ。歐洲ニ在テハ古來此枝葉ノ環ヲ戰勝或ハ「オリンピック」競技ノ名譽表象トス。此樹ニ冠セシ月桂樹ナル美稱ハ元來支那ノ月桂樹ニ基クト雖モ其實物ハ固ヨリ異ナリ、而シテ此ろーれる(Laurel, 正シク云ヘバ Noble Laurel 或ハ Victor's Laurel)ヲ始メテ月桂樹下譯セシハ英華字典ナラン、ベー(Bay, 正シク云ヘバ Sweet Bay)ハ本品ノ俗名ナリ。