

第 1594 圖



くすのき科

しろもじ

一名 あかぢしゃ

Parabenzoin trilobum Nakai.

(=Lindera triloba Blume.)

我邦中部以南諸州ノ山中ニ見ル落葉灌木。幹ノ高サ4m内外。葉ハ有柄互生シ淡緑色ニシテ質薄ク、廣倒卵形ニシテ三裂シ、長サ10cm内外、裂片ハ長橢圓形ニシテ全邊、漸尖頭、葉裏時ニ短毛アリ。春日葉ニ先チテ鱗狀苞片ノ中ヨリ繖形花序ヲ成シテ黄色小花ヲ開ク。花梗ニハ毛茸アリ。雌雄異株。花被ハ六深裂、裂片ノ長サ2.5mm許アリ。九雄蓋ヲ藏シ外輪六箇花蓋片ニ對立シ内輪三箇アリ。雌花ニテハ外輪者ハ角狀ニ内輪者ハ腺體ニ變化シ、中央ニ雌蕊一箇アリ。果實ハ秋末黄色ニ成熟シテ肥厚セル果柄ニヨリ下向ス、大形球狀ニシテ徑1.3cm許アリ、自ら不規則ニ開裂シテ大形種子ヲ露出ス。和名白もじハ黒もじニ對シテ云フ、又赤ぢしゃモ白ぢしゃ(だんかうばい)ニ對シテ云フ。

第 1595 圖



くすのき科

あぶらちゃん

一名 ひらだち・づさ

Parabenzoin praecox Nakai.

(=Lindera praecox Blume.)

多枝繁葉ノ落葉灌木ニシテ山地ニ生ズ。高サ4m内外ニ達シ、樹皮灰褐色ヲ呈ス。葉ハ互生シ卵形或ハ橢圓形ニシテ先端漸尖シ全縁ニシテ底部楔形ヲ呈シ、狭細ナル葉柄ヲ有シ、全長4-7cm内外アリテ平滑ナリ。早春葉ニ先チテ淡黄色ノ小花ヲ有柄ノ小繖形花序ニ生ジ初メ蕾時ハ總苞鱗片ニ包マル、花序ハ小枝本ニ二箇ツツ出デ前年既ニ早ク枝上ニ現出ス。花梗ニハ疎ニ毛アリ。雌雄異株。萼ハ深ク六裂シ長サ2mm許。雄蓋ハ九箇、内輪生三箇外輪生六箇アリ。雌花ニテハ外輪生ハ小角體ト成リ内輪生ハ腺體ト成ル、一雌蕊アリ。果實ハ秋末帶黄色ニ熟シ、球形ニシテ直徑14mm許ノ大形果ヲ成シ、後チ果皮不規則ニ開裂シテ大形種子ヲ露出ス。此實ヨリ油ヲ搾ルベク、又油多キヲ以テ燃エ易シ。和名ハ此果實并ニ樹皮ニ油多ク能ク燃焼スルヲ以テ油并ニちゃん(瀝青)ヲ合セテ名ト爲セシナラン、ひらだちハ群立ニテ其樹枝ノ多數ナル形容名、づさは又ぢしゃトモ云フ其意分明ナラズ。

第 1596 圖



くすのき科

くろもじ

Benzoin umbellatum Rehd.

(=Lindera umbellata Thunb.)

山地ニ多ク生ズル落葉灌木。高サ2-3m許ニシテ枝多ク、幹ハ直立シ又時ニ斜上ス、樹皮ハ平滑ニシテ元來綠色ナレドモ通常黒斑之レヲ覆フヲ見ル。葉ハ枝上ニ互生シテ葉柄ヲ具ヘ狭倒卵形ニシテ兩端尖リ、長サ5-9cm許、全邊ニシテ質薄ク下面ハ帶白色ニシテ時ニ平臥セル軟毛ヲ疎布ス。春日、葉ニ先チ或ハ新葉ト共ニ淡黄色或ハ淡黄綠色ノ小花ヲ開キ葉腋ニ三々五々繖形花序ヲ成シテ群リ生ジ花梗ハ軟毛ヲ被ル。雌雄異株ニシテ雄花ハ雌花ニ比スレバ微シク大ニシテ數多シ。花被ハ六深裂シテ各片橢圓形、長サ2-3mm許。雄蓋ハ九箇。花後雌花ニ在テハ小球實ヲ結ビ十月頃黒熟シテ漿果ヲ成ス。樹皮ニ佳香アルヲ以テ小楊枝ヲ作ルニ賞用シ、又樹皮ノ油ヲ香水ノ原料トス。和名ハ蓋シ黒文字ノ意ニシテ按ズルニ其樹皮上ニ擴布セル廣狹ノ黒斑ヲ文字ニ擬セシニ由ルナラン乎ト思ハル。『大言海』ニ「皮ツキニ削ル故ノ名ナリ」トアルハ果シテ眞乎。漢名 鉤樟(誤用)

うこんばな

一名 だんかうばい・しろぢしゃ
Benzoin obtusilobum O. Kuntze.

(=Lindera obtusiloba Blume.)

諸州ノ山地ニ生ズル落葉小樹ニシテ高サ3m内外アリ。枝ハ粗ナリ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、廣橢圓形或ハ圓狀卵形ニシテ質稍厚ク長サ10cm内外、通常淺ク三裂シ各裂片ハ先端通常鈍頭ヲ呈シ全邊ナリ、枝本ノ者ハ往々不裂ノ卵形ヲ呈スルコトアリ、裏面ニ淡褐色ノ長毛茸ヲ有シ樹ニ由テ濃淡アリ。早春二三月ノ候葉ニ先チ或ハ色殆ンド同時ニ軟毛アル鱗狀總苞片ノ中ヨリ黄色絹ノ小花ヲ繖形花序ヲ成シテ密開シ、小梗ハ絹毛アリ。雌雄異株。花被ハ六深裂シ、各裂片ハ長サ2.5mm許、九雄蓋一雌蕊ヲ有ス。花後ニ果柄ハ長サ2cmニ及ビテ稍肥厚シ、漿果ハ小球狀ヲ呈シ直徑8mm許ニシテ赤熟ス。和名ハ鬱金花ニシテ其黄花ニ基キシ稱ナリ、檀香梅ハ元來蠟梅ノ一品ニ對スル漢名ナルヲ本種ニ轉用セシモノナラン、白ぢしゃハ赤ぢしゃ(しろもじ)ニ對セル名ナリ。

第 1597 圖



くすのき科

かなくぎのみ

Benzoin erythrocarpum Rehd.

(=Lindera erythrocarpa Makino;

L. Thunbergii Makino.)

中ノ南日本諸州ノ山地ニ生ズル落葉小喬木。高サ凡5m内外アリ、樹幹直立シテ分枝シ、樹皮ハ黄白色ヲ帶ビ老木ニテハ小片ト成リテ剝落ス。葉ハ互生シ、帶赤色ノ短柄ヲ有シ、倒披針形全縁ニシテ鈍頭、裏面稍白色ヲ帶ビ、嫩キ時葉裏并ニ葉脈ニ沿テ毛多シ。晩春、舊枝梢上ノ新枝葉腋ニ繖形花序ヲ成シテ有梗ノ淡黄色小花十數箇ヲ開ク。繖形花序ハ6-8mm許ノ總梗ヲ有シ、初メ鱗形葉ニ包マレテ球形ヲ呈ス。雌雄異株ナリ。萼ハ六裂シ、各裂片ハ橢圓形ニシテ長サ2mm餘、雄蓋九箇、外輪生六、内輪生三、内輪生三雄蓋ハ下部ニ各二箇宛ノ小腺體ヲ有ス。雌花ニ於テハ球卵形花柱ハ先端稍擴ガル。小花梗ハ12mm、稍柔毛ヲ帶ブ。漿果ハ球狀、直徑6mm許、十月頃赤色ニ熟ス。和名ハ鐵釘ノ樹ノ意ナランモ何ノ爲メニ斯ク名ケシ乎不明ナリ、而シテ材質ハ堅緻ナラズ。

第 1598 圖



くすのき科

第 1599 圖

やまかうばし

Benzoin glaucum Sieb.

(=Lindera glauca Blume.)

諸州ノ山地ニ生ズル落葉灌木。高サ5mニ達シ、幹直立シテ分枝シ樹皮茶灰色ヲ呈シ、枝極剛脆質ナリ。葉ハ有柄互生シ、長橢圓形或ハ長橢圓狀倒卵形ニシテ兩端尖リ、裏面綠白色ニシテ軟毛ヲ帶ブ。春期新芽ト共ニ其腋ニ有柄繖形花序ヲ成シテ淡黄綠色ノ數小花ヲ簇開ス。雌雄異株ナリ。花被ハ六裂、花被片ハ橢圓形長サ1.5mm許。雄蓋九箇、外輪六箇内輪三箇アリ、内輪雄蓋ハ各腺體二箇宛ヲ有ス。花梗ハ5mm許、軟毛ヲ帶ブ。十月頃果實成熟シテ黑色ヲ呈シ其直徑7mm許、多少辛味アリ。冬期モ尙依然トシテ枯葉ヲ枝上ニ着ケ明春ニ至テ漸ク落ツル殊態アリ。和名ハ山香レノ意ナラン、即チ其枝ヲ折レバ多少香氣アリ故ニ此ク稱スルナラント思フ。漢名 山胡椒(誤用)



くすのき科