

第 1600 圖

くすのき科



てんだいうやく (烏薬)  
*Benzoin strychnifolium* O. Kuntze.  
 (= *Lindera strychnifolia* Sieb. et Zucc.)  
 往時享保年間ニ支那原産ノ者ヲ移植培養セル常  
 緑灌木ナレドモ今ハ九州並ニ紀州和州駿州ニ野  
 生アリ。高サ約3mニ達ス。葉ハ薄キ革質廣楕圓  
 形。細キ漸尖頭ヲ有シ、三主脈顯著ニシテ表面綠  
 色、背面白色ナリ。嫩葉ハ密ニ長柔毛ヲ被ルモ  
 後チ全ク平滑ト成ル。根ハ特ニ長形塊ヲ成シテ  
 其形クササギカヅラノ根ニ似タリ、而シテ暗褐  
 色ヲ呈シ木質ナリ。花芽ハ初メ葉腋上ニ鱗狀苞  
 ヲ被リ、三四月頃其中ヨリ淡黄色小花ヲ簇開ス。  
 花被ハ六深裂シ、各片ハ廣楕圓形長サ2mm。花  
 梗ハ長サ5mm、密ニ短毛ヲ被ル。雄花ハ九雄  
 蕊、雌花ハ一雌蕊ヲ有シ、雌雄異株ナリ。果實  
 ハ初メ綠色、後チ赤褐色ヲ帯ビ次第ニ黒熟シ楕圓  
 形ヲ呈シ長サ1cm許アリ。根ヲ藥用ニ供ス。和  
 名ハ烏薬ノ名品天台烏薬ノ音ナリ、而シテ元來  
 ハ天台烏薬ナル漢名ハ無ク是レハ支那ノ天台山  
 ヨリ出ル烏薬ヲ我邦ノ本草學者ガ天台烏薬ト呼  
 ビシニ過ギザルナリ。

第 1601 圖

くすのき科



こがのき  
 一名 かごのき・かごがし・かのかご  
*Actinodaphne lancifolia* Meissn.  
 暖地ニ生ズル常緑ノ大喬木。高サ15m内外。幹  
 ハ樹皮平滑ニシテ淡紫黑色ヲ呈スレドモ圓形ノ  
 薄片ト成リテ點々脱落シ、其痕跡白クシテ鹿ノ  
 子模様ト成ル。故ニ鹿子の木ノ一名アリ。葉ハ有  
 柄互生、倒披針狀長楕圓形ニシテ長サ5-10cm、  
 革質、鋭尖頭ニシテ鈍端、表面ハ暗綠色ヲ呈シテ  
 滑澤ナレド裏面ハ稍灰白色ヲ呈シ微細ノ毛ヲ密  
 布ス。夏日葉腋ニ密集セル繖形花序ヲ出ダス。  
 花序ハ外部ニ鱗片有リテ之レヲ蔽フ。雌雄異株  
 ナリ。總苞片ハ黄色ニシテ花瓣ノ如シ。花被ハ  
 六裂、不顯著。雄花ニハ雄蕊九箇、最内ノ三箇ニ  
 ノミ腺體アリ、約ハ四室皆内向開ス。漿果ハ  
 球形、徑1cmニ充タズ。冬ヲ超エテ翌夏紅熟ス。  
 果梗ハ太ク且ツ短シ。和名かごのきノ意不明、  
 かごのきハ上ニ説キ申シ、かごがしハ鹿子楯、  
 かのかごハ鹿のかご乎。漢名 六駁(誤用)

第 1602 圖

くすのき科



ばりばりのき  
 一名 あをがし・あをかごのき  
*Actinodaphne acuminata* Meissn.  
 暖地ノ山地ニ生ズル常緑喬木、高サ5-  
 13m。枝梗ハ太クシテ疎且ツ平滑ナリ。  
 葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ長大ナル披針形  
 ニシテ長サ20cm内外、薄キ革質ヲ呈シ長  
 尾漸尖頭鋭尖底ヲ成シ無毛ニシテ表面濃  
 綠色ヲ呈シ平坦ニシテ滑澤、裏面ハ多少  
 粉白ヲ呈ス。老葉ハ多ク下垂ス。秋ニ入  
 リテ花ハ葉腋ノ短軸上ニ密集シテ小球狀  
 ヲ成シ外部ハ鱗片ニテ包マル。雌雄異株。  
 花色ハ淡黃綠。雄花ニテハ雄蕊九箇、雌花  
 ニテハ線狀ノ假雄蕊九箇トナレドモ共ニ  
 内輪ノ三箇ニハ下部兩側ニ腺體ヲ有ス。  
 漿果ハ楕圓形、長サ1.5cm、平滑無毛冬ヲ  
 超エテ後黒熟ス。和名ばりばりのきハ硬  
 質ノ葉ノ相觸ルル音ニ基キ申シ稱ナラン。

しろだも

一名 しろたぶ・たまがら  
*Litsea glauca* Sieb.

(= *Neolitsea Sieboldii* Nakai.)

暖地性ノ常緑喬木ニシテ山地或ハ平地ニ生ジ幹  
 ノ高サ10mニ達ス。小枝ハ綠色圓柱形ニシテ無  
 毛。葉ハ有柄互生シテ革質、楕圓形全縁ニシテ  
 兩端尖リ、表面綠色裏面ハ白色ヲ呈シ三條ノ主  
 脈アリ、長サ葉柄ト共ニ15cm内外アリ。嫩葉ハ  
 下垂シ黃褐色ヲ帶ヒタル毛ヲ密布スルモ後チ平  
 滑ト成ル。秋末枝梢葉腋ニ黃褐色ノ小花ヲ簇開  
 ス。雌雄異株ナリ。萼ハ淺キ鐘形ヲ成シテ深ク  
 四裂シ、各裂片ハ廣卵形ヲ成シ長サ2.5mm許。  
 雄蕊ハ八箇、四裂約胞ヲ成ス。雌花ニテハ花柱  
 ハ棍棒狀、柱頭ハ扁平ナリ。果實ハ翌年ノ秋ニ  
 赤熟シ楕圓形ヲ呈シテ果皮平滑ナリ、稀ニ黃實  
 ノ者アリ(きみのしろだも)。長サ約15mm許。  
 果柄ハ稍肥厚シ長サ約12mmアリ。和名白だ  
 もハ葉裏白色ナルヲ以テ謂フナラン、だもハた  
 ぶト同ジク此等ノ類ノ總稱ナルベシト雖モ其意  
 ハ不明ナリ。

第 1603 圖

くすのき科



いぬがし


*Litsea aciculata* Blume.

(= *Neolitsea aciculata* Koidz.)

我邦中部以西諸州ノ山地ニ生ズル常緑小  
 喬木。幹ハ高サ4m許ニ達ス。葉ハ有柄  
 互生シ、長楕圓形全邊ニシテ兩端尖リ、薄  
 キ革質ニシテ表面綠色光澤アリ裏面帶白  
 色ヲ呈シ三條ノ主脈明カナリ。葉ノ長サ  
 短柄ト共ニ10cm内外。嫩葉ハ平滑ニシ  
 テ毛無シ。三月頃葉腋及ビ小枝ノ下部ニ  
 赤色ノ小花ヲ攢簇ス。雌雄異株ナリ。花被  
 ハ四深裂シ、裂片ハ廣楕圓形、長サ3mm  
 許。雄蕊ハ十八箇、六箇宛三輪ニ配列ス。  
 雌花ハ長花柱ヲ具ヘ細毛ヲ有ス。十月頃  
 ニ黒紫色楕圓形ノ漿果ヲ結ブ。和名犬楯  
 ハかしニ似テ其眞物ニ非ザルヲ以テ斯克  
 云フ。

第 1604 圖

くすのき科



はまびは

一名 けいじゅ・しゃくなんしよ  
*Litsea japonica* Mirb.

暖地諸州ノ瀬海地林中ニ生ズル常緑喬木。高サ  
 7m許ニ達シ樹皮ハ濃褐色ヲ呈ス。葉ハ樹上ニ繁  
 ク、有柄ニシテ互生シ、長楕圓形ニシテ厚キ革質  
 ヲ呈シしゃくなげ葉ノ態アリ、長サ10-15cm、  
 鈍頭鋭底、表面ハ暗綠色ニシテ著シク平坦且ツ  
 滑カナレド裏面ニハ褐色ノ絨毛ヲ密布シ、葉  
 縁ハ全邊ニシテ多少裏面ニ曲リ狭縁ヲ呈ス。十  
 月ノ候葉腋ニ二三ノ黃白色花ヨリ成ル小球狀ノ  
 花序ヲ短柄上ニ繖形ニ着ケ、絹毛ヲ被リ、總苞  
 ハ三、四片アリテ外面ニ褐毛アリ。雌雄異株。花  
 被ハ淡綠色ニシテ六深裂ス。雄蕊ハ九本アリテ  
 花被ヨリ超出ス。約室ハ圓ク、二瓣ヲ以テ開ク。  
 漿果ハ楕圓形ニシテ翌年ニ入リテ碧紫色ニ熟  
 ス。和名濱枇杷ハ此樹海濱地ニ生ジ其葉びはニ  
 似タルヨリ云フ、けいじゅハ桂樹ナラン、しゃ  
 くなんしよハしゃくなん樹ノ意ナラン蓋シ其姿  
 しゃくなげノ類スル故ニ云フナラン。

第 1605 圖

くすのき科

