

第1672圖



きつねのぼたん科

第1673圖



きつねのぼたん科

第1674圖



558

すはまさう
Hepatica triloba Chaix.
(=Anemone Hepatica L.)

山地ノ樹下ニ生ズル多年生草本。根莖ハ斜上シ細長ニシテ節多クシテ暗色ノ鬚根ヲ發出ス。葉ハ根生シ叢出シテ傾上シ、長柄ヲ具ヘ冬ヲ凌デ枯レズ、葉片ハ心臓底ニシテ三尖裂シ、裂片ハ廣卵形鈍頭ニシテ質稍厚ク、暗緑色ヲ呈シテ光澤ナク時ニ白斑アリ、裏面ハ淡色ニシテ長毛ヲ散生シ、新葉ハ内疊シテ白絹毛ヲ被リ花ノ直後ニ開舒ス。早春舊葉間ニ少數或ハ數花ヲ開ク。花ハ長梗ヲ具ヘ初メ點頭、開ケバ上向シ、梗ニハ絹毛密生ス。花ハ徑1-1.5cm、花下ニ接シテ卵状橢圓形ノ綠色總苞三片アリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ六乃至八片アリテ長椭圓形ヲ成シ白色ヲ普通トシ時ニ紅色或ハ紫色者アリ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數、黃色。雌蕊多數、子房ニ細毛アリ。瘦果ハ多數細小ニシテ細毛ヲ有シ、下ニ宿存セル綠苞ヲ伴フ。和名洲濱草ハ其葉ノ形狀島臺ノ洲濱ニ似タルヨリ出ヅ。漢名 章耳細辛(誤用)

みすみさう
一名 ゆきわりさう
Hepatica acuta Britton.
(=H. triloba Chaix. var. acuta Pursh; H. acutiloba DC.)

山地樹陰等ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ5-10cm許、根莖ハ細長ニシテ斜上シ節多クシテ暗色ノ鬚根ヲ發出ス。葉ハ皆根生シ叢出シ長柄ヲ有シ、葉面ハ底部心臓形ヲ呈シテ三尖裂シ裂片ハ全邊ニシテ銳頭、葉質稍厚ク葉面多少光澤アリ、葉裏及ビ葉柄ニハ長毛疎生ス。早春三月ノ候長梗數本ヲ抽キテ梗端ニ各一ノ白花ヲ開ク、花下ニ接シテ三片ノ卵形總苞アリ綠色ニシテ外面ニ白毛ヲ有ス。花ハ徑1.7cm内外。萼ハ花瓣様ヲ呈シ六-九片アリテ披針形或ハ卵狀披針形ナリ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ黃色。雌蕊多數、子房ハ有毛。瘦果多數、下ニ宿存セル綠色總苞ヲ伴フ。本種ノ學名ニ關シテ予ハ上ノ如ク爲タリ、是レ假令變種タリト雖モ其植物ニ對シテ最初ニ用キシ名ハ德義上宜シク其研究ヲ尊重スベキモノタルヲ以テナリ此點予ハ敢テ命名規約ニ從ハズ。和名三角草ハ其葉形ニ基ヅキテ云ヒ、雪割草ハ早クモ雪中ニ開花スルトテ云フ。漢名 章耳細辛(誤用)

いちりんさう
一名 いちげさう・うらべにいちげ
Anemone nikoensis Maxim.

山足等ノ草地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ18-25cm許。根莖ハ可ナリ長クシテ地下ヲ橫行シ稍多肉質ニシテ白色ナリ。葉ハ細長ニシテ根莖ノ上部ヨリ出デ直立シ單一ニシテ葉ト共ニ毛ナシ。根葉ハ長柄ヲ有シ再三出ニシテ有柄、小葉ハ羽剪裂シ、裂片ハ大ナル缺刻縫ヲ有ス。花梗基部ニ輪生スル總苞ハ三片アリテ柄ヲ具ヘ、各三出葉ヲ成シテ小葉ハ更ニ深ク剪裂ス。四月、總苞ノ中央ヨリ長サ5-7cm許ノ直立セル一梗ヲ抽キ、梗端ニ一花ヲ開キ、花径4cm内外アリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ五片ニシテ椭圓形ヲ呈シ白色ニシテ外面往々淡紅色ヲ帶ビテ美ナリ。花瓣無シ。多數ノ雄蕊アリテ黃色。雌蕊多數、子房ハ細毛ヲ被ル。瘦果多數、細小、細毛アリ。和名一輪草ハ梗上ニ一花アルヨリ云フ、いちげさうハ『尺素往来』ニ一夏草ト出ヅト雖モ是レ蓋シ一花草ト書スルヲ以テ正シト爲スベキナラン、裏紅いちげハ花瓣狀萼ノ裏面往々帶紅色ナルヨリ云フ。漢名 雙瓶梅(蓋シ誤用、此語清俗名ナリト謂フ)

にりんさう
一名 がしゃうさう
Anemone flaccida Fr. Schm.

山地若クハ山足地等ノ林下地ニ生ズル質軟カキ多年生草本ニシテ往々群ヲ成シテ繁茂シ盛夏秋冬ニハ莖葉枯レテ無シ。高サ15cm許ニ達シ全株ニ疎毛ヲ生ゼリ。根莖ハ地下ニ横臥シ或ハ斜上シ多肉ニシテ寧ロ短ク疎ニ鬚根ヲ發出シ節線アリテ先頭ニ鱗片アリ。根葉ハ薄鱗片ヲ有スル根莖頭ヨリ少數叢生シテ長柄ヲ有シ、心臓状圓形ノ外形ヲ呈シテ三深裂シ、深裂片ノ中者ハ三尖裂、側者ハ二尖裂シ底部楔形ヲ成シ、尖裂片ハ更ニ鈍頭ノ缺刻状齒牙縫ヲ成シ、葉面ニ淡白斑點アリ。總苞葉ハ三片アリテ莖頂ニ位シ、無柄ニシテ三裂シ齒牙縫アリ。四五月ノ候總苞ノ葉心ヨリ一乃至三條ノ長花梗ヲ直立シ梗末ニ白花ヲ開キ、花徑1.5-2.5cm許アリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ五片ヲ當型トシ時ニ七片アリ、廣卵形ヲ呈シ外面有毛ニシテ往々紅暈アリ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ黃色。雌蕊亦多數ニシテ子房ハ白色ノ絹毛ヲ被リ柱頭無柄ナリ。瘦果ハ相集リ卵狀椭圓形ニシテ有毛綠色ナリ。和名二輪草ハ莖上ニ二花アルノ意カラレモ又或ハ一花或ハ三花アリテ一様ナラズ、是レ畢竟同屬ノ姉妹品一輪草ニ對スルノ名ナリ、がしゃうさうハ蓋シ鵝掌草ノ意ニシテ其葉形ニ基キシ名ナラン乎否乎。

さんりんさう
Anemone stolonifera Maxim.

山地ノ樹陰等ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ15-20cm許、株本ニ舊葉柄本ノ纖維ヲ遺存ス。根莖ハ短クシテ鬚根ヲ發出ス。莖ハ數條叢生シテ直立ス。根生葉ハ長柄ヲ有シ、三出ニシテ各小葉ハ短柄ヲ具ヘ、卵形ニシテ更ニ二三裂シ、各裂片ハ倒披針形ニシテ缺刻状鋸齒ヲ有ス。總苞葉ハ三片アリテ柄ヲ有シ、根葉ト同式ニ分裂ス。七月ノ候總苞ノ中心ヨリ二三ノ長梗ヲ抽キ、梗末ニ各一白花ヲ着ケ花徑1-1.7cm許アリ。萼五片花瓣様ニシテ卵形ヲ呈シ外面ニ短毛有リ。花瓣無シ。雄蕊ヲ有リ。花被多數ニシテ黃色。雌蕊ハ稍少數ニシテ微毛アル子房ヲ有ス。和名三輪草ハ一莖上ニ三花ヲ開クノ意ニシテ其姉妹品ナル一輪草・二輪草ニ對シテノ稱ナリ。

第1675圖



きつねのぼたん科

第1676圖



きつねのぼたん科

きくざきいちりんさう
一名 きくざきいちげさう・るりいちげさう
Anemone altaica Fisch.

山野ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ10-20cm許アリ。根莖ハ地中ニ横走シ瘦長ニシテ節線アリ。莖ハ直立シテ單一ナリ。根生葉ハ再三出葉ヲ成シテ柄ヲ有シ、小葉ハ卵形ニシテ缺刻及縫縫縫アリテ總苞ハ梗頂ニ在リテ三葉ヲ呈シテ擴大シ、小葉ノ狀ハ根生葉ト相同ジ。四五月ノ候、苞葉ノ中心ヨリ直上セル一花梗ヲ抽キ、梗末ニ淡紫色ノ花ヲ開キ或ハ時ニ白色ノ者アリテ花徑2.5-4cm許アリ、日ヲ受ケテ平開シ頗ル美ナリ。萼ハ花瓣様ヲ呈シ十片乃至十二三片アリテ線状長椭圓形ヲ成ス。花瓣無シ。雄蕊多數アリテ黃色。雌蕊亦多數ニシテ卵形ヲ成セル子房集リ細毛アリ。和名ハ菊喫一輪草、又ハ菊喫いちげ草ニシテ其花形ニ似タル花狀ニ基ヅク、瓊瑤いちげハ花色ニ由リテ云フ。漢名 菊葵(誤用)

第1677圖



きつねのぼたん科