

第 1690 圖

きつねのぼたん科



しきんからまつ  
Thalicttrum Rochebrunianum  
Franch. et Sav.

山地ニ生ズル大形無毛ノ多年生草本ニシテ全體粉白色ヲ呈シ、高サ1m餘ニ及フ。莖ハ直立シ平滑ナル圓柱形ヲ呈シテ通常紫色ヲ帯ビ上部ニ分枝ス。葉ハ互生シ大形ニシテ下者ハ有柄、上者ハ漸次ニ無柄ニシテ、再三羽狀複葉ヲ成シ、葉柄ハ下部稍膨大セル短鞘ヲ成シテ邊緣淡綠色ノ膜狀ト成ル。多數ノ小葉ハ小柄ヲ有シ普通卵形或ハ廣楔形ニシテ全邊又ハ先端淺ク三裂シ、底部圓形若クハ稍心臟形ヲ成ス。七八月ノ候、莖頭ニ多ク分枝シテ擴散セル大圓錐花序ヲ成シ多數ノ淡紫色小花ヲ開ク。萼片ハ長橢圓形ニシテ長サ6mm許。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ環列シ徑8mm許ニシテ花絲ハ絲狀、葯ハ黃色。雌蕊ハ多數。瘦果ハ稍長キ柄ヲ有シ、長サ5mm許ニシテ長橢圓形ヲ呈シ有條ニシテ先端ニ柱頭殘存シ微凸頭狀ヲ成ス。和名ハ紫錦唐松ニシテ紫錦ハ其美觀ヲ呈セル紫花ニ基キテ稱ナリ。

第 1691 圖

きつねのぼたん科



しきんからまつ  
Thalicttrum actaeifolium  
Sieb. et Zucc.

我邦中部并南部ノ山地或ハ山林中ニ生ズル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ50cm内外アリ。莖ハ細クシテ質稍硬シ。葉ハ互生シ、基部ニ膜質ノ短鞘ヲ有スル葉柄ヲ具ヘ、再三出或ハ三三出ノ複葉ヲ成シ、小葉ハ小柄ヲ具ヘ大形ニシテ時ニ5cmニ達シ廣卵形ニシテ底部圓形或ハ心臟形ヲ呈シ、側生小葉ニ於テハ稍歪形ヲ成シ時ニ三淺裂シ、邊緣粗鋸齒ヲ有シ、裏面ハ粉白色ヲ呈シ葉脈隆起ス。初夏ノ候、梢上ニ分枝シテ疎ナル圓錐花序ヲ成シ、眞直ノ小梗ハ小花ヲ着ク。萼ハ四片ニシテ白色ヲ呈シ外面ニ紅紫暈アリ、倒卵狀橢圓形ニシテ早落ス。花瓣無シ。雄蕊ハ多數白色ニシテ環列シ徑8mm許、花絲ハ絲狀ニシテ上部微シク闊シ。雌蕊ハ少數、子房ハ卵形ニシテ稍長キ花柱ヲ具フ。瘦果ハ長サ5mm許、無柄ニシテ多數ノ縱溝アリ、先端漸次狹ト成リ長嘴ヲ成ス。和名ハ紫銀唐松ニシテ其花紅彩アル白色ナレバ姉妹品ノ紫錦唐松ニ對シレバ紫銀ト稱セシモノナラン。

第 1692 圖

きつねのぼたん科



ほそばからまつ  
一名 さまにからまつ  
Thalicttrum integrilobum Maxim.

北海道ニ産スル無毛ノ多年生草本ニシテ高サ凡30cm内外アリ。根莖ハ短小ニシテ鬚根ヲ發出シ根部ニ肥厚シテ紡錘狀或ハ球狀ヲ成セル部アリ。莖ハ纖長ニシテ直立シ綠色ナリ。根葉ハ三三出ニシテ長柄アリ、莖葉ハ單三出又ハ再三出ニシテ、小葉ハ短柄ヲ有シ線狀長橢圓形ニシテ鈍頭或ハ微凹頭ヲ有シ、全邊或ハ往々ニ二裂片ヲ成ス。夏月花莖ヲ長ク抽キ聚繖花序ヲ成シテ白花ヲ開ク。萼片ハ廣倒形ニシテ早落ス。花瓣無シ。雄蕊ハ多數、環列シ徑1cm許、花絲ハ上部扁平ニシテ倒披針狀ヲ成シ下部ハ絲狀ヲ呈ス。雌蕊ハ少數、子房ハ有柄。瘦果ハ三四箇相集リ、長柄ヲ有シ柄ヲ合セテ長サ凡8mm、扁平ニシテ稍錘形ヲ成シ、頂ニ微凸頭アリ。和名ハ細葉唐松ニシテ其狹小ナル葉ニ基キテ稱、様似唐松ハ其初メ之レバ北海道日高國三石郡様似(しゃまに)村ニテ採集セルヨリ斯ク名ケタリ。

みやまからまつ

Thalicttrum tuberiferum Maxim.

山地ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ凡30-50cmアリ。根ハ鬚狀ヲ成セドモ中ニ瘦紡錘狀ヲ成スコト多ク、時ニ地下ニ走ル根莖ヲ具フ。莖ハ直立シ長ナル圓柱形ヲ成シテ平滑ナリ。一株ニ一箇ヲ出スル根生葉ハ再三出或ハ三三出複葉ニシテ長柄アリ、莖葉ハ再三出又ハ單三出複葉ヲ成シ上者ハ往々遂ニ單葉ト成リ、短柄ヲ有シ或ハ無柄ナリ。小葉ハ裏面粉白色ヲ呈シ、長橢圓形或ハ菱狀卵形ヲ成シ、鈍頭ヲ有シ、廣楔狀底部ヨリ心臟底ニ至ル變化ヲ現ハシ、邊緣ニ大ナル鈍鋸齒ヲ有ス。七八月ノ候、梢ニ分枝シテ多數ノ白花ヲ開ク。萼片ハ廣倒卵形ニシテ早落ス。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ環列シ徑1cm許、花絲ハ上部扁平ニシテ狹長倒披針狀ヲ成シ下部ハ絲狀ト成ル。雌蕊ハ數箇、子房ハ廣紡錘形ニシテ有柄。瘦果ハ長柄ト共ニ長サ7mm許アリ稍半月形ヲ成シ扁平ニシテ縱條アリ、頂部微凸頭ヲ成シ下部急ニ狹窄シテ細柄ニ續ク。和名ハ深山唐松ニシテ此種深山ニ生ズルヨリ云フ。

ひめからまつ

Thalicttrum alpinum L.  
var. stipitatum Yabe.

高山地帯ニ生ズル多年生無毛ノ小草本ニシテ高サ凡10-20cm許アリ、株ニ舊葉柄ノ枯残ヲ着ク。根ハ鬚狀。莖ハ纖長ニシテ直立シ綠色ヲ呈ス。根生葉ハ長柄ヲ有シテ再三出シ、小葉ハ稍無柄ニシテ小形、先端鈍形、三乃至五ノ鈍鋸齒或ハ裂片ヲ有ス。上葉ハ形狀簡單或ハ之レヲ缺如ス。八月、莖梢ニ單一ナル總狀花序ヲ成シテ疎穂ヲ成ス。花梗ハ長サ1-2.5cm許ニシテ斜上シ基部ニ全邊小鱗狀ノ苞アリ。花ハ黃白色ニシテ稍點頭ス。萼ハ四片アリ淡紫褐色ヲ呈シ長橢圓形ニシテ長サ2.5mm許アリ。花瓣無シ。雄蕊ハ多數ニシテ叢出シ徑凡8mmアリ、葯ハ長ク花絲ハ絲狀ヲ呈ス。雌蕊ハ少數ニシテ子房ハ狹長。瘦果ハ長サ5mm許、扁平ニシテ倒披針狀ヲ成シ縱條アリ、下ニ短柄ヲ有シ先端ニ柱頭殘存ス。和名ハ姫唐松ニシテ小草ナルヲ示セルナリ、本品ハ我邦同屬中ノ最小者ナリ。

とりかぶと

一名 かぶとぎく・かぶとばな  
Aconitum chinense Sieb.  
(=A. Fauriei Lev. et Vnt.)

舊クヨリ人家ニ觀賞花草トシテ栽培セラルル多年生ノ有毒草本。根ハ倒卵形ノ塊狀ヲ成シテ地中ニ直下シ其兩側ノ者ハ新根ナリ。莖ハ直立シ高サ1m内外ニシテ平滑ナル圓柱形ヲ成シ、但基部ニ微毛アリ。葉ハ互生シテ有柄、掌狀ニ深裂シテ其裂端基部ニ及ビ、深裂片ハ更ニ大形粗鋸齒ヲ有シ先端尖リ、葉質厚クシテ綠色光澤アリ、春時ノ嫩葉ハ裂片狹長ニシテ褐紫色ヲ呈セリ。秋日梢頭及ビ上方葉腋ニ圓錐花序ヲ成シ、多數相集リテ深紫色ノ大形美花ヲ開ク。五萼片ハ花狀ヲ呈シテ無毛有色、上萼片ハ大形ノ帽狀ヲ成シテ立チ長サ3cm許アリテ前方ニ向テ短ク尖リ、中部ノ二萼片ハ稍圓形ニシテ側方ニ出デ、下部二萼片ハ長橢圓形ニシテ斜ニ下方ニ出ヅ。花瓣二箇ハ直立シテ上萼片中ニ閉ジテ立チ、變形シテ蜜槽狀ヲ成シ頭部反曲シテ下ノ柄ト成ル。雄蕊多數アリ、上部藍色ニシテ外者反曲シ、花絲ノ下半ハ白色ニシテ薄キ翅狀ト成ル。子房ハ三乃至五、綠色。膏莢ハ三乃至五、狹長橢圓形ニシテ先端細ク尖リ褶皺アル多種子ヲ容ル。本種ハ通常花草トシテ栽培セラルル一種ニシテ蓋シテ我邦野生品ノ一ヨリ出デシ者ナラン、假令其種名ハ chinense ナルモ固ヨリ支那種ニ非ズト信ス。和名鳥兜ハ其花形舞臺ノ時ニ用ウル伶ノ冠ニ似タルヨリ云ヒ、兜菊・兜花モ亦其花容ニ基キテ稱呼ナリ。漢名 烏頭・雙鸞菊(共ニ誤用)

第 1693 圖

きつねのぼたん科



第 1694 圖

きつねのぼたん科



第 1695 圖

きつねのぼたん科

