

やまとりかぶと

Aconitum japonicum Thunb.

諸國ノ山野ニ普通ナル多年生草本。塊莖ハ紡錘狀倒卵形、褐色ニシテ長サ3cm内外、同大ノ新塊莖ヲ短キ柄ヲ以テ其傍ニ伴フ。莖ハ直立シ圓柱形ニシテ上部稍之曲シ無毛、稜角アリテ質強直ナリ。葉ハ互生、柄長ク三或ハ五深裂シ、裂片ハ倒卵狀披針形楔狀底ニシテ五ニ相距タリ、更ニ缺刻狀ノ鈍鋸齒ヲ有ス、質稍厚ク無毛ニシテ表面光澤アリ。晩秋ニ入りテ莖頂葉腋ニ短キ圓錐花序ヲ着ケ多數ノ碧紫花ヲ開ク。花ハ長サ3cm許、兜狀萼片ハ圓錐形ニシテ肉質、往々緑色ヲ帯ビ外面上半短毛ヲ布クコト多ク嘴ハ急ニ尖リ、側萼片ハ稍圓形、基部綠白色ヲ呈スルコト多ク内面ニハ無色ノ長毛ヲ生ズ。下部ノ二萼片ハ長橢圓形ニシテ細小。花瓣二箇ハ蜜槽ニ變形シテ兜狀萼内ニ立チ、頭部反曲シ下ハ狹長柄ト成ル。雄蕊ハ多數。雌蕊ハ三乃至五。葇荑ハ三乃至五ニシテ無毛ナリ。和名ハ山鳥兜ニシテ山地ニ生ズル故云フ。漢名 烏頭(誤用)



きつねのぼたん科

ほそばとりかぶと

Aconitum senanense Nakai.

我邦中部ノ深山ニ生ズル多年生草本。塊莖ハ狭倒圓錐體ニシテ褐色ヲ呈スルコト他種ト異ナラズ。莖ハ瘠長、高サ50-100cm、往々ニシテ傾斜シ多少稜角ヲ有シテ平滑ナレドモ杓ニ至リテ細毛ヲ生ズ。葉ハ有柄互生、概形五角形ノ掌狀三全裂ニシテ側裂片ハ更ニ二深裂シ、各裂片ハ楔狀底廣倒卵形ニシテ上半部ハ羽狀ノ缺刻狀鋸齒縁ヲ成シ、終裂片ハ細長ク鋭尖頭ヲ成ス、稍膜質ニシテ表面甚ダ平坦ナリ、脈上ニノミ少シク毛茸ヲ生ズ。夏日梢上及葉腋ニ圓錐花序ヲ出ダシ紫碧花ヲ開ク。花ハ長サ2-3cm、兜狀萼片ハ左右扁壓ノ圓錐形ヲ帯ビタル圓筒狀即チ烏帽子様ヲ成シ、側萼片ハ内面ニ長毛散生シ、下部ノ二萼片ハ狹シ。雄蕊ハ多數、無毛。子房ハ少數。葇荑ハ三乃至五、外壁平滑、上端ニ短小花柱ヲ遺存ス。和名ハ細葉烏兜ニシテ其葉ノ裂片狹長ナルヨリ云フ。



きつねのぼたん科

れいじんさう

Aconitum Roczyanum Raymond.

諸州ノ山中ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ40-60cm許アリ。根ハ黒褐色ヲ呈シ主根アリテ地中ニ直下シ大ナラズ。莖ハ直上シテ通常紫色ヲ帯ビ稍有稜ニシテ上部短毛密生ス。根葉ハ長柄ヲ有シテ掌狀ニ五乃至七裂シ、各裂片ハ鋭頭ノ缺刻又ハ齒牙ヲ有ス。上葉ハ短柄ニシテ形狀簡單ナリ。夏日莖上又ハ葉腋ニ二、三ノ總狀花序ヲ直立シ、稍疎ニ淡紫花ヲ着ク。五萼片ハ花瓣狀ニシテ粗毛密布ス。上萼片ハ兜狀ニシテ上方圓筒狀ニ伸ビ先端少シク彎曲シ長サ17mm許、細ク尖リテ前方ニ突出シ、側部二萼片ハ廣倒卵形、下方二萼片ハ長橢圓形ニシテ稍前方ニ向テ垂下ス。花瓣二箇ハ蜜槽狀ヲ成シテ頭部反曲シ長柄アリテ上萼片頭部内ニ潜入ス。雄蕊ハ多數アリ、花絲ノ下部ハ長橢圓狀ニ擴ガル。子房ハ三數。葇荑ハ通常三箇アリテ先端ニ存スル遺存花柱ハ反曲ス。和名俗人草ハ其花形舞樂ノ時俗人ノ頭ニ着クル冠ニ似タルヨリ云フ。漢名 牛扁(誤用)



きつねのぼたん科

ひえんさう

一名 ちどりさう

Delphinium Ajacis L.

明治初年ニ渡來シ花草トシテ庭園ニ培養セララルル越年生草本ニシテ南部歐洲ノ原産ナリ。莖ハ高サ90cm内外ニ達シテ直立シ上部ニハ稍短毛ヲ帶フ。葉ハ互生シ下部ノ者ハ稍長柄アリテ掌狀ニ三裂シ、各裂片更ニ二三回細裂シテ狭線形ト成リ、上部ノ者ハ無柄ニシテ小形ナリ。初夏ノ候莖梢ニ直立セル總狀花序ヲ成シテ多數ノ花ヲ着ケ側方ニ向テ開ク。花ハ碧紫色ヲ通品トシ更ニ淡紫色・淡紅色・白色等種々アリ、又八重咲ノ品ヲ見ル。五萼片ハ大形ニシテ開出シ大小不同アリ、其最上位ヲ成シテ後方ノ一片ニハ狹筒狀ノ一距アリテ長サ1.5cm許。花瓣ハ最後部ノ一片ノミ存シテ上方二岐シ、下部合一シテ萼ノ距中ニ挿入セリ。雄蕊多數、花絲ハ下部扁平ト成ル。一雌蕊アリ。葇荑ハ長橢圓形ニシテ密毛ヲ被ル。和名ハ飛燕草・千鳥草ニシテ共ニ其花容ニ因ミテ名ケシモノナリ。



きつねのぼたん科

ひめうづ (天葵)

一名 とんぼさう

Semiaquilegia adoxoides Makino.
(= *Isopyrum adoxoides* DC.)

我邦中部南部諸州ノ山足・路傍石垣等ニ生ズル多年生小草本ニシテ高サ15-30cm許アリ。塊莖ハ暗色ニシテ形狀不定ナリ。莖ハ塊莖ヨリ出デ纖長ニシテ直立シ、疎ニ枝ヲ分ツ。葉ハ殆ンド常緑ニシテ裏面紫色ヲ帯ビ新葉ハ秋冬ノ候既ニ萌出ス。根葉ハ叢生シテ纖長ナル長柄ヲ有シ三出複葉ヲ成ス、小葉ハ短柄ヲ有シ、廣楔形ニシテ三尖裂シ、尖裂片ハ圓頭ニシテ二三缺刻アリ。莖葉ハ短柄ヲ有シ或ハ無柄ニシテ再三出ヲ成ス。四五月ノ候、梢ニ細長ナル花梗ヲ分チテ頂ニ點頭セルをだまき様ノ小花ヲ開キ白色ニシテ稍淡紅ヲ帯ブ。萼ハ五片アリ、花瓣様ヲ呈シテ鐘形ヲ成シ長サ7mm許。花瓣ハ五片アリテ上方黃色ヲ呈シ萼片ノ半長ニシテ基部膨出シ短キ距狀ヲ呈ス。雄蕊ハ九乃至十四、内者ハ變ジテ薄鱗片ト成ル。雌蕊ハ二乃至四、子房ハ狹長。葇荑ハ小ニシテ二乃至四箇アリ、長披針形ニシテ星狀ニ開出シ、心皮薄シ。種子ハ略ボ球形ニシテ黑色ヲ呈シ皮面皺縮ス。和名姫烏頭ハとりかぶとニ似テ小形ナリトノ意、蜻蛉草ハ多分村童其花ヲ以テとんぼ釣ルニ用ウルヨリノ名ナラン。



きつねのぼたん科

をだまき

Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc.

觀賞花草トシテ普ク人家ノ庭園ニ愛植セララルル多年生草本ニシテ蓋シ北地ノ産ナルベシト云フ。高サ20-30cm許。莖ハ直立シ平滑ナル圓柱形ニシテ粉白綠色ナリ。根生葉ハ長柄ヲ有シ帯白色ヲ呈シ再三出・三三出ヲ成シ、小葉ハ更ニ二三裂シ、裂片ハ廣楔形ヲ成シ扇狀ニ分裂シテ鈍頭齒牙ヲ有ス。梢葉ハ短柄ヲ有シテ單三出ヲ成ス。初夏ノ候、枝上ニ長梗ヲ出シテ鮮碧紫色或ハ稀ニ白色(f. albiflora Makino)ノ美花ヲ梗頭ニ開キ下向ス。萼ハ五片ニシテ略ボ開出シ花瓣様ニシテ圓狀橢圓形ヲ成シ鈍圓頭ニテ長サ凡2cmアリ。花瓣ハ五片ニシテ萼片ト交互ニ立チ、長橢圓形ニシテ平截狀鈍頭ヲ成シ上部淡黃色ヲ呈シ、其基部ハ下方ニ伸長シ、強ク内方ニ鉤曲シ先端小球狀ニ膨大セル距ヲ成シ、距ヲ併セテ花瓣ノ長サ2cm許アリ。多雄蕊ニシテ花絲ニ長短アリ内部ノ者最モ長ク蓋内ニ白膜質ノ長鱗片アリテ子房ヲ擁セリ。雌蕊ハ五、子房ハ狹長、花柱長シ。葇荑ハ五、直立、無毛ナリ。和名ハ芋頭即チ芋手巻ノ意ニシテ其花狀ニ基テノ呼名ナリ。漢名 練斗菜(誤用)



きつねのぼたん科