

第 1834 圖



ほそばのはまあかさ

Atriplex Gmelini C. A. Mey.

瀕海地ノ砂場ニ生ズル無毛ノ一年生草本ナリ。莖ハ直立シ緑色ニシテ質硬ク多少屈曲シテ分枝シ高サ40-60cm許アリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、線狀披針形又ハ線形ニシテ鋭頭、通常全邊ナレドモ時ニ二三ノ疎齒アリ、質厚クシテ緑色ヲ呈シ多少白色ノ粉鱗ヲ布ク。秋時、枝梢ニ穂ヲ成シテ密ニ淡綠色ノ細花ヲ綴リ、雄花ト雌花ト相雜居ス。雄花ハ無苞ニシテ四乃至五片ノ萼アリ、無花瓣、雄蕊ハ四乃至八。雌花ハ二片ノ苞ヲ有シテ無萼、子房ニハ二花柱アリ。雌花ノ苞ハ果時増大シテ宿存シ菱狀三角形ヲ成シ、全邊又ハ微齒アリ、質厚クシテ中ニ一類ノ胞果ヲ入ル。和名ハ細葉濱藜ニシテ其葉之レヲはまあかさ葉ニ比ブレバ狭瘦ナルヨリ云フ。

第 1835 圖



あかざ (藜)

Chenopodium album L.

var. centrорubrum Makino.

往時支那ヨリ渡來シ主トシテ園中ニ生ズル無毛ノ一年生草本ニシテ、往々一時間ノ附近ニ於テ野生状態ヲ呈スル事アルモ其生活年々連續セズ。莖ハ直立シ、大ナル者高サ1.5m許、徑3cm許ニ達シ、綠色條アリ、老ユレバ質硬シ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、菱狀卵形又ハ長三角狀卵形ニシテ鋭頭、楔形底、邊緣ニハ通常波狀齒ヲ具ヘ、質軟カニシテ緑色ヲ呈シ、嫩葉ハ特ニ紅紫色ノ粉狀物ヲ密布シ美ナリ。夏秋ノ候、梢上分枝シ枝上ニ穂ヲ成シテ多數ノ黃綠色細花ヲ密着ス。花ハ無柄ノ兩性ニシテ小苞ヲ缺ク。萼ハ五深裂ス。無花瓣。五雄蕊。扁圓子房頂ニ二花柱アリ。胞果ハ宿存萼ニ擁セラレ扁圓ニシテ胚ハ彎曲ス。嫩葉ハ食スベク、老莖ハ杖ト作スベシ。之レト同種ニシテ野外ノ隨處ニ自生シ其嫩葉赤色ナラザル品アリ、之レヲしるご一名きんざー一名しろあかざト云フ、即チ Ch. album L. ニシテ灰藜ノ漢名ヲ有ス。和名あかざノあかハ赤色ノ意ニシテ其嫩葉ノ赤色ニ基ケルナランモ、意味ハ解スベカラズ、或ハ赤麻(あかあざ)ノ約ナラントノ説アレドモ信ヲ措キ難シ。

第 1836 圖



こあかさ

Chenopodium ficifolium Smith.

原頭・廢地・荒地・路傍等ニ生ズル無毛ノ一年生草本ナリ、而シテ元ト外國渡來ノ品ニシテ今ハ歸化植物ノ一ト成セリ。莖ハ高サ30-60cm許アリテ分枝シ綠色ヲ呈ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ、長橢圓形乃至線形ニシテ通常鈍頭微凸端、底部戟形又ハ楔形ヲ成シ、全邊又ハ疎齒アリ、あかざ又ハしろざ葉ニ比スレバ狭瘦ニシテ綠色ヲ呈シ質軟ナリ。晩春ヨリ初夏ニ互リテ本莖梢并ニ枝梢ニ花穂ヲ成シテ綠色ノ細花ヲ密簇ス。花ハ無柄ニシテ小苞ヲ有セズ、萼ハ五深裂ス。無花瓣。五雄蕊。子房上ニ二花柱アリ。胞果ハ背面ニ稜アル宿存萼ニ擁セラレ。和名ハ小藜ニシテ本品之レヲあかざニ比スレバ小形ナルヨリ云フ。

かはらあかさ

Chenopodium acuminatum

Willd. var. virgatum Moq.

河川中ノ砂上ニ生ズル無毛ノ一年生草本ナリ。莖ハ高サ30-50cm許アリテ直立シ、疎ニ枝ヲ分チ、綠色ニシテ質硬シ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ、披針形又ハ長橢圓形ニシテ先端鋭頭、基部楔形底ヲ成シ、全邊ニシテ長サ5cm内外アリ。夏月、枝梢ニ細長ナル花穂ヲ成シテ密ニ多數ノ黃綠色細花ヲ簇着ス。花ハ無柄ニシテ小苞ヲ有セズ。萼ハ五深裂シ、裂片ハ卵形ナリ。五雄蕊。子房上ニ二花柱アリ。胞果ハ扁球形ニシテ宿存セル萼ニ擁セラレ中ニ一種子アリ。和名ハ川原藜ニシテ能ク川原ニ生ズレバ斯ク云フ。

第 1837 圖



まるばあかさ

Chenopodium acuminatum Willd.

var. japonicum Franch. et Sav.

諸州ノ海岸砂場ニ生ズル無毛ノ一年生草本。莖ハ平滑ニシテ直立シ或ハ下半部ハ伏臥シテ上半部ハ斜上シ、分枝シテ綠色ヲ呈シ、質硬ク、高サハ30-50cm許アリ。葉ハ互生シテ葉柄アリ、廣橢圓形或ハ卵圓形、多肉質ニシテ兩面平坦、稍粉白色ヲ呈シ、邊緣鋸齒無ク、鋭頭ナレドモ鈍端ヲ有シ、鈍底ナリ。夏日、枝端ニ穂狀花序ヲ成シテ多數綠色ノ細花ヲ密集ス。花ハ無柄。萼ハ五片ニシテ花瓣無シ。雄蕊ハ五個。子房上ニ絲狀ノ二花柱アリ。胞果ハ扁平ニシテ宿存萼ニ擁セラレ、果中ニ細小ナル黑色ノ一種子アリ。本種ハかはらあかざニ類似スレドモ其葉廣キヲ以テ識別スベシ。和名ハ圓葉藜ニシテ其葉形ニ由リ斯ク呼ビシナリ。

第 1838 圖



ありたさう

一名 ろうださう

Chenopodium ambrosioides L.

往昔國外ヨリ渡來シ或ハ天正年間ニ來ルト云ヒ或ハ寛永ノ初年ニ來ルト云ハル、元來西印度并ニめきしコノ原産ニシテ往々人家ニ栽植セラルト雖モ、今日ハ處々ニ野生シ所謂歸化植物ノ一ト成レル一年生草本ニシテ一種ノ烈臭アリ鼻ニ佳ナラズ。莖ハ直立シ、高サ70cmニ達シ多ク分枝シ淡綠色ニシテ線條アリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、長橢圓形或ハ披針形ニシテ兩端尖リ、邊緣鈍齒或ハ波狀疎齒ヲ有スルカ又ハ全邊ニシテ裏面ニ腺點アリ。夏秋ノ間、枝上ニ穂ヲ成シテ多數ノ綠色細花ヲ簇着シ、穂上ニ絲狀ノ苞ヲ有セリ。花ハ無柄。萼ハ四乃至五裂シ裂片ハ卵形、花後ニ宿存シテ綠色ヲ呈シ、中ニ小ナル一胞果ヲ包ム。雄蕊ハ四乃至五ニシテ萼上ニ超出シ黃藥ヲ有ス。子房ハ扁圓ニシテ二乃至四岐セル一花柱ヲ具フ。莖葉ヲ驅蟲ニ用フベシ。和名有田草ハ多分往時始メテ肥前有田ニ作ラレアリシヨリ此ノ如ク名ケシニ非ザル乎非乎、ろうださうハ同ジク臭草ナル所謂芸香屬ノ Ruta 即チ Ruda (西班牙語)ヲ誤認シテ此草ノ名ト爲セシモノナリ。漢名 土荊芥(誤用)

第 1839 圖

