

第 1852 圖



第 1853 圖



第 1854 圖



さくらたて
Polygonum japonicum Meisn.
var. *conspicuum Nakai.*
(=*Polygonum conspicuum Nakai*;
Persicaria conspicua Nakai.)

水邊ニ生ズル多年生草本ニシテ特ニ根莖ヲ地下ニ引キ繁殖スルノ殊態アリ。莖ハ50-70cm許ニシテ分枝少ク、質稍硬キ瘦長圓柱形ヲ成シ、節稍隆シ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、披針形ニシテ兩端狹窄シ上部ハ鋭尖頭ヲ呈ス。鞘狀托葉ハ圓筒形ニシテ口縁ニ長鬚毛ヲ有ス。秋日枝上ニ長キ穗狀様花穂ヲ成シテ美ナル淡紅花ヲ開ク。萼ハ五深裂シ長サ5-6mmアリ、背面ニ腺狀ノ斑點アリ、たて類中はなさくらたてニ亞シ花體大ナル者ノ一ナリ。無花瓣。八雄蕊アリ。卵圓形ノ子房ニ三花柱アリ。雌雄異株ニシテ雄花ハ長雄蕊ト短花柱トヲ有シ花後ニ結實セズ。雌花ハ長花柱ト短雄蕊トヲ具ヘテ花後ニ結實ス。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜アル卵形ナリ。一變種ナルヤウキひたて一名はなさくらたて (var. *macranthum Makino*) ハ花最モ大ニシテ美ナリ是レ亦二形花ヲ有スルナリ。和名櫻蓼ハ其花淡紅色ニシテさくらノ如ケレバ云フ。漢名 蕺草 (誤用)

ぼんとくたて
Polygonum flaccidum Meisn.
(=*Persicaria flaccida Nakai.*)

水傍ニ生ズル一年生草本。莖ハ直立シテ疎ニ分枝シ、高サ70cm内外アリテ節高ク、莖面通常紅紫色ニ染ム。葉ハ有柄ニシテ互生シ、廣披針形ニシテ鋭尖頭ヲ有シ、深綠色ニシテ葉面ニ八字狀ノ墨斑ヲ印シ、敢テ辛味無シ。鞘狀托葉ハ圓筒形ニシテ口縁ニ鬚毛アリ。秋日枝梢ニ花穂ヲ下垂シ、白色淡紅暈ノ花ヲ疎着ス。萼ハ五深裂シ、綠色ニシテ點腺ヲ散布シ、上部紅色、秋月果時ノ際殊ニ紅綠相映シテ頗ル美ナリ。無花瓣。雄蕊ハ八箇、微シク萼ヨリ短シ。子房ハ球形ニシテ三花柱アリ。瘦果ハ三稜卵圓形ニシテ宿存萼ニ包マル。和名ぼんとくたてノぼんとくハぼんつくノ意ニテ愚鈍者ノコトナリ、此種ハ辛味アルヤなぎたてニ似テ葉ニ辛味無ケレバスク云フ。


ぬかぼたて
Polygonum minutulum Makino.
(=*Persicaria minutula Nakai.*)

野外ノ濕地或ハ田間ニ生ズル一年生草本ニシテ高サ30cm内外アリ。莖ハ直立或ハ傾上シ纖弱ニシテ疎ニ分枝ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、線形乃至披針形ヲ成シ鋭尖頭ヲ有シ鋭底ヲ成シ長サ2-6cm、幅2-10mmアリテ質菲薄ナリ。鞘狀托葉ハ長サ2-6mm、口縁ニ鬚毛ヲ有ス。秋日枝上ニ長サ1-3cm許ノ瘦小ナル穗狀様花穂ヲ成シ、絲狀ノ花軸ニ紅色ヲ帯ベル細花ヲ疎着ス。萼ハ五裂シ、長サ1.5mm許、腺點ヲ有セズ。花瓣無シ。雄蕊ハ概ネ五箇。橢圓形ノ子房上ニ三花柱アリ。瘦果ハ小形ニシテ宿存萼ニ包マレ、三稜圓卵形ニシテ長サ1.5mmアリ。和名糠穗蓼ハ其花穂上ノ花極メテ小形ナルヨリ之レヲぬかニ比シスク云フ。

第 1855 圖



第 1856 圖



第 1857 圖



やなぎぬかぼ
Polygonum paludicola Makino.
(=*Persicaria paludicola Nakai.*)

濕地或ハ水邊ニ生ズル一年生草本ナリ。莖ハ高サ40cm内外ニ達シ、下部ハ往々斜臥シテ上部ハ傾上シ、瘦長ニシテ枝ヲ分チ質稍硬シ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、線形ニシテ兩端漸次ニ狹窄シテ尖リ葉頭ハ鋭尖形ヲ成シ底部ハ狹楔形ヲ呈シ、長サ3-9cm、幅2-9mmアリ。鞘狀托葉ハ長サ5-10mm、口縁ニ長鬚毛ヲ有ス。秋日長サ3-7cm許ノ瘦長ナル穗狀様花穂ヲ成シ疎ニ淡紅色ノ細花ヲ着ク。萼ハ五裂シ長サ1.5mmアリテ腺點ヲ有セズ。花瓣無シ。雄蕊ハ概ネ五箇。橢圓形ヲ成セル子房ニ二或ハ三花柱アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、兩面形或ハ三稜形ニシテ長サ1.5mmアリ。和名ハ柳糠穗ニシテ全體ハ糠穗蓼ニ似、而シテ其葉狹長ニシテ柳葉ノ如ケレバスク云フ。

ねばりたて
Polygonum viscoferum Makino.
(=*Persicaria viscofera Nakai.*)

山野向陽ノ地ニ生ズル一年生草本ニシテ莖竝ニ葉共ニ粗毛ヲ布ク。莖ハ瘦長ニシテ高サ40-60cm許アリ、疎ニ枝ヲ分チ、下部ハ其節隆起シ、上方ノ節間上部ニ粘液ヲ分泌シテ膠着ス、蓋シ自體保護ノ爲メナラン乎、而シテ敢テ捕蟲ノ機能アルニ非ラズ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、廣披針形又ハ披針形ヲ呈シ、長サ3-10cm許。鞘狀托葉ハ圓筒形ニシテ口縁ニ長鬚毛ヲ有ス。夏秋ノ候梢上ニ瘦長ナル穗狀様花穂ヲ成シ、綠白色又ハ淡紅色ノ小花ヲ疎着シ、花梗上部ニモ亦粘液ヲ分泌ス。萼ハ五裂シ長サ2mm許。花瓣無シ。雄蕊ハ概ネ八本アリテ萼ヨリ短シ。子房ハ倒卵圓形ニシテ三花柱アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜卵圓形ニシテ長サ1.5mm許アリ。和名ハ粘蓼ニシテ其莖上ノ粘處ニ基キテスク云フ。

みぞそば
一名 うしのひたひ
Polygonum thunbergii
Sieb. et Zucc.
(=*Persicaria thunbergii Gross.*)

原野・山足・路傍ノ水邊ニ最モ普通ニ生ズル一年生草本ニシテ通常群生ス。莖ノ高サ30-50cm許長サ凡70cmニ達シ疎ニ分枝シ、稜ニ小逆刺ヲ生ゼリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ具ヘ、戟形ニシテ中央裂片ハ卵形ヲ呈シ鋭尖頭ヲ成シ、毛ヲ散生ス。鞘狀托葉ハ短ク、其口縁往々綠色ノ小葉狀ヲ成ス。秋日莖上ニ枝ヲ分チ頂ニ頭狀様花穂ヲ成シテ十箇内外ノ小花ヲ簇着シ、花梗ニハ腺毛ヲ有ス。萼ハ五裂シ、淡紅色・上紅下白色・白色・淡綠色時ニ綠色ヲ呈シ、長サ4-6mm許アリ。花瓣無シ。雄蕊ハ八、萼ヨリ短シ。子房ハ卵形ニシテ三花柱アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、卵狀球形ニシテ三稜ヲ成シ、長サ3.5-4mm許アリ。和名溝蕎麥ハ溝邊ニ繁茂シテ形狀そばノ如ケレバ云フ、牛ノ額草ハ其葉形牛ノ顔面ニ似タルヨリ云フ。漢名 苦蕎麥 (誤用)