

第1864圖

た  
で  
科

第1865圖

た  
で  
科

第1866圖

た  
で  
科

## やのねぐさ

*Polygonum nipponense* Makino.  
(= *Persicaria nipponensis* Nakai.)

野外ノ湿地ニ生ズル一年生草本。莖ハ細長ナル圓柱形ニシテ毛ナク多クハ横方ニ擴ガリ斜上シ、長サ50cm内外ニ及ビ微小ナル逆刺ヲ有ス。葉ハ互生シテ葉柄アリ、卵形乃至長橢圓形ニシテ短銳尖頭ヲ有シ、截形底或ハ稍心臟底ヲ成シ、無毛ナリ。鞘狀托葉ハ長クシテ先端截形ト成リ鬚毛ヲ有ス。秋日梢上ニ分枝シ、枝端ニ多少頭狀ヲ成シテ淡紅色時ニ白色（しろばなやのねぐさ forma *albiflorum* Makino）ノ小形花ヲ攢簇シ、花梗ニ腺毛ヲ有セリ。萼ハ五深裂シ、長サ2-3mm。花瓣無シ。八雄蕊ハ萼ヨリ短シ。長卵形子房頂ニ三花柱アリ。瘦果ハ卵形ニシテ三稜アリ、長サ2.5mm許ニシテ宿存萼ニ包マル。和名矢の根草ハヤのね即チヤジリ（跡）ニ似タル葉形ニ基キシ稱ナリ。

## うなぎづる

一名 うなぎつかみ

*Polygonum aestivum* Makino.  
(= *P. sagittatum* L. var. *aestivum*  
Makino; *Persicaria aestiva* Ohki.)

水邊ニ生ズル一年生草本ニシテ高サ凡30cmニ出入ス。莖ハ往々膝曲セル下部ヨリ分枝シ、枝ハ瘦長ニシテ直上シ更ニ疎ニ小枝ヲ岐チ稜上ニ小逆刺ヲ有ス。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、卵狀箭形乃至披針狀箭形ニシテ先端稍鈍頭ヲ成シ、元來無毛ナレドモ唯葉裏ノ中脈下部ニノミ小逆刺アリ。葉柄ハ多クハ逆刺ヲ具フ。鞘狀托葉ハ短クシテ口緣ハ斜截形ヲ成シ縁毛ヲ有セズ。五六月頃、梢枝頂ニ頭狀花序ヲ成シ白質ニシテ末端紅色ヲ帶ビ或ハ全紅色ノ小花ヲ簇集ス。花梗ハ無刺ナリ。萼ハ五深裂シ、長サ3-4mm許。花瓣無シ。八雄蕊アリ。子房上ニ三花柱ヲ具フ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜ヲ有ス。和名鰐蔓又ハ鰐攫ミハ共ニ其莖刺ヲ利用シテ容易ニうなぎヲ攫ミ得ルヨリ斯ク云フ。漢名 雀翹（蓋シ誤用）

## あきのうなぎづる

一名 あきのうなぎつかみ

*Polygonum sagittatum* L.  
var. *Sieboldi* Maxim.

(= *Polygonum Sieboldi* Meisn.; *P. sagittatum* L. var. *americanum* Meisn. forma *Sieboldi* Makino; *Persicaria Sieboldi* Ohki.)  
邦内隨處ノ溝側・湿地或ハ水傍等ニ普通ニ生ズル一年生草本ニシテ往々群生ス。莖ハ長ク四方ニ擴ガリテ分枝シ長ク伸ビテ1m許ニモ及ビ、四稜ニシテ逆刺ヲ有シ、能ク他物ニ鉤ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、披針狀箭形ニシテ銳頭ヲ有シ毛ナケレドモ葉裏中脈ノ下部ニハ葉柄ト共ニ小逆刺アリ。鞘狀托葉ハ短クシテ斜截頭ヲ成シ縁毛ヲ有セズ。秋日梢上ニ枝ヲ分チテ頂ニ下部白質上部紅色或ハ時ニ淡紅色ノ小花ヲ頭狀花序ニ集着シ花下果實ト相雜アリ、花梗ハ無刺ナリ。萼ハ五深裂シ、長サ3mm許。花瓣無シ。八雄蕊。子房上ニ三花柱アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜ヲ有ス。和名秋の鰐蔓並ニ秋の鰐攫みハうなぎづる即チうなぎつかみノ初夏ニ花サクト異ニシテ此種秋ニ至テ花サク故ニ斯ク云フ。

## ながばのうなぎづる

一名 ながばのうなぎつかみ  
*Polygonum hastato-sagittatum*  
Makino.  
(= *Persicaria hastato-sagittata*  
Nakai.)

原野ノ水邊ニ生ズル一年生草本ニシテ往々群生シテ繁茂シ高サ80cmニ及ブ。莖ハ上向シ瘦長ニシテ疎ニ枝ヲ分チ、平滑又ハ小逆刺アリ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、披針形ニシテ銳尖頭ヲ有シ底部ハ略ボ戦狀箭形又ハ戦狀截形ヲ成シ、毛無シ。鞘狀托葉ハ長キ圓筒形ヲ呈シ、膜質ニシテ截形ヲ成セル口緣ニ短鬚毛ヲ具フ。秋月梢上ニ長枝ヲ分チ、枝頂ニ淡紅紫色ノ小花ヲ略ボ頭狀密集シ、花梗ニハ腺毛ヲ密生ス。萼ハ五深裂シ、長サ3-4mm許。花瓣無シ。雄蕊ハ七本アリシ、花ト同長。卵形ノ子房頂ニ三花柱ヲ有ス。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、長卵形ニシテ三稜アリ、和名ハ長葉の鰐蔓、長葉の鰐攫みノ意ナリ、鰐蔓等ノ解ハうなぎづるノ條下ニ在リ。

第1867圖

た  
で  
科

第1868圖

た  
で  
科

## にほひたで

*Polygonum viscosum* Hamilt.  
(= *Persicaria viscosa* Nakai.)

原野或ハ湖畔ノ草地ニ生ズル可ナリ大形ノ一年生草本ニシテ生時全草一種ノ香氣ヲ放ツ、是レ體上ニ生ズル腺毛ニ基因ス。莖ハ粗大ニシテ高サ1-1.5mニ達シ、枝ヲ分チ、往々紅色ヲ帶ビ、節部隆起シ、開出セル長毛並ニ短腺毛ヲ密布ス。葉ハ有柄ニシテ互生シ、披針形又ハ廣披針形ニシテ先端長ク尖リ、全邊ニシテ長毛ヲ布キ小腺點ヲ有ス。鞘狀托葉ハ圓筒狀ヲ成シ長ク、粗毛ヲ密布ス。秋時、梢上ノ枝端ニ穗狀花穗ヲ成シテ密ニ紅色ノ小花ヲ綴リ、頗ル美ナリ。萼ハ五深裂シ、長サ2-3mm許。花瓣無シ。八雄蕊アリテ萼ヨリ短シ。球形子房上ノ花柱ハ長ク三岐ス。瘦果ハ黒褐色ニシテ三稜アル卵圓形ナリ。和名香蓼ハ全苗ニ香アルヲ以テ云フ。

第1869圖

た  
で  
科

## たにそば (野蕎麥草)

*Polygonum nepalense* Meisn.  
(= *Persicaria nepalensis* Miyabe;  
*Polygonum alatum* Ham. var.  
*nepalense* Hook. f.)

原野田間又ハ山中ノ湿地ニ生ズル軟カキ一年生草本。莖ハ下部横臥シテ後上向シ、能ク枝ヲ分チ、長サ80cm内外、通常紅色ヲ帶ブ。葉ハ有柄ニシテ互生シ、卵狀三角形ニシテ銳尖頭、長サ1-5cm許、葉裏ニ小腺點アリ、葉底ハ葉柄ニ流テ柄ノ兩側ニ狭翼ヲ成シ基部ハ耳狀ヲ呈シテ莖ヲ抱ケリ、晚秋往々紅色ニ染シテ美ナリ。鞘狀托葉ハ膜質ニシテ短シ。夏秋ノ候、葉腋又ハ枝端ニ頭狀ヲ成シ白質ニシテ紅色ヲ帶ベル小花ヲ密集シ、花梗ニ腺毛ヲ有ス。萼ハ四裂シテ下部ハ短筒狀ヲ成シ長サ2mm許。花瓣無シ。雄蕊ハ六七本アリテ萼ヨリ短シ。子房ハ橢圓形ニシテ花柱ハ二岐ス。瘦果ハ兩凸面ノ卵圓ニシテ下部壺狀ヲ呈セル宿存萼ニ包マル。和名谷蕎麥ハ溪邊ニ生ズルそばノ意ナリ。