

第1876圖



第1877圖



第1878圖

た
で
科

みづひき (毛蓼)

Polygonum filiforme Thunb. (= *P. virginianum* L. var. *filiforme*
 Nakai; *Tovara filiformis* Nakai.)

山地或ハ山足地或ハ林叢邊ニ多ク生ズル多年生草本。莖ハ直立シテ疎ニ分枝シ、高サ 50-80cm 許アリテ長毛ヲ布キ節隆ク質硬シ。葉ハ短柄ヲ有シテ互生シ、廣椭圓形又ハ倒卵形ニシテ葉頭ハ銳形、葉底ハ鈍形ヲ呈シ、長サ 5-15cm 許、質稍薄クシテ稍硬ク兩面トモ毛ヲ散生シ葉面往々墨記斑アリ。夏秋ノ候、梢上ニ數條ノ長鞭狀細長花軸ヲ抽キ、穗狀花序赤色ノ小花ヲ着ク。花ハ短キ小梗ヲ有シ開出シテ少シク弓曲シ、下面ハ色淡シ。萼ハ四裂シ、裂片ハ卵形ニシテ稍銳頭ヲ有シ長サ 2-3mm 許。花瓣無シ。雄蕊ハ五本。卵圓形子房ノ頂ニ粗大ナル花柱二本アリテ子房ヨリ長シ。瘦果ハ兩凸面ノ卵形ヲ成シレト同長ノ宿存萼ニ包マレ長サ 2.5mm 許アリ。宿存セル花柱ハ宿存萼上ニ斗出シ先端鉤曲シ下方ニ曲レリ。白花品ヲキンミヅヒキ (*f. albilora* Makino)、紅白相雜ル品ヲジョシヨミヅヒキ (*f. bicolor* Makino) ト云フ。和名ハ水引ニシテ其花穂ヲ水引ニ擬セシモノナリ。漢名 金線草(蓋シ誤用)

いたごり (虎杖・黃藥子)

一名 たんじ・さいたな

古名 たぢひ・さいたづま

Polygonum Reynoutria Makino. (= *Reynoutria japonica* Houtt.;
 P. cuspidatum Sieb. et Zucc.)

山野到處ニ多ク生ズル大形ノ多年生草本。根莖ハ木質ニシテ黃色、皮色褐色ニシテ長ク地中ヲ貫通シテ延び下苗ヲ抽出ス。莖ハ通常粗大ニシテ直立或ハ斜傾シ高サ 30cm-1.5m 許ニシテ分枝シ、中空ナル圓柱形ニシテ嫩時紅紫點ヲ散布シ、節ニ膜質ノ短キ鞘状托葉アリ、冬時木質ノ枯葉殘留ス。葉ハ有柄互生シ、廣卵形又ハ卵形椭圓形ニシテ短銳尖頭、底部截形、長サ 5-18cm 許、質硬シ。夏日、枝上葉腋並ニ枝端ニ複總狀株狀花序成シテ多數ノ小白花ヲ密ニ着ク。雌雄異株。萼ハ五裂シ、長サ 2mm 弱、外列ノ三片ハ背面ニ翼有シ、果時成長シテ長サ 7mm 餘ニ達シ。花瓣無シ。雄花ニハ八雄蕊アリ。雌花ノ子房上ニ三花柱アリ。瘦果ハ三稜アル複卵形ニシテ暗褐色ヲ呈シ種状成セル宿存萼ニ包マル。花色紅ナルヨベにいたどり一名いげつさう (*f. colorans* Makino) ト云フ、然レドモ株ニヨリ其色ニ濃淡アリテ白花ノ普通品ニ連絡シ其間截然タル區別線無ク只其株ニ大小アルノミナリ、山地ニ在ル者往々其株低矮ニシテ花被密ニ束集ス之レヲのへいたどり (*f. compacta* Makino) ト云フ。第狀ニシテ酸味アル嫩莖ヲ生食シ或ハ煮食シ民間ニテ其根莖ヲ藥トス。和名いたどりハ亥ミヲ取り去ル藥效アル故珍取ト云フト雖ドモ果シ真乎否乎。

おほいたごり

Polygonum sachalinense Fr. Schm. (= *Reynoutria sachalinensis* Nakai.)

我邦北地ノ山野ニ多キ大形ノ多年生草本ナリ。根莖ハ横臥シ肥厚ニシテ皮色褐色内部黃色ヲ呈ス。莖ハ高サ 2-3m ニ達シ、多少弓狀ニ傾キ、中空ノ圓柱形ヲ成シ、質硬クシテ綠色ヲ呈シ日ヲ向クレバ紅染シ、上部ニ分枝シ、嫩芽ハ筍狀ヲ成シ往々紅色ヲ呈シテ美ナリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、頗ル大形ニシテ卵形又ハ長卵形ヲ成シ、短銳尖頭、底部心臟形ヲ呈シ、長サ 40cm 餘ニ達シ、葉裏ハ淡白色ナリ。鞘狀托葉ハ膜質。夏秋ノ候梢上葉腋ニ複總狀花序ヲ成シテ多數白色ノ小花ヲ着ク。雌雄異株。萼ハ五裂シ、長サ 2mm 弱、無花瓣。雄花ニハ八雄蕊アリテ微シク萼ヨリ長シ。雌花ニハテ外側萼三片ノ背部ニ翼ヲ有シ花後成長シテ果實ヲ包ム、花中長卵形ノ子房アリテ頂ニ短キ三花柱ヲ有ス。瘦果ハ三稜形ナリ。和名ハ大虎杖ノ意ニシテ草狀普通ノいたどリニ比スレバ大形ナルヨリ云フ。

第1879圖

た
で
科

おやまそば

Polygonum Kakaii Makino. (= *Pleuropteropyrum Kakaii* Hara.)

本州中部北部ノ高山ニ生ズル多年生草本ニシテ高サ 30cm 内外アリ。莖ハ太ク強壯、上部繁ク分枝シ、硬クシテ疎毛ヲ生ズル枝ハ斜ニ張開シテ全株ハ低キ叢ヲ形成ス。葉ハ有柄互生、卵狀橢圓形ヲ成シテ洋紙質ヲ呈シ、長サ 3-5cm、銳頭ニシテ鈍端、圓底或ハ廣楔底ノ者多ケレドモ枝條ノ者ニ於テハ銳底ヲ呈ス、全邊ニシテ疎緣毛ヲ生ジ、表面ハ毛乏シケレドモ裏面ノ脈上ニハ僅毛ヲ見ル。八月莖頂ニ長サ 4-5cm ノ稍疎ナル穗狀花穗ヲ成シテ多數ノ細花ヲ着ク。花ハ白色或ハ淡紅ヲ帶ベル帶綠色ヲ呈ス。萼ハ五深裂。無花瓣。稍萼ヨリ短キ八雄蕊アリ。瘦果ハ宿存萼ニ包マレ、三稜アル椭圓形ヲ成ス。和名 御山蕎麥ハ花容そばニ似テ御山ニ生ズルヨリ云フ、御山ハおやまニテ加賀ノ白山ヲ云フ。

うらじろたで
Polygonum Weyrichii Fr. Schm.
(= *Pleuropteropyrum*
Weyrichii Gross.)

中部以北ノ高山帶ニ見ル多年生草本ナレド往々下降シテ溪谷ノ礫地ニ生ズ。莖ハ強壯ニシテ簇生スレド分枝スルコト少シ。高サ 30cm-1m ニ達ス。葉ハ互生シ比較的短キ葉柄ヲ有シ、闊大ニシテ長卵形又ハ卵狀橢圓形ヲ成シ長サ 10-20cm、先端銳尖シ葉底ハ截形或ハ廣楔形、表面ハ深綠色ニシテ短毛ヲ布キ且支脈規則正シク羽狀ニ陥入スレド裏面ハ密ニ帶微褐色ノ白軟毛ヲ以テ被ハレ、質稍厚ク且軟滑ナリ。夏日、頂ニ複總狀圓錐花序ヲ成シテ多數ノ黃白色小花ヲ密集ス。雌雄異株ナリ。萼ハ五深裂シ長サ 2mm 許、裂片ハ椭圓形ヲ成ス。花瓣無シ。雄花ニハ雄蕊十箇内外。雌花ニハ雌蕊アリテ卵形子房上ニ花柱ハ三岐ス。瘦果ハ廣椭圓形、乾皮質ノ廣翼三片アリテ長サ 5mm 内外、熟シテ褐色ヲ呈シ平滑ニシテ多少ノ光澤アリ。和名ハ裏白蓼ニシテ其葉裏白色ナルヨリ斯ク云フ。

おんたで
一名 いはたで・はくさんたで
Polygonum Weyrichii Fr. Schm.
var. *japonicum* Makino.

(= *Polygonum polymorphum* Ledeb. var.
japonicum Maxim.; P. Savatieri Nakai;
Pleuropteropyrum Savatieri Koidz.)

高山ノ砂礫地ニ生ズル大形ノ多年生草本ニシテ地下莖ハ深ク土中ニ入ル。莖ハ粗大ニシテ直立シ、高サ凡 20-80cm 許アリテ多クハ疎ニ分枝シ綠色又ハ淡紅紫色ヲ帶ビ無毛ナリ。葉ハ互生シテ葉柄ヲ有シ、大形ニシテ廣卵形又ハ卵形ヲ呈シ銳尖頭ヲ成シ、葉底圓形ニシテ葉柄ニ向ヒ銳形ヲ呈シ、葉緣ハ全邊ナリ、質厚クシテ微毛ヲ有シ後無毛ト成ル、枝上ノ葉片ニ梢葉ハ漸次ニ狭小ナリ。鞘狀托葉ハ膜質ナリ。夏日莖頂井ニ枝頂ニ複總狀圓錐花序ヲ成シ多數ノ帶黃白色小花ヲ綴ル。雌雄異株ナリ。萼ハ五深裂シ、長サ 2mm 許。花瓣無シ。雄花ニハ八雄蕊アリ。雌花ニハ卵形ノ一子房アリテ其花柱ハ三岐ス。瘦果ハ宿存萼ヨリ數倍長サ 6-7mm、三翼ヲ有シ各面廣椭圓形ヲ呈ス。ハ今之レヲうらじろたでト同種ト斷ジ本品ヲ以テ其一種ト爲シリ。和名 御蓼ハ蓋シ信州御獄ニ基ケル稱ナラン、岩蓼ハ岩地ニ生ズルタダノ意、白山蓼ハ加川白山ニ生ズルヨリ云フ。

第1881圖

た
で
科た
で
科た
で
科