

第 1912 圖

びやくだん科



かなびきさう
Thesium chinense Turcz.

山野向陽ノ地ニ生ジ能ク芝地ニ之レヲ見ル多年生ノ半寄生草本ニシテ高サハ15-25cm許アリ、根ハ他草ノ根ニ寄生シ短クテ分枝シ白色ヲ呈ス。莖ハ通常叢生シテ直立シ、瘦長綠色ニシテ多少分枝ス。葉ハ互生シ、線形ニシテ鋭頭全邊、長サ1-3cm許ニシテ帯白綠色ヲ呈ス。五月、葉腋ノ短枝上ニ外面淡綠色内面白色ノ小花ヲ頂生シ、花下ニ葉狀苞一片ト小苞二片トアリ。萼ハ下部短筒ヲ成シ上部ハ五又ハ四裂シ、裂片ハ卵狀長橢圓形ニシテ鑷合變ヲ成シ稍厚シ。花瓣無シ。雄蕊ハ五又ハ四箇ニシテ萼片ノ基部ニ着キ之レト對生ス。子房ハ無柄ニシテ下部ヲ成シ一花柱アリ。果實ハ球形ニシテ長サ2mm許、外面ニ脈絡隆起シ、頂ニ宿存萼ヲ冠シ、中ニ種子アリ。和名ハ蓋シ鐵引草ナランモ其意不明ナリ。漢名 百葢草(誤用)

第 1913 圖

びやくだん科



つくばね
一名 はごのき・こぎのこ
Buckleya Joan Makino.

(=Calycopteris Joan Sieb.; B. lanceolata Miq.; Quadrialia lanceolata Sieb. et Zucc.; B. Quadrialia Benth. et Hook. fil.)

山地ノ樹間ニ生ズル半寄生落葉灌木ニシテ根ハ他ノ樹木ノ根ニ寄生ス。幹ハ直立シ高サ1-2.5m許アリテ繁ク分枝シ多ク葉ヲ着ク。葉ハ對生シ稍無柄、卵形又ハ長卵形ニシテ先端長ク尖リ下部ハ楔形、全邊、綠色、長サ2-8cm許。雌雄異株。初夏ノ候、雄花ハ枝端ニ繖房狀ヲ成シ雌花ハ枝端ニ單立シテ開花ス。花ハ小形ニシテ淡綠色、萼片ハ四箇アリテ花瓣無シ。雄蕊ハ四箇、短シ。雌花ノ子房ハ下部、萼片ノ下ニ四箇ノ小苞ヲ有ス。果實ハ卵圓形或ハ橢圓狀圓形ニシテ長サ7-10mm許、頂ニ増大成長シテ葉狀ト成レル線狀披針形ノ四苞ヲ有ス。果實ヲ鹽藏シ料理ノ裝飾ト作セドモ之レヲ用フルコト稀ナリ。和名ハ衝羽根ニシテ其果實ノ狀羽子板ニテ衝ク羽根即チ羽子ニ似タル故云フ、又羽子ノ木モ同意味ナリ、又胡鬼の子ハ羽子板ノ子ト云フ意ニテ子ハ羽子ノ事、胡鬼ハ羽子木板ノ略ニテ子木ハ胡鬼ノ當テ字ヲ用キタルナリ。

第 1914 圖

ぼろぼろのき科



ぼろぼろのき
Schoeffia jasminodora Sieb. et Zucc.

九州ノ山地ニ生ズル落葉小喬木。幼枝ハ紫色ヲ帶ブレドモ二年目ヨリ黄灰色ニ變ズ。小枝ハ強キ者ヲ殘シテ冬ニ入り葉ト共ニ脱落スルノ特性アリ。葉ハ短柄アリテ互生シ、長サ4-6cm、卵形、稍有尾銳尖頭、底部ハ圓形或ハ截形ヲ成シ、全邊ニシテ洋紙質ヲ呈シ軟クシテ柔毛ナリ。花ハ香氣アリテ腋生ノ總狀花序ヲ成シ、雌雄異花ニシテ花穂ノ下部ノ者ハ雌性ナリ。花冠ハ筒形ヲ呈シ、先端四裂反卷シ、黄色ナリ。雄蕊ハ花冠筒ニ着キ四箇。雌蕊ハ長花柱ヲ有シ、先端三岐ス。子房ハ下半位ニシテ三室アリ。核果ハ橢圓狀球形。和名ハ蓋シ此樹ノ材軟脆ニシテポロポロト折レ易ケレバ斯克云フナラン。

やまもがし

一名 かまのき

Helicia cochinchinensis Lour.
(=H. lancifolia Sieb. et Zucc.)

暖地ニ生ズル常綠小喬木ニシテ枝多ク葉繁シ。高サ6m内外。幹ハ直立シ枝ハ紫褐色。葉ハ有柄互生、倒披針狀橢圓形或ハ倒卵狀橢圓形ニシテ長サ5-15cm、兩端銳尖形、上半部ニ疎鋸齒アリ、或ハ梢葉ハ全邊、或ハ稚木ノ葉ハ著シキ粗ナル刺尖鋸齒ヲ列ス、革質ニシテ無毛滑澤、淡綠色ヲ呈ス。夏日葉腋ニ10-15cm内外ノ總狀花序ヲ出ダシ多數ノ有梗花ヲ着ク。花ハ白色、二箇ヅツ苞腋ヨリ生ズ。萼片ハ四箇、厚質線形ニシテ開花時反卷シ、其上部内側ニ各一雄蕊ヲ着生シ花絲ナシ。雌蕊ハ一箇、花柱ハ線形ニシテ長ク花冠ト同高、柱頭ハ棍棒狀ヲ呈ス。果實ハ硬キ漿果ニシテ橢圓形ヲ成シ秋ニ至テ黒熟ス。和名ハ山もがしニシテもがしハ薩州ニテづくのきヲ云フ、此種づくのきニ似テ山地ニ生ズレバ斯克云フ、かまのきノ意不明ナリ。

第 1915 圖

やまもがし科



かはごけさう


Lawiella kiusiana Koidz.

(=Hemidistichophyllum japonicum Koidz.)

九州ナル薩摩并ニ大隅ノ山間急流中ノ岩石面ニ生ズル珍稀ノ多年生草本ニシテ一見蘚苔ノ觀アリ。根ハ再三分枝シテ扁平ナル枝ハ密ニ岩面ヲ蔽ヒ、深綠色ヲ呈シ、表面ニハ處々ニ長サ5mm内外ノ針狀葉ヲ束生ス。九月ニ入レバ葉ノ束生點ヨリ短小ノ莖伸出スルコト2-3mm、二列ニ相重リテ數箇ノ掌狀深裂ノ小形葉ヲ着ケ、頂ニ一花ヲ開ク。花ハ相對セル一雄蕊ト一雌蕊トヲ以テ成リ、子房ハ膨腫シ上半淡紅色ヲ呈シ、雄蕊ノ左右ニハ線形ノ花蓋鱗片アリ。蒴果ハ短梗ヲ具ヘ、球形ニシテ其上半斜ニ蓋開ス。昭和二年今村駿一郎氏始メテ之レヲ薩摩ナル久富木川ノ河中ニ發見シ以テ本科ノ植物ヲ日本本土ニ知ルニ至レリ。和名川苔草ハ其苔狀ヲ呈セル扁平ニ基キテ名ケシナリ。

第 1916 圖

かはごけさう科



やなぎいちご

Debregeasia edulis Wedd.

暖地ノ海岸ニ近キ地ニ自生スル草狀ノ落葉灌木。高サ2-3mニ達シ、枝極真直ニシテ四方ニ發出ス。葉ハ有柄互生、線狀長橢圓形又ハ披針形ニシテ長サ10cm許、先端ハ銳尖シ底部ハ銳形、葉緣ニ細鋸齒アリ。表面ハ脈理凹ミテ皺質ヲ成シ暗綠色多少ノ光澤アレドモ裏面ハ白色ノ綿毛ヲ布ク。早春、葉ニ先チテ小形花ヲ開ク。花ハ短梗上ニ密生セル聚繖狀ヲ成シ前年枝ノ葉腋ニ並ビテ生ズ。雄花ハ四雄蕊。雌花ニハ一雌蕊。五六月ノ候、瘦果柑色ニ熟シテ粒狀ヲ成シ、金平糖狀ニ密集シテ球狀ヲ呈シ徑1mm内外アリ、多汁ニシテ甘味淡フマシ。和名ハ柳莓ニシテ其葉狭長ニシテやなぎノ如ク其果實柑黄色ニシテ粒々相集リいちごノ如ケレバ斯克云フ。

第 1917 圖

いらんこ科

