

第 1936 圖

ウラボシ科



むかごいらくさ

Laportea bulbifera Wedd.

(=Urtica bulbifera Sieb. et Zucc.)
山中樹下ノ地ニ生ズル多年生草本ニシテ莖上ニ生ズル褐色ノ肉芽ニ由テ繁殖ス。莖ハ直立シテ高サ50-60cm許アリ、葉ト共ニ螫毛ヲ疎生ス。葉ハ互生シテ長柄ヲ有シ、長卵形ニシテ鋭尖頭、圓底ヲ成シ、邊緣ニ粗鋸齒アリ。葉腋ニハ褐色ノ肉芽ヲ生ズル殊態アリ。雌雄同株。夏日、小花ヲ開ク。雄花穂ハ下方ノ葉腋ヨリ出デテ分枝シ、圓錐狀ヲ成シ、雄花ハ緑白色ニシテ四乃至五萼片、四乃至五雄蕊ヲ有シ葯ハ白花粉ヲ吐ク。雌花穂ハ一條莖頂ノ葉腋ヨリ出デテ短ク一方ニ分枝シテ穂ヲ成シ、雌花ハ淡綠色ニシテ其萼四裂シ、花柱ハ線形ナリ、花後萼片ハ成長シ、其中ノ二片ハ他ヨリ遙ニ大形ト成ル。果實ハ斜圓形ヲ成シ、扁平ニシテ長サ3mm許、短柄ヲ有ス。和名ハ零餘子蕁麻ノ意ニシテ其莖上ニ肉芽ヲ生ズルヨリ云フ。

第 1937 圖

ウラボシ科




いらくさ (蕁麻?)

一名 いたいたぐさ
Urtica thunbergiana Sieb. et Zucc.

山地或ハ林側地等ニ生ズル多年生草本。莖ハ叢生シテ直立シ、高サ凡50cm-1m許、綠色ニシテ縱稜ヲ具ヘ、葉ト共ニ著シキ螫毛アリ。葉ハ葉柄ヲ有シテ對生シ、卵圓形ニシテ尾狀鋭尖頭ヲ有シ、底部心臟形ヲ成シ、邊緣ニ粗大ナル鋭鋸齒ヲ列ネ其齒ハ更ニ二ノ細齒ヲ具フルアリ、質薄クシテ蒼綠色ヲ呈シ、托葉ハ半バ以上癒合シ、淡綠色廣卵形ニシテ莖節上ニ對生シ葉柄間ニ位ス。雌雄同株。秋月小花ヲ開ク。花穂ハ各葉腋ヨリ二條ヅツ出デ、單穗狀或ハ多少分枝シ、下方ノ者ハ雌性、上方ノ者ハ雄性ナリト雖モ其雄穗ノ基部ニハ往々雌花ヲ有スルコトアリ。雄花ハ緑白色ニシテ四萼片ヲ有ス。雌花ハ淡綠色ニシテ四萼片、柱頭ハ刷毛狀ヲ成シ、花後内側ノ二萼片ハ成長シテ瘦果ヲ包ム。瘦果ハ卵形ニシテ扁平、綠色ナリ。和名ハ刺草ノ意、其莖葉ノ螫毛人膚ヲ刺シ疼痛ヲ覺ユル故此名アリ、痛痛草モ同義ナリ。

第 1938 圖

ウラボシ科



なかりばいらくさ

Urtica sikokiana Makino.

四國ノ深山樹下ノ陰地ニ生ズル多年生草本ニシテ全草瘠長、毛茸並ニ微毛少ク、乾ケバ暗色ト成ル。莖ハ疎ニ叢生シテ直立シ、高サ1mニ達ス。葉ハ莖ニ疎ニシテ對生シ、狭細ナル葉柄アリテ其基部ニハ各二片ノ膜質托葉ヲ存シ、葉片ハ狭長披針形或ハ線狀披針形ヲ呈シテ長サ5-8cm、長尾狀漸尖頭ヲ成シ、底部ハ鈍形、邊緣ニハ稍整正ノ細鋸齒ヲ具ヘ、質極メテ薄ク、三主脈縱走ス。雌雄同株。夏日ニ至テ各葉腋ニ各二條ノ瘦長花穂ヲ斜上シ、莖ノ上部ノ者ハ雌性、下部ノ者ハ雄性ナリ。花ハ細微ニシテ穂軸ニ疎着シ、果實ト共ニほそばいらくさニ似テ更ニ小形ナリ。雄花ハ四萼片、四雄蕊。雌花ハ小ナル萼片ト比較的大ナル一箇ノ雌蕊トヲ有ス。和名ハ長葉蕁麻ニシテ此種いらくさノ縁類ニシテ其葉長形ナレバ云フ。

あさ (大麻)

Cannabis sativa L.

舊ク古代ニ我邦ニ入り今ハ一般圃地ニ栽培セラルト雖モ元來ハ蓋シ南亞細亞并ニ中央亞細亞ノ原産ナル一年生ノ草本ニシテ圃地ニ近ヅケバ之レヨリ發散スル惡臭ヲ感ズ。莖ハ眞直ニシテ直立シ高サ1-2.5m許、鈍方形ニシテ細毛ヲ布キ綠色ナリ。葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ梢部ノ者ハ互生シ、掌狀複葉ニシテ五乃至九裂シ、裂片ハ披針形ニシテ兩端尖リ邊緣ニ齊列セル鋸齒ヲ有シ、上面ハ粗澁、裏面ハ細毛ヲ密布シ、上葉ハ短柄ヲ有シ三裂或ハ分裂セズ、托葉ハ離生シ披針形ナリ。夏日開花シ、雌雄異株ニシテ雄本ヲ漢名桑麻ト云ヒ雌本ヲ苧麻ト名ク。雄花穂ハ圓錐狀ヲ成シ、雄花ハ淡黃綠色、五萼片、五雄蕊、葯ハ大形黃色ニシテ懸垂シ花粉多シ。雌花穂ハ綠色ノ短穗狀ヲ成シ、狭長苞葉多ク、雌花ハ一ノ小苞ニ包マレテ花被無ク二花柱ノ一子房アリ。瘦果ハ卵圓形、稍平扁、硬質、灰色。莖皮ノ纖維ヲ衣トシ又麻絲トシ、皮ヲ剥ギシ材部ヲあさガラト呼ビ、種子ヲ食用トス。和名ハ青麻即チあをそノ約言ニシテ其多少綠色ヲ帶ビタル皮ノ纖維即チそヨリ出デシ名ナリ。

第 1939 圖

くは科



かなむぐら (葎草)

Humulus japonicus Sieb. et Zucc.

原野・路傍・廢地等ニ多キ一年生蔓性草本ニシテ通常一面ニ繁衍シテ地面ヲ掩フコト多シ。莖ハ綠色ニシテ長ク延長シ葉柄ト共ニ纏澁スル小鉤刺ヲ滿布シ、強ク他物ニ纏澁ス。葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ五乃至七片ノ掌狀ニ尖裂シ、裂片ハ卵形乃至披針形ニシテ鋭尖頭、邊緣鋸齒ヲ有シ、葉面ハ頗ル糙澁ス。雌雄異株。秋月小花ヲ開ク。雄花穂ハ柄ヲ有シテ葉腋ヨリ出デ圓錐狀ヲ成シテ多數ノ淡黃綠色雄花ヲ着ケ、各雄花ハ五萼片、五雄蕊アリテ葯ハ大形ナリ。雌花穂ハ短穗狀ヲ成シテ下垂シ、綠色ヲ呈シ、雌花ハ紫褐色稀ニ綠色(あをかなむぐら forma viridis Makino)ノ鱗狀苞ニ包マレ、一子房、二花柱アリ。瘦果ハ扁圓形、長サ5mm許、堅クシテ多クハ紫褐斑アリ。和名かなむぐラノかなハ鐵ニシテ其勁韌ナル莖ヲ形容シテ稱ヘむぐラハ蓬ヤトシテ茂レル雜草ヲ云フナルベケレバ乃チ此一雜草ヲかなむぐラト名ケシナルベシ、彼ノ歌ニ在ルヤヘむぐラハ人ニ由リ此品ナルベシト謂ヘリ。

第 1940 圖

くは科



からはなさう

Humulus Lupulus L.

var. cordifolius Maxim.

(=H. cordifolius Miq.)

山地帯ニ生ズル多年生蔓性草本。莖ハ長ク且強力ナル蔓ヲ成シテ盛ニ他ノ草木ニ纏澁シ繁衍シ、葉柄ト共ニ小鉤刺アリ。葉ハ長柄ヲ有シテ對生シ、心臟狀卵圓形ニシテ鋭頭或ハ鋭尖頭、往々三裂シテ深入セル灣底ハ鈍圓形ヲ呈シ、邊緣ニ粗鋸齒ヲ有シ、葉面糙澁シ、雌花穂ヲ着クル小枝ノ葉ハ通常互生ス。雌雄異株。秋月細花ヲ開ク。雄花ハ多數圓錐花穂ニ群着シ淡黃色ニシテ五萼片、五雄蕊アリ。雌花ハ淡綠色ニシテ球穗狀ニ集合シ、每二花ノ鱗狀苞ニ擁セラレ、子房上ニ二花柱アリ、果時ニハ其苞成長増大シ薄質ニシテ重疊膨脹シ大ナル卵狀球形ヲ成シテ淡黃白色ヲ呈シ多數相並ンデ枝ヨリ懸垂シ、鱗苞ニ二瘦果アリテ小苞ニ擁セラレ且萼ニ包マレ、小苞并ニ萼ニハ黃色ノ細腺粒附着シ佳香ヲ放チ味苦ク其點母種ノほっぷ即チせいやうからはなさうト異ナラズ。和名ハ唐花草ノ意、唐花ハ模樣ニ使用セラレタル花形ニシテ蔓上ニ綴レル本品ノ果穂ヲ之レニ擬セシモノナリ。

第 1941 圖

くは科

