

第 2014 圖

やなぎ科



こりやなぎ

Salix koriyanagi Kimura.

(=S. purpurea L. var. japonica Nakai; S. integra var. angustifolia Makino.)

廣ク水邊ニ栽植セラルル落葉灌木ニシテ雌雄異株、枝極多ク且長ク伸ビテ直立シ高サ 1-3mアリ。葉ハ短柄アリテ對生或ハ三葉輪生シ、廣線形、長サ4-8cm、微低鋸齒アルカ或ハ殆ンド全邊、銳頭鈍底、平滑ニシテ裏面ハ白霜ヲ帶ブ。春日、花穂ヲ生ズ。花穂ハ直立シ、狹長橢圓形、長サ2cm内外アリ、苞ハ卵狀橢圓形ニシテ白毛アレドモ黒色ヲ呈スル爲メ花穂ハ初メ黒ク見ユ。雄蕊ハ一本ニシテ長サハ苞ノ四倍内外ニ達ス。卵狀橢圓形ノ子房ハ柄無クシテ密ニ相並ビ白絨毛ヲ密布ス、柱頭ハ二岐シ花柱ハ極メテ短シ。蒴ト成ルモ毛脱落セズ。枝條ノ長サ2m内外ノ者ヲ刈リテ集メ、皮ヲ除キテ柳行李ヲ編ム。但馬ノ名産ナレドモ今ハ他ノ國ヨリモ出ヅ。和名ハ行李柳ノ意ナリ。漢名 杞柳(誤用)

第 2015 圖

やなぎ科



いぬこりやなぎ

Salix integra Thunb.

(=S. multinervis Franch. et Sav.; S. purpurea L. var. multinervis v. Seem.)

諸國ノ原野溝側或ハ時ニ山原濕潤ノ地ニ生ズル落葉灌木。枝極細ク眞直ニシテ無毛、光澤アリ。葉ハ對生或ハ擬互生、狹長ナル長橢圓形ニシテ無柄、長サ3-5cm許ニシテ兩端鈍圓形、多クハ稍蒼綠色ニシテ裏面ハ帶白色、邊緣ハ低細鋸齒ヲ有シ或ハ殆ンド全邊ナリ。雌雄異株。早春葉ニ先チテ莖葉花序ヲ出ダス。長サ3cm内外、花ハ小形ニシテ密ニ鱗次シ、苞ハ卵狀橢圓形ヲ呈シ花ヨリ短ク黒色ナルヲ以テ雌花穂ニ於テ青黒相混ズルノ觀アリ。雄蕊ハ一本。蒴ハ二裂シニ開裂シ白絨毛アル種子ヲ迸出ス。和名大行李柳ハこりやなぎニ似テ敢テ利用ノ途無ケレバ會テ田中芳男氏斯ク命名セリ。

第 2016 圖

やなぎ科



きつねやなぎ

一名 いはやなぎ

Salix vulpina Anders.

諸國ノ山地ニ生ズル落葉灌木。高サ1-2mアリ。葉ハ柄有リテ互生シ、橢圓形・廣橢圓形・披針狀橢圓形等種々ノ變異ヲ現ハス、長サ3-12cm許、先端ハ急遽鋭尖頭、葉底ハ鈍形ノ者多ク、紙質ニシテ邊緣ニ波狀低鋸齒ヲ具ヘ、表面多少皺襞ノ氣味アリ、裏面ハ灰白色ヲ帶ビ且白毛ヲ散生スレドモ乾ケバ鐵銹色ヲ呈ス。春日、葉ノ開舒前ニ黃綠色ノ花穂ヲ立ツ。雌雄異株。共ニ3cm内外ヲ算シテ細シ。雄花ニハ雄蕊二本アリ、花絲ハ長シ。雌花ニハ長披針形ノ雌蕊一箇ヲ有シ、子房ニハ柄アリ、柱頭ハ二岐ス。果穂ハ熟シテ長サ6-12cmト成リ蒴果ハ二裂シテ白絮ヲ吐ク。和名ハ岩柳舊シ、狐柳ハ其種名 vulpina (狐の、或ハ狐色のノ義)ニ基キテ後ニ名ケタリ。

やまねこやなぎ


一名 ばっこやなぎ

Salix Bakko Kimura.

諸國ノ山中陽地ニ生ズル落葉喬木。高サ5mニ達ス。枝極ハ皮ヲ剝ケバ各處ニ小隆起線ヲ見ル。葉ハ有柄互生、長橢圓形ニシテ長サ5-12cm、先端ハ急遽鋭尖頭、葉底ハ圓キコト多ク、邊緣不齊ノ低鋸齒アリテ猶小サク上下ニ波曲ス、質ハ稍厚ク表面ハ深綠色平滑ナレドモ多少ノ皺ヲ見、裏面ハ甚ダシク密ニ白絨毛ヲ布ク、而シテ支脈上毛ナク露出スル者多シ。四五月頃雌雄異株ニ花穂ヲ開ク。雄花穂ハ短ク太キ橢圓形ニシテ黃色ヲ呈シ、長サ2-3cm、密ニ白絨毛ヲ被リ、苞ハ披針形黒色、毛ノ中ニ埋没ス。雄花ニハ雄蕊二本アリ。雌花穂ハ長橢圓形、稍曲リ、軸ニハ白絨毛アリ、成熟シテ長サ7cm内外ニ伸ビ、多數ノ狹長披針形ノ蒴ヲ着ク。蒴ハ柄アリテ開出シ短毛密布シ、先ニ向ヒテ尖リ、柱頭ハ四岐セリ。漢名 山柳(誤用)

第 2017 圖

やなぎ科



したれやなぎ (柳)


一名 いとやなぎ

Salix babylonica L.

古ク支那ヨリ入リシ者ナレドモ今ハ廣ク處々ニ栽植セラル。高サ5-10m、幹ハ灰黒色ヲ呈シテ縦裂シ、枝極ハ柔軟ニシテ下垂シ、風ニ順ツテ動キ易キタメ堤防・道路ニ列植シテ風致ヲ添フ。葉ハ互生シ、概ネ下垂シ、線狀披針形或ハ長披針形ニシテ長サ5-12cm、先端ハ尾狀ニ尖リ、葉底ハ廣楔形、邊緣ハ低ケレドモ整正ノ鋭鋸齒ヲ刻ミ、表面暗綠色、裏面ハ帶白色、毛全ク無シ。早春、葉舒ビザル前ニ黃綠花ヲ開ク。花穂ハ彎曲シ、長サ15-30mmアリテ細シ。花軸ニハ毛多シ。雌雄異株。雄花ハ雄蕊二箇ヲ有シ、雌花ノ雌蕊ハ柄ヲ缺キ柱頭ハ二裂ス。苞ハ共ニ卵狀橢圓形ニシテ圓頭、背面無毛ナリ。

第 2018 圖

やなぎ科



をのへやなぎ

一名 からふとやなぎ

Salix sachalinensis Fr. Schm.

中部以北并ニ四國ノ山中溪谷山原或ハ原野ニ弘ク生ズル落葉喬木ニシテ高サ5-10m許、往々大木ト成ル。枝條ハ細ク、眞直ニシテ分枝ハ開出セズ。葉ハ有柄互生、長披針形、長漸尖頭、鈍底或ハ稍鋭底、邊緣ニハ不明ノ低キ波狀鋸齒ヲ有シ、長サ10-15cm、初メ嫩枝ト共ニ汚白色ノ短毛ヲ被リテ灰色ヲ呈シ、後表面ノミ臥毛散生スルニ至レドモ裏面ハ依然縮狀毛ヲ布キ、支脈多クシテ斜ニ平行ス。雌雄異株。初夏葉ノ開舒ノ後暫時ニシテ花穂伸ビテ花ヲ開ク。花序ハ狭圓柱形ヲ成シテ立ち、基脚ニ二三ノ小形葉ヲ伴フ。雄花ニハ二雄蕊アリ。雌花ノ子房ハ卵狀圓錐樣ヲ呈シ灰白色ノ細毛ヲ被ルヲ以テ花穂モ亦同色ヲ呈ス。花柱ハ二個、線形ナリ。七月ニ蒴果熟シテ開裂シ所謂柳絮ヲ飛バス。時ニ枝上ニ無數ノ球狀蟲癭ヲ見ルコトアリ。和名尾上柳ハ初メ之レヲ土佐ノ山中高地ニ採リテ予斯ク名ケタリ、即チ峰の上(をのへ)やなぎノ意ナリ、樺太柳ハ樺太ニ生ズルヨリ云フ。

第 2019 圖

やなぎ科

