

第 2326 圖

アリスエモ科



ゆきもちさう  
一名 くわんきさう  
*Arisaema sikokianum*  
Franch. et Sav.

中部以南ノ山地樹林下ニ生ズル多年生草本。球莖ハ平圓形。頸部ニ多數ノ鬚根ヲ發出ス。偽莖ハ一本直立シ圓柱形ニシテ多葉、長サ20-30cm許アリ、頂ニ二葉相接近シテ出ツ。葉ハ鳥趾狀葉ニシテ三或ハ五個ノ小葉アリ、小葉ハ橢圓形、兩端概ニ銳尖形ヲ成シ、葉縁全邊或ハ鋸齒アリ、葉面或ハ時ニ白斑アリ。五六月ノ候、葉間ニ有柄ノ一肉穂花序ヲ抽出ス。佛焰苞ハ紫褐色ヲ呈シ、筒部ハ長サ5cm内外、上部喉口ニ近ツキテ急ニ放大シ、鞍部ハ直立シ長サ8cm内外、倒卵狀橢圓形ニシテ先端ハ尾狀銳尖頭ト成リ、下部亦銳尖狀ニ狹窄シテ筒部トノ境界明瞭ナリ。肉穂花序ノ附飾物ハ著シキ棍棒狀ニシテ佛焰苞筒ヨリ超出シ、先端ハ急ニ圓ク膨大シ其色雪白ナルヲ以テ苞トノ對照甚ダ著シ。雌雄異株、雄本ニ在テハ肉穂ノ下部ニ多數ノ雄花ヲ散着シ、雌本ニ在テハ綠色子房ヨリ成ル雌花ヲ集着シ。漿果ハ肉穂軸ニ多數集着シテ卵狀橢圓形ヲ呈シ赤熟ス。和名雪餅草ハ花軸附飾物ノ頭、圓形ニシテ雪白色ナレバ云ヒ、歡喜草ハ人アリ此草ヲ得テ歡喜セルヨリ斯ク名ケタリ。

第 2327 圖

アリスエモ科



むさしあぶみ  
*Arisaema ringens* Schott.

西部及南部ノ海ニ近キ地ノ林中ニ生ズル多年生草本。球莖ハ稍平球形ニシテ二ノ小仔球莖ヲ伴フ。偽莖ハ一本直立シ短大ニシテ淡綠色ヲ呈シ、莖ノ上部ニ二葉ヲ出ダシ、葉ハ對生セル如ク接近シ、葉柄ハ淡綠色ニシテ斜上ス。葉面ハ三小葉ヨリ成リ、小葉ハ無柄闊大、卵狀廣橢圓形ニシテ全邊、先端ハ急ニ尖リテ尾狀ヲ成シ底部亦銳尖、長サ15cm内外ナレド大ナルハ30cmヲ超ユルニ至ル。鮮綠色ニシテ質軟カク、光澤ニ富ミ、裏面ハ淡色白霜ヲ帯フ。五月二葉間ニ一短梗ヲ直立シテ一肉穂花序アリ。佛焰苞ハ特異ノ形狀ヲ呈シ、鞍部ノ上半ハ卵形ニシテ前方ニ突出スレドモ中央背部ハ囊狀ヲ成シテ彎曲シ、一見兜或ハ鐘ノ如シ。外面ハ綠白條交互シ、内面ハ黒・紫ニ縦縞ヲ成ス。筒部喉邊ニハ耳狀アリテ開張シ、中央ニ大ナル白色ノ肉穂軸附飾物立チテ棍棒狀ヲ呈シ、先端ハ鈍形ニシテ卵ノ内側ニ入レリ。果實ハ太キ穂軸面ニ排ビ着キテ赤熟ス。偽莖ノ暗紫色ナル一變種ヲむらさきむさしあぶみ (var. Sieboldii Engl.) ト云フ。和名ハ武蔵鐘ノ意ニテ其佛焰苞ノ形狀ニ象ドリ、武蔵鐘トハ昔武蔵ノ國ニテ製出セシあぶみナリ。


からすびしゃく (半夏)  
一名 はんげ・すずめのひしゃく・しゃくし  
さう・へそくり・へぶす

*Pinellia ternata* Breit.

(= *Arum ternatum* Thunb.; *Atherurus tripartitus* Blume; *P. tuberifera* Tenore.)  
多ク園圃中ニ生ズル多年生草本。地下ニ徑1cm内外ノ圓形球莖アリテ二葉ヲ生ジ、葉柄細長綠色ニシテ10-20cm許アリ、下部内側ニ一珠芽ヲ有ス。葉面ハ三小葉ヨリ成リ、小葉ハ卵狀橢圓形ヨリ長橢圓形ヲ經テ線狀披針形ニ至ル種々ノ形狀ヲ有シ全邊ニシテ先端漸尖シ、底部ハ鈍形、殆ンド柄無シ。任々三小葉ノ合點ニモ小珠芽ヲ生ズ。六月ノ候綠色ノ一葶蒿高ク葉ヲ抽テ立チ、頂ニ一肉穂花序アリ。佛焰苞ハ綠色或ハ帶紫色 (むらさきはんげ var. *atropurpurea* Makino) ニシテ長サ6-7cm、中部以下ハ輕ク卷キテ筒ヲ成シ鞍部内面ハびろろと狀ヲ呈ス。肉穂花序ハ下部ニ卵形尖頭ノ雌花ヲ多數ニ着ケ此部分ハ佛焰苞ト完全ニ融合シ、其上方少シク距リテ長サ1cm許ノ間ニ雄花ヲ密着シ、其レヨリ上ハ中軸瘦長鞭狀ト成リ斜上ス。雄花ハ無柄ノ葯ノミヨリ成リ淡黄白色ヲ呈ス。漿果ハ細小、綠色。其線形葉ナルヲしかはんげ (f. *angustata* Makino = *P. angustata* Schott) ト云フ。本種如地ニ侵入スレバ其驅除甚ダ容易ナラズ。球莖ヲ藥用トス。和名烏桎杓並ニ雀ノ柄杓又ハ杓子草ハ其佛焰苞ノ狀ニ基キ、はんげハ漢名半夏ノ字音ナリ、へそくり・へぶすハ其ニ其球莖ニ對スル名ニシテぶすハ蓋シ附子ナラン。

第 2328 圖

アリスエモ科



おほはんげ

*Pinellia tripartita* Schott.

(= *Atherurus tripartitus* Blume.)

我邦西南部温暖ノ山地ニ生ズル多年生草本。地下ニハ徑3cm内外ノ球莖ヲ具ヘ、其頂ヨリ一ニ葉ヲ立テ、葉柄ハ長サ30cm内外アリ、綠色ノ細長圓柱形ニシテ多肉ナリ。葉面ハ長サ15cm内外、水平ニ位置シ三深裂稀ニ三全裂シ、底部ハ深心臟形ヲ呈シ、鮮綠色ニシテ光澤ニ富ミ、小葉ハ卵狀橢圓形、先端ハ尾狀銳尖形、邊緣多少ノ皺曲アリ。六七月ノ候、根際ヨリ綠色ノ一葶ヲ立ツルコト葉ト其高サ略ボ等シク、頂ニ一肉穂花序アリテ其狀からすびしゃくノ如ク且之レヨリ大ナリ、全體鮮綠色ヲ呈シ、佛焰苞ハ5-11cm、下部2-4cmノ間ハ花軸ノ雌花部ト癒合シ、其少シク上ニ雄花部アリ、中軸ノ先端ハ長鞭狀ヲ呈シテ直立ス。佛焰苞内紫褐色ヲ呈スル一變種ヲむらさきおほはんげ (var. *atropurpurea* Makino) ト云フ、九州並ニ四國ニ産ス。和名ハ大半夏ノ意ニシテ半夏ニ似テ草狀大ナレバ云フ。

さといも (芋) 一名 たいも  
*Colocasia Antiquorum* Schott

var. *esculenta* Engl.

(= *Caladium esculentum* Vent.;

*Colocasia esculenta* Schott.)

熱帯あじおノ原産ニシテ、普通園圃ニ栽培スル多年生草本。球莖ハ地中ニ在リテ橢圓形ヲ呈シ、外面褐色ノ纖維ヲ存シ、其側方ニ接シテ倒卵形ノ仔球ヲ生ズ。葉ハ根生、四五束生シ、巨大ニシテ往々高サ1mヲ超エ、葉柄ハ長クシテ立チ多ク一方向ニ傾キ肥大多肉、葉液ヲ含ミ淡綠色、葉面ハ闊大、質厚クシテ卵狀廣橢圓形ヲ成シ長サ30-50cm、蒼綠色ヲ呈シ支脈ハ稍平行シ、先端短ク銳尖シ、底部ハ耳狀、彎底ハ葉柄ニ達セズ、故ニ葉面ハ橢圓形ヲ呈ス、耳片ハ鈍頭、唯末端ノミ圓シ。夏日稀ニ葉鞘底ヨリ一乃至四蒂ヲ直立シ蒂端ニ各一ノ肉穂花序ヲ有シテ順次ニ綻ビ、長サ凡30cm内外、佛焰苞ハ淡黄色多肉、披針形ヲ成シテ内卷シ基部ヨリ上6-7cmノ處括約シ、之レヨリ下部ハ其色綠色厚質ト成ル。肉穂軸ハ苞ノ中央ニ立チ上端ニ短キ附飾物ヲ具ヘ、上部ニ黄色ノ多數雄花ヲ密生スルコト磚瓦ヲ布ケルガ如ク、下部ニハ綠色ノ雌花ヲ多數密着ス。雄花ハ四五個ノ雄蕊應合體ニシテ戴頭ナリ。栽培品種甚ダ多クたうのいも・やつがしらいも・やまといも・めあか・みづいも等アリ。球莖ハ重要食品ヲ成シ、葉柄モ亦食用トス。和名里いもハ里即チ村ニ作ルいもノ意、田いもハ田ニ作ルヨリ云フ。

おらんだかい

一名 ばんかい

*Zantedeschia aethiopica* Spreng.

(= *Calla aethiopica* L.;

*Richardia africana* Kunth.)

南アフリ加原産ノ強壯ナル多年生草本ニシテ蓋シ弘化年間ニ渡來シ今ハ切花用トシテ諸處ニ栽培セラル。葉ハ一株ニ叢生シテ綠色ノ粗大多肉ナル長葉柄ヲ有シ、三角狀卵形ニシテ長サ20cm内外、先端短ク尖リ、底部ハ耳狀心臟形ヲ呈シ葉柄ニ連ナル。夏日、葉間ニ一葶ヲ抽クコト1mニ近ク、頂ニ開花シ香氣アリ、佛焰苞ハ白色ニシテ闊大、長サ10cmヲ超エ、漏斗狀ニ卷キテ其中央ニ棒狀ノ肉穂花序直立シ佛焰苞ヨリ著シク短シ。花軸ノ長サ6-7cmニシテ白色ヲ呈シ、下方1-2cmハ雌花ヲ着ケ、殘部ノ全面ニハ微細ノ雄花ヲ密布ス。和名和蘭海芋ハ和蘭船ニ由テ移入セラレシヲ以テ云ヒ、蕃海芋ハ盤國海芋ノ意ナリ、飯沼慾齋ノ草木圖説ニ之レヲくはすいも・野芋トセルハ固ヨリ誤ナリ、園藝界ニテハ一般ニ之レヲから(Calla)ト呼ベリ。漢名 海芋(誤用)

第 2329 圖

アリスエモ科



第 2330 圖

アリスエモ科



第 2331 圖

アリスエモ科

