

第292圖



すひかづら科

うこんうつぎ

Calyptrostigma Middendorffiana

Trautv. et Mey.

北國ノ深山ニ生ズル落葉灌木。高サ1.5m
内外、葉ハ對生シ、卵圓形ニシテ鋸齒ア
リ、上部ノ葉ハ殆ド無柄ナリ。夏時、枝梢
ニ有梗ノ綠黃花ヲ着ク。花冠ハ鐘狀漏斗
形ヲ成シテ五裂シ、花中ニ五雄蕊アリテ
薬ハ相接ス。萼ハ兩脣形ヲ成シ、下位子
房ノ頂ニ立ツ。

第293圖



すひかづら科

にしきうつぎ

Weigela nikkoensis Makino.

野州日光山等ノ山地ニ生ズル落葉灌木。
高サ2-3m。葉ハ葉柄ヲ以テ對生シ、長卵
形或ハ橢圓形ニシテ末尖リ、鋸齒ヲ具ヘ、
下面ニ毛ヲ生ズ。夏時花ヲ聚繖状ニ開キ、
花冠ハ五裂セル漏斗狀ヲ呈シ、初メ白色、
後紅色ト成ル。花中ニ五雄蕊ト菌狀柱頭
ヲ有スル一花柱トアリ。子房ハ下位ニシ
テ瘦長。頂ニ五片ノ狹長ナル萼片アリ。
花初メ白色、後赤變スル故此和名アリ。

第294圖



すひかづら科

はこねうつぎ

Weigela coraeensis Thunb.

海ニ近キ地ニ自生スル落葉灌木ニシテ、
往々庭園ニ栽植ス。高サ3-5m許ニ達シ、
葉ハ有柄對生シ、橢圓形ニシテ銳尖頭、鋸
齒緣ヲ成シ、質稍厚ク、通常毛ナシ。初夏
ノ候、新枝ノ葉腋ニ多數ノ花ヲ着ク。花
冠ハ漏斗形ヲ成シテ五裂シ、初メ白色ニ
シテ、漸次紅紫色ニ變ズ。五雄蕊ト菌狀
柱頭アル一花柱トアリ。和名ハ箱根空木
ノ意ナレドモ、同山ニ在ルモノハ別種ニ
シテ、畢竟誤認ニ出ヅ。

たにうつぎ

Weigela hortensis C. A. Mey.

forma spontanea Makino.

山地ニ自生スル落葉灌木。高サ2-3m。葉
ハ對生シ、卵形或ハ長橢圓形ニシテ銳尖
頭ヲ成シ、邊緣ニ鋸齒アリ、葉裏ニ白色ノ
絨毛多シ。花冠ハ紅色、筒狀漏斗形ニシ
テ上部膨大シ、邊緣五裂シ、五雄蕊一花柱
ヲ有ス。六月頃、小枝頭竝ニ葉腋ニ聚繖
花序ヲ成ス。此一變種ニベニうつぎアリ
テ通常觀賞品トシテ人家ニ栽培セラル。
漢名 楊櫞(誤用)

第295圖



すひかづら科

やぶうつぎ

Weigela floribunda C. A. Mey.

(=Diervilla floribunda Sieb. et Zucc.)
中部以西ノ山地ニ自生スル落葉灌木。高
サ2mヲ超エ。全株密ニ絨毛ヲ被ル。葉ハ
對生シ極メテ短キ柄ヲ具ヘ橢圓形ニシテ
銳尖頭、楔形底又ハ狹底、裏面ニハ密絨
毛ヲ生ジ、葉色往々紅紫色ヲ帶ブ。花ハ
六月頃同年ノ新枝ニ頂生及ビ腋生シ、初
メヨリ暗赤色ヲ呈ス。萼筒ニハ密絨毛ア
リ。萼片ハ五箇、狹細。花冠ハ側向シ毛ヲ
有シ細長クシテ漸次豊大スレドモ舷部ハ
展開セズ。雄蕊五箇、閉在、白色ノ柱頭
ノミ花冠外ニ挺出ス。蒴果ハ長橢圓體、
外側密毛アリ、長サ2cm内外。開裂シテ
鋸屑状ノ有翼種子ヲ出ダス。



すひかづら科

第296圖



すひかづら科

Weigela sanguinea Nakai
var. Nakaii Makino.

(=Diervilla sanguinea Nakai; D. san
guinea Nakai var. Nakaii Makino.)
中部ノ山地ニ生ズル落葉灌木。高サ2-3m
ニ達シ、枝樺長クシテ往々垂ル。葉ハ對
生シ短柄アリ倒卵形或ハ橢圓形ニシテ長
サ5-10cm、銳尖頭ヲ成シ緣ニ鋸齒ヲ具ヘ
兩面ニ毛アリ、殊ニ裏面中脈ハ白絨毛ヲ
以テ被ハルヲ以テ顯著ナリ。花ハ六七月
葉腋ニ開キ、初メヨリ濃紅色ヲ呈ス。萼
片ハ五箇、線形ニシテ直立シ毛多シ。花
冠ハ漏斗狀鐘形ニシテ筒部ハ稍急狭長
シ、外面ニハ軟毛ヲ布ク。蒴果ハ狹長橢
圓形ニシテ毛ヲ殘存シ、熟スレバ中軸ヲ
残シテ二片ニ開裂スルコト同屬他種ト相
同ジ。和名天鵝絨空木ハ體上ニ軟細毛ア
ルヲ以テ名ク。